

## INFORME MORTALIDAD POR ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO. ARAGÓN 2020

### METODOLOGÍA

Se seleccionaron, a partir del Registro de Mortalidad, las defunciones por enfermedades del sistema digestivo registradas en Aragón durante el año 2020. Se asignaron el Sector y la Zona Básica de Salud (ZBS) a la que corresponde la residencia de cada defunción según el Padrón de habitantes, de acuerdo al mapa sanitario de 2015.


Se calcularon las tasas bruta y ajustada a la nueva población europea con su IC al 95% y se representó ésta última, para el total de la población por sector sanitario (Figura 1) y para cada sector sanitario y sexo (Figura 2). Se calcularon y representaron las tasas específicas por grupo de edad y sexo (Figura 3).

Asimismo se calcularon las Razones Estandarizadas de Mortalidad (REM) para cada ZBS por sexo y se suavizaron mediante el modelo de Besag, York y Mollié, Para el cálculo de esperados se utilizaron las tasas de mortalidad de Aragón por enfermedades del sistema digestivo por grupos quinquenales de edad. Se representó cartográficamente la REM suavizada (REMs) para los hombres y mujeres (Figuras 4 y 5) y se detallaron las ZBS con exceso o defecto de riesgo (Tabla 1 y 2).

### RESULTADOS.


El sector de Zaragoza III presenta unas tasas superiores, estadísticamente significativas, respecto al total de Aragón en el total de la población. Existen diferencias entre los sexos, las tasas de los hombres son superiores, estadísticamente significativas, a las de las mujeres para el total de Aragón (figuras 1 y 2).

Figura 1. Tasa ajustada por sector sanitario. Ambos sexos.



Tasa bruta. Hombres Aragón: 0,6 por 1000 hab  
Tasa ajustada. Hombres Aragón: 0,5 por 1000 hab  
Tasa bruta. Mujeres Aragón: 0,6 por 1000 hab  
Tasa ajustada. Mujeres Aragón: 0,3 por 1000 hab

Figura 2. Tasa ajustada por sexo y sector sanitario.



Las tasas específicas por grupos de edad y sexo son más elevadas en los hombres en prácticamente todos los grupos de edad. Las tasas son más altas en los grupos de mayor edad. La tasa más elevada se sitúa en el grupo de edad de 95 y más años tanto en los hombres (18,2 por mil hab) como en las mujeres (11,9 por mil hab). (Figura 3).

Figura 3. Tasas específicas por edad y sexo.




Figura 4. REMs por ZBS. Hombres.  
Aragón y Zaragoza capital




Figura 5. REMs por ZBS. Mujeres.  
Aragón y Zaragoza capital




Tabla 1. ZBS con defecto de riesgo. Hombres

ZONA BÁSICA DE SALUD
Huesca Capital 3 (Pirineos)

Tabla 2. ZBS con exceso de riesgo. Hombres

ZONA BÁSICA DE SALUD
Alagón
Tarazona

Entre las mujeres no se ha encontrado ninguna zbs que presente un defecto o exceso de riesgo respecto al total de Aragón.