

**PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN PLAZAS DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN.**

Resoluciones de 16 de octubre de 2020 (B.O.A. nº 222 de 9/11/2020)

**CATEGORÍA:**

**MÉDICO DE FAMILIA DE ATENCIÓN PRIMARIA**

**ADVERTENCIAS:**

- No abra este cuestionario hasta que se le indique. Para hacerlo introduzca la mano en el cuadernillo y con un movimiento ascendente rasgue el lomo derecho (ver figura esquina inferior derecha).
- Este cuestionario consta de 110 preguntas de las cuales las 10 últimas son de reserva. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la «Hoja de Examen» entre los números 1 y 110.
- Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario solicite su sustitución.
- **IMPORTANTE:** Los aspirantes del turno de promoción interna estarán exentos de contestar a las preguntas número 1 a 10.
- **El tiempo de realización de este ejercicio es de 120 minutos tanto para el turno libre como para el turno de Promoción Interna.**
- Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor. Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las no contestadas no tendrán valoración alguna y las contestadas erróneamente restarán un tercio del valor de la respuesta correcta.
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la «Hoja de Examen» es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario.
- En cada pregunta existe una y solo una respuesta correcta.
- Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- No se permite el uso de calculadora, libros ni documentación alguna, móvil o ningún otro elemento electrónico.
- **SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR EN LA "HOJA DE EXAMEN" LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.**
- **ESTE CUESTIONARIO NO DEBERÁ SER DEVUELTO AL FINALIZAR EL EJERCICIO.**
- **TODOS LOS MÓVILES DEBERÁN ESTAR APAGADOS SU OMISIÓN PODRÁ SER MOTIVO DE EXPULSIÓN.**

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL



**1) Según el artículo 43 de la vigente Constitución Española, organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios compete a:**

- A) Los poderes públicos.
- B) El Estado de la Nación.
- C) Las Comunidades Autónomas.
- D) Ministerio competente en materia de Sanidad.

**2) Si usted lee en un artículo que existe una recomendación de tipo B para aplicar un determinado tratamiento en la práctica clínica, significa que:**

- A) Existe buena evidencia en base a la investigación para apoyar la recomendación.
- B) Existe moderada evidencia en base a la investigación para apoyar la recomendación.
- C) No existe evidencia para la recomendación.
- D) La recomendación se basa en la opinión de expertos o en un panel de consenso.

**3) ¿Cuál de los siguientes contenidos NO está incluido en la regulación de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias?**

- A) El Ejercicio de las profesiones sanitarias.
- B) La Clasificación del Personal Estatutario y sus retribuciones.
- C) La formación de los Profesionales sanitarios.
- D) El desarrollo profesional y su reconocimiento.

**4) En relación con la evaluación de la Cartera de Servicios de Atención Primaria señale cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA:**

- A) La cobertura de un determinado servicio es el cociente que se obtiene al relacionar los pacientes incluidos en dicho servicio en un tiempo determinado con el total de pacientes que atiende dicho Equipo de Atención Primaria.
- B) En la evaluación de cada servicio de cartera se relaciona el valor obtenido por la cobertura en dicho servicio con el valor técnico asignado al mismo.
- C) La Norma Técnica Mínima de cada servicio se define como el conjunto de condiciones que debe cumplir la inclusión de un determinado paciente en dicho servicio de cartera para que se considere válida, así como las aclaraciones y excepciones pertinentes.
- D) El establecimiento de valores determinados para la cobertura de los diferentes servicios tendrá en cuenta la situación de partida del Equipo de Atención Primaria en los años anteriores para establecer el objetivo a cumplir.

**5) De los cuatro principios fundamentales de la Bioética, el que más se relaciona con la seguridad del paciente es:**

- A) El principio de no maleficencia.
- B) El principio de autonomía.
- C) El principio de justicia.
- D) El principio de beneficencia.

**6) Desde GuíaSalud se realizan diversas actividades centradas en la Medicina Basada en la Evidencia. Señale la respuesta INCORRECTA:**

- A) Manuales metodológicos.
- B) Herramientas de ayuda a la toma de decisiones compartidas.
- C) Atlas de Variaciones en la Práctica Clínica.
- D) Catálogo de Guías de Práctica Clínica en el Sistema Nacional de Salud.

**7) ¿En cuál de las siguientes materias NO tiene el Estado competencia exclusiva?**

- A) Legislación sobre productos farmacéuticos.
- B) Sanidad Exterior.
- C) La organización, el funcionamiento, la evaluación, la inspección y el control de centros, servicios y establecimientos sanitarios.
- D) Bases y coordinación general de la sanidad.

8) El porcentaje de pacientes con profilaxis antibiótica adecuada en cirugía colorrectal es un indicador de:

- A) Estructura.
- B) Proceso.
- C) Resultado.
- D) Ninguno de los anteriores.

9) ¿Cuál de los siguientes Centros de Salud NO se encuentra comprendido en el sector sanitario de Barbastro?

- A) Albalate de Cinca.
- B) Castejón de Sos.
- C) Monzón Rural.
- D) Ariza.

10) En relación con el funcionamiento y organización de los equipos de Atención Primaria en Aragón señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- A) De forma general, la periodicidad de consultas de medicina de familia en aquellos municipios con consultorio local que tienen entre 101 y 200 habitantes, será de 3 días por semana.
- B) La modalidad de asistencia sanitaria en horario de atención continuada (fuera del horario habitual de funcionamiento de los centros de salud) solo se presta en los centros de salud rurales.
- C) El Coordinador Médico del Equipo de Atención Primaria es el responsable de la planificación y evaluación de las actividades de los profesionales de enfermería de dicho equipo.
- D) Únicamente el personal facultativo del Equipo de Atención Primaria puede ser nombrado Coordinador Médico del mismo.

11) Para la realización del diagnóstico de asma inducido por ejercicio físico, ¿a partir de qué porcentaje de caída del FEV1 con respecto al valor previo, medido 30 minutos después del ejercicio y comparado con el FEV1 inicial, se considera dicho diagnóstico?

- A) Por encima del 5%.
- B) Por encima del 8%.
- C) Por encima del 10%.
- D) Por encima del 7%.

12) ¿Cuál es la causa más frecuente de obstrucción nasal aguda en los adultos?

- A) La dismorfia septal.
- B) Rinitis víricas.
- C) Rinitis colinérgica.
- D) Rinitis alérgicas.

13) En el contexto de los ensayos clínicos señale la respuesta INCORRECTA respecto al número necesario de pacientes a tratar (NNT):

- A) El NNT indica cuántos pacientes sería necesario tratar para evitar una enfermedad, fallecimiento o efecto secundario.
- B) El NNT es el inverso de la Reducción Absoluta del Riesgo.
- C) Cuanto mayor es el NNT mayor es el efecto del fármaco y su impacto coste-efectivo.
- D) Cuanto menor es el NNT mayor es la eficacia del fármaco probado en un ensayo clínico.

14) Son todas las siguientes contraindicaciones absolutas de tratamiento con anticoagulantes orales, EXCEPTO:

- A) Diátesis hemorrágica.
- B) Alergia al fármaco.
- C) Trastornos de la marcha.
- D) Hemorragia activa.

**15) Sobre la prueba de la tuberculina señale la afirmación INCORRECTA:**

- A) Actualmente, el tipo de antígeno que se utiliza en la tuberculina es el derivado proteico purificado (PPD, *purified protein derivative*).
- B) Una limitación importante es la falta de sensibilidad de la prueba en pacientes inmunodeprimidos.
- C) Es necesario tener en cuenta también que un resultado negativo no descarta la infección, puesto que pueden transcurrir hasta 8 semanas hasta obtener un resultado positivo, el llamado efecto *booster*.
- D) En España se considera positiva la prueba de la tuberculina cuando la induración es mayor de 5 mm. en caso de personas no vacunadas previamente.

**16) Según la Guía de Atención Sanitaria a la Mujer Víctima de Violencia Doméstica en el Sistema de Salud de Aragón, respecto a las normas para la entrevista clínica a la mujer ante sospecha de maltrato, señale la actuación INCORRECTA:**

- A) Observar las actitudes y estado emocional.
- B) Verificar el testimonio de la mujer hablando con su entorno social.
- C) Alertar a la mujer de los riesgos y aceptar su elección.
- D) Abordar directamente el tema de la violencia.

**17) En un estudio sobre las causas del cáncer de pulmón se escogió un grupo de individuos con la enfermedad y un grupo libres de ella, comparándose los antecedentes de tabaquismo en ambos grupos. ¿Cómo clasificaría este estudio?**

- A) Casos y controles.
- B) Transversal.
- C) Ensayo clínico.
- D) Cohortes retrospectivas.

**18) Atendiendo a las indicaciones del programa de vigilancia y prevención de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria y de optimización del uso de antibióticos de la Comunidad Autónoma de Aragón (IRASPROA), ¿cuál sería el tratamiento de elección del chancro blando o chancroide?**

- A) Azitromicina 1 g vía oral dosis única.
- B) Penicilina G benzatina intramuscular 2,4 millones unidades internacionales en dosis única.
- C) Doxiciclina 100 mg/12 h durante 21 días.
- D) Aciclovir vía oral 400 mg/8 h durante 7-10 días.

**19) Con respecto a la psoriasis, señale la respuesta correcta:**

- A) La psoriasis *guttata* se presenta sobretodo en ancianos.
- B) Una variante de la psoriasis pustulosa palmoplantar es la aguda generalizada de Von Zumbusch.
- C) La psoriasis inversa se caracteriza por la presencia de placas rojas, delgadas y bien delimitadas que afectan sobre todo al cuero cabelludo.
- D) La artritis psoriásica afecta a las articulaciones siguiendo múltiples patrones, pero respeta las articulaciones interfalángicas distales.

**20) De las siguientes respuestas en relación a las habilidades en comunicación, señale la respuesta correcta:**

- A) La parte no visible del conflicto no suele ser importante.
- B) La parte no visible de un conflicto suele referirse a creencias, autoestima o intereses no expresados.
- C) Solamente se puede negociar sobre posiciones expresadas por las partes.
- D) El acercamiento se refiere siempre a las posturas de las partes.

**21) Respecto a la serología de la sífilis, ¿qué afirmación NO es verdadera?**

- A) En las pruebas no treponémicas, la prueba VDRL tiene un porcentaje de positividad del 75% en sífilis primaria.
- B) Títulos >1/16 en las pruebas no treponémicas indican infección activa.
- C) En las pruebas treponémicas el enzimoimmunoanálisis detecta IgM a partir de la 2ª semana de infección.
- D) En las pruebas treponémicas, la prueba FTA-ABS tiene una sensibilidad cercana al 85% en sífilis primaria.

**22) De las infecciones de transmisión sexual que cursan con úlcera genital, ¿cuál NO se manifiesta con adenopatías?**

- A) Sífilis.
- B) Chancroide.
- C) Linfogranuloma inguinal.
- D) Linfogranuloma venéreo.

**23) Sobre las prostatitis NO es cierto que:**

- A) Los gérmenes que con más frecuencia causan la prostatitis aguda son los gram negativos, especialmente la Escherichia coli.
- B) La etiopatogenia de la prostatitis crónica no bacteriana es desconocida.
- C) El tacto rectal está contraindicado en la prostatitis aguda.
- D) El tratamiento de la prostatitis crónica bacteriana se realiza con los mismos antibióticos utilizados en la prostatitis aguda bacteriana.

**24) Con respecto al concepto de sobrediagnóstico de cáncer, según el Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud (PAPPS), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?**

- A) Se trata de un error diagnóstico.
- B) Se trata de un falso negativo.
- C) Se realiza en la fase asintomática de la enfermedad.
- D) No tiene especiales repercusiones en el paciente.

**25) Señale la respuesta INCORRECTA respecto al hipotiroidismo subclínico:**

- A) La causa más frecuente es el tratamiento deficitario.
- B) La tiroiditis crónica autoinmune causa hasta el 50%.
- C) La mejor evidencia actual sugiere que con una TSH > 5 mU/l es el umbral para iniciar tratamiento con T<sub>4</sub>.
- D) Antes de prescribir T<sub>4</sub>, hay que descartar otras causas de aumento de TSH.

**26) En relación al tratamiento de la diabetes tipo 2 en un paciente con insuficiencia renal crónica, señale la correcta:**

- A) Con Filtrado Glomerular (FG) ≤ 45 se puede iniciar cualquier iSGLT2.
- B) Con FG < 50 se debe reducir la dosis de metformina a la mitad.
- C) Con FG < 20 se debe suspender metformina.
- D) Una buena opción es asociar iDPP4 con arGLP1 por su efecto protector cardiovascular.

**27) Atendiendo a las indicaciones del Programa de Vigilancia y Prevención de Infecciones Relacionadas con la Asistencia Sanitaria y de Optimización del Uso de Antibióticos de la Comunidad Autónoma de Aragón (IRASPROA), ¿cuál sería el tratamiento de elección en un paciente con bronquitis por exacerbación de EPOC con signos de infección bacteriana sin riesgo de infección por Pseudomona aeruginosa?**

- A) Moxifloxacino 400mg/24h durante 5 días.
- B) Levofloxacino 500 mg/12h durante 7 días.
- C) Amoxicilina-clavulánico 500 ó 875-125 mg/8h durante 5 días si evolución favorable.
- D) Amoxicilina 500-1000mg/8h durante 7 días mas Azitromicina 500/24h durante 3 días.

**28) Una de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA en relación con el genograma:**

- A) El genograma es la representación gráfica del desarrollo familiar en un momento determinado y no debe ser modificado una vez construido.
- B) Los problemas psicosociales, las crisis de desarrollo, los procesos crónicos y las personas mayores con afecciones que producen inmovilidad y dependencia son las causas que más se benefician del uso del genograma.
- C) El genograma generado por ordenador es el soporte ideal, permitiendo que aparezca en la pantalla la sucesión cronológica de las vicisitudes de la familia a lo largo del tiempo.
- D) El genograma es un instrumento imprescindible para el estudio de las familias que tienen en su seno un paciente con una enfermedad crónica, inmovilizado o en situación terminal.

**29)Cuál de las siguientes definiciones en relación al tabaquismo NO es correcta según la OMS:**

- A) Fumador es todo individuo que haya fumado diariamente durante el último mes cualquier cantidad de cigarrillos.
- B) No fumador es todo individuo que nunca ha fumado cigarrillos al menos durante un mes de forma diaria.
- C) Fumador es todo individuo que haya fumado diariamente durante el último mes al menos 5 cigarrillos.
- D) Ex fumador es todo individuo que siendo previamente fumador se mantiene al menos 12 meses sin fumar.

**30) Usted atiende una población de 10.000 personas con una prevalencia de cáncer colorrectal de 5 por cada 1.000. Dispone del test de SOH que tiene una sensibilidad y una especificidad del 90%. ¿Cuántos enfermos detectará este test?**

- A) 45.
- B) 50.
- C) 90.
- D) 10.

**31) Según los datos recogidos en el III Plan de Adicciones de la Comunidad Autónoma de Aragón, señale la respuesta INCORRECTA:**

- A) La edad de inicio en el alcohol se sitúa en torno a los 16 años.
- B) El cannabis es la tercera droga más extendida entre estudiantes de 14 a 18 años.
- C) El consumo de alcohol entre estudiantes de secundaria comúnmente es en forma de atracones (botellón).
- D) Es mayor la proporción de estudiantes de secundaria que fuman cada día entre aquellos que conviven con algún fumador.

**32) ¿Cuál es el porcentaje de pérdida de peso en pacientes con obesidad que genera un beneficio comprobado para su salud por la disminución de las comorbilidades asociadas, a conseguir en un periodo de 6 meses?**

- A) Menor de 5%.
- B) Entre el 5% y el 15%.
- C) Como mínimo el 20%.
- D) Como mínimo el 25%.

**33) En cuál de los siguientes supuestos los adhesivos tisulares son una buena alternativa para el cierre de las heridas:**

- A) Heridas que requerirían una sutura de grosor de 4/0 o más fina.
- B) Lesiones localizadas en el borde pigmentado de los labios.
- C) Lesiones con afectación de las mucosas.
- D) Traumatismos con laceraciones estrelladas.

**34) En relación con la Clasificación de la FDA sobre la seguridad de los fármacos en el embarazo, señale la respuesta correcta:**

- A) Categoría A: contraindicados en el embarazo (los riesgos potenciales superan los posibles beneficios).
- B) Categoría B: indicios de riesgo fetal (usar sólo en caso de no haber alternativa).
- C) Categoría C: No puede descartarse riesgo fetal. Su utilización debe realizarse valorando beneficio/riesgo.
- D) Categoría D: indicados en el embarazo (estudios controlados no han demostrado riesgo para el feto).

**35) En las anemias microcíticas, señale la respuesta correcta:**

- A) En la anemia ferropénica la ferritina esta alta.
- B) En la Beta talasemia el índice de saturación de la transferrina está muy bajo.
- C) En las producidas por enfermedad crónica el índice de saturación de la transferrina está muy alto.
- D) En la anemia ferropénica el índice de saturación de la transferrina está bajo.

**36) Entre las recomendaciones del Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud (PAPPS) 2020 para la persona mayor se encuentra:**

- A) Se aconseja el uso de fármacos estimulantes del apetito (megestrol, dronabinol) por su eficacia.
- B) Se recomienda el cribado de déficits vitamínicos y la administración de complementos vitamínicos en mayores asintomáticos con factores de riesgo.
- C) Se aconseja el uso de polivitamínicos de forma rutinaria.
- D) La ingesta de fibra debe ser 25-35 g/día, obtenida de vegetales, frutas, legumbres y cereales integrales.

**37) Indique la respuesta INCORRECTA en relación a la hipertensión arterial (HTA):**

- A) La AMPA tiene la ventaja de detectar los pacientes con patrón *dipper*.
- B) Los factores relacionados con el aumento de la prevalencia de HTA de bata blanca son la edad, el sexo femenino y ser no fumador.
- C) Las mediciones fuera de consulta mediante MAPA o AMPA tienen un poder pronóstico cardiovascular y cerebrovascular superior al de las mediciones en consulta.
- D) Una de las ventajas de la AMPA es la delimitación del sesgo del observador.

**38) Paciente de 25 años con un IMC de 31 que acude a consulta con la firme idea de reducir su peso. Le dice que ha oído que los azúcares libres están ligados al aumento de peso y le pregunta qué son exactamente esos azúcares libres:**

- A) Son los azúcares naturalmente presentes en la fruta y la verdura y que no producen aumento de peso, por lo que puede consumirlos sin problemas.
- B) Son los monosacáridos y los disacáridos añadidos a los alimentos por los fabricantes, los cocineros o los consumidores, así como los azúcares presentes de forma natural en la miel, los siropes, los zumos de fruta y los concentrados de jugo de fruta.
- C) Son únicamente los azúcares añadidos por el fabricante, el cocinero o el consumidor y puede consumirlos siempre que no superen el 20% de la ingesta calórica diaria.
- D) Son únicamente los azúcares de la miel, siropes, zumos de fruta y concentrados de vegetales y no deben superar el 10% de la ingesta calórica diaria.

**39) Una de las siguientes afirmaciones NO es correcta en relación con el cáncer de mama, según la actualización del grupo de Prevención del Cáncer del Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud (PAPPS) 2020:**

- A) En las mujeres de 40 a 49 años con riesgo medio de cáncer de mama, se debería recomendar la mamografía de cribado cada dos años.
- B) En las mujeres de 50 a 69 años con riesgo medio de cáncer de mama, se debería recomendar la mamografía de cribado cada dos años.
- C) En las mujeres de 70 a 74 años con riesgo medio de cáncer de mama, se debería recomendar la mamografía de cribado cada dos años.
- D) El médico de familia tiene que identificar a las mujeres con riesgo elevado (antecedentes personales y/o con antecedentes familiares de cáncer hereditario asociado a mutaciones BRCA) y derivar a centros especializados y/o a la Unidad de Consejo Genético.

**40) En cuanto a la interpretación del PSA, señale la respuesta INCORRECTA:**

- A) Es un marcador órgano-específico, pero no cáncer-específico.
- B) Se recomienda derivar a urología ante un PSA entre 4 y 10 ng/ml con cociente PSA libre/total > 20-25%.
- C) Se considera útil para seguimiento de recidivas tras prostatectomía.
- D) Los inhibidores de la 5-alfa reductasa pueden disminuir sus niveles hasta un 50% tras 6-12 meses de tratamiento.

**41) De las siguientes combinaciones de fármacos antihipertensivos indique la de uso MENOS recomendable, pues su empleo requiere mucha precaución:**

- A) ARA II + betabloqueante.
- B) Inhibidor de la renina + diurético tiazídico.
- C) Antagonista del calcio no dihidropiridínico + betabloqueante.
- D) IECA + betabloqueante.

**42) Si una prueba diagnóstica tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad del 90% y se aplica a una población de 200 individuos, con una prevalencia de la enfermedad del 50%, ¿cuál será el valor predictivo positivo?**

- A) 60%.
- B) 70%.
- C) 80%.
- D) 90%.

**43) De entre las siguientes, ¿qué vacuna estaría contraindicada en una mujer embarazada?**

- A) Vacuna contra la parotiditis.
- B) Vacuna contra la polio (parenteral).
- C) Vacuna antimeningocócica.
- D) Vacuna antirrábica.

**44) Respecto al cribado de retinopatía diabética en Atención Primaria realizado con retinografía no midriática, señale la afirmación INCORRECTA:**

- A) No permite la detección de las complicaciones maculares de la diabetes mellitus.
- B) En algunas ocasiones la retinografía no es valorable por la presencia de cataratas.
- C) La presencia de signos de retinopatía diabética moderada supone la derivación y control por Oftalmología.
- D) Está dirigido a pacientes diabéticos tipo II o mujeres con diabetes gestacional pero no a los diabéticos tipo I.



**45) Mujer de 32 años que desea gestación sin haberlo conseguido en los dos últimos años, presenta un IMC de 30 además de hirsutismo y períodos de amenorrea frecuentes. Su principal sospecha diagnóstica es:**

- A) Hipotiroidismo.
- B) Síndrome de Cushing.
- C) Hipogonadismo.
- D) Síndrome del ovario poliquístico.

**46) Un niño de 3 años se ha caído a la piscina. Una unidad de Soporte Vital Avanzado ya está en camino. Hasta su llegada, su compañero y usted disponen del material básico de urgencias que incluye medicación, DESA, cánulas orofaríngeas, bolsa mascarilla y bala de O2. Evalúa al niño, abre vía aérea y comprueba que se encuentra en parada respiratoria y procede a iniciar RCP siguiendo las recomendaciones ERC de 2021:**

- A) Alternando 15 compresiones y 2 insuflaciones desde el principio ante la ausencia de signos vitales.
- B) Comenzando por 5 insuflaciones y en ausencia de signos vitales sigue alternando 30 compresiones y 2 insuflaciones.
- C) Comenzando por 5 compresiones y en ausencia de signos vitales seguir por 15 compresiones y luego 2 insuflaciones por cada 15 compresiones.
- D) Primero 5 insuflaciones y ante la ausencia de signos vitales seguir con 15 compresiones y luego 2 insuflaciones por cada 15 compresiones.

**47) ¿Cuál de los siguientes fármacos ocasiona con mayor frecuencia clínica depresiva?**

- A) Neurolépticos.
- B) Diuréticos tiazídicos.
- C) Beta-bloqueantes.
- D) Antiepilépticos.

**48) Son causas de extinción del derecho al subsidio por incapacidad temporal, todas las situaciones siguientes, EXCEPTO:**

- A) Por agotamiento del plazo establecido para la situación de incapacidad temporal.
- B) Por jubilación.
- C) Por propuesta de la mutua correspondiente.
- D) Por haber sido dado de alta el trabajador, con o sin declaración de incapacidad permanente.

**49) La secuencia de acciones paso a paso para el tratamiento de un adulto víctima de obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño es:**

- A) Animar a que tosa, administrar hasta 5 compresiones abdominales, realizar hasta 5 golpes interescapulares, maniobras de RCP si la víctima pierde la conciencia.
- B) Animar a que tosa, administrar hasta 5 golpes interescapulares, realizar hasta 5 compresiones abdominales, maniobras de RCP si la víctima pierde la conciencia.
- C) Administrar hasta 5 golpes interescapulares, animar a que tosa, realizar hasta 5 compresiones abdominales, maniobras de RCP si la víctima pierde la conciencia.
- D) Animar a que tosa, administrar hasta 5 golpes interescapulares, realizar hasta 5 compresiones abdominales en bipedestación, realizar hasta 5 compresiones abdominales en decúbito supino.

**50) Entre las pautas de tratamiento de la infección tuberculosa latente están:**

- A) Isoniazida + rifampicina durante 3 meses en casos de posible incumplimiento de una pauta larga.
- B) Pirazinamida 6 meses.
- C) Rifampicina durante 4 meses: alternativa si hay intolerancia a isoniazida o en tuberculosis del caso índice resistente a isoniazida.
- D) Isoniazida 9 meses.

**51) Las reglas de Ottawa son una serie de indicaciones que recomiendan la exploración radiológica tras sufrir un traumatismo de tobillo. Señale el enunciado NO incluido en las mencionadas indicaciones:**

- A) Dolor en el escafoides tarsiano.
- B) Dolor selectivo a la palpación de cara posterior y distal del maléolo peroneo.
- C) Dolor selectivo a la palpación de cara posterior y distal del maléolo tibial.
- D) Dolor selectivo en la base del primer metatarsiano.

**52) Un paciente que en el test de Fagerström obtiene una puntuación de 8 podemos decir que:**

- A) Su grado de dependencia es leve.
- B) Su motivación es alta.
- C) Su motivación es baja.
- D) Su grado de dependencia es severa.

**53) Si el Valor Predictivo Positivo de una mamografía de cribado de cáncer de mama con resultado BIRADS 5 (lesión altamente sugestiva de malignidad) es del 70% quiere decir que su paciente:**

- A) Tiene una probabilidad del 70% de padecer cáncer de mama.
- B) Tiene una probabilidad del 30% de padecer cáncer de mama.
- C) Tiene una probabilidad de entre 30 y 70% de padecer cáncer de mama.
- D) Tiene una probabilidad del 40% de padecer cáncer de mama.

**54) De los siguientes, ¿cuál es el tratamiento más adecuado para la prevención de la cefalea tensional?**

- A) Amitriptilina 10-75 mg/24h.
- B) Lorazepam 1 mg/24h.
- C) Gabapentina 300 mg/12h.
- D) Flunarizina 5 mg/24h.

**55) ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo NO se incluye en la estimación de riesgo de tromboembolismo en fibrilación o flutter auriculares no valvulares mediante el índice CHA2DS2-VASC?**

- A) Hipertensión arterial.
- B) Edad > 75 años.
- C) Diabetes Mellitus.
- D) Hipercolesterolemia.

**56) Estando de guardia en un pequeño consultorio rural del Pirineo acude una familia de turistas muy asustados porque tras una excursión han detectado que a su hijo adolescente le ha picado una garrapata y que han leído en internet que puede transmitir enfermedades graves. ¿Cómo debe actuar?**

- A) Extracción de la garrapata echando alcohol en un algodón y estirando, desinfección y tratamiento posterior con doxiciclina.
- B) Extracción de la garrapata con aceite y estirando con pinzas romas, desinfección posterior y auto-observación un mes.
- C) Extracción cuidadosa de la garrapata con pinzas romas, desinfección posterior y auto-observación durante un mes.
- D) Extracción cuidadosa de la garrapata con pinzas romas, desinfección, serología de enfermedad de Lyme y doxiciclina.

**57) Existen distintos métodos para transmitir conocimientos y habilidades en el campo de la educación para la salud. Señale la respuesta INCORRECTA:**

- A) Según la relación que se establece entre el educador y los educandos, puede ser bidireccional o unidireccional.
- B) En el modelo unidireccional quien recibe el mensaje tiene la posibilidad de discutir su contenido.
- C) Según la relación temporo-espacial entre el educador y el educando, la acción educativa puede ser directa o indirecta.
- D) Las charlas, la discusión en grupo o el diálogo son ejemplos de intervención educativa directa.

**58) ¿Cuál de los siguientes test NO es útil para ayudar a conocer la intensidad de la sobrecarga del cuidador de un paciente dependiente, así como el grado de apoyo social y familiar que recibe?**

- A) Cuestionario de Pfeiffer.
- B) Cuestionario de Mos.
- C) Escala de Zarit.
- D) Cuestionario de Apgar.

**59) ¿Cuál de los siguientes enunciados se corresponde con el término de prevención cuaternaria?**

- A) Actividades dirigidas a evitar la aparición o disminuir la prevalencia de factores de riesgo en individuos sanos.
- B) Intervenciones encaminadas a evitar o reducir los riesgos del contacto con los servicios sanitarios.
- C) Actividades de rehabilitación y reinserción social en pacientes con enfermedades clínicamente manifiestas.
- D) Actividades de cribado y de vacunación en personal sanitario con riesgo de enfermedades infecciosas.

**60) Respecto a los acúfenos señale la respuesta INCORRECTA:**

- A) Su incidencia aumenta con la edad, sobre todo a partir de los 50 años.
- B) En más de la mitad de los casos no se llega a determinar la causa.
- C) La mayoría de los pacientes que consultan por acúfenos pulsátiles se deben a la transmisión del sonido del flujo carotídeo a través del hueso temporal.
- D) En función de su frecuencia, intensidad y sonoridad podemos relacionarlos con su gravedad y su etiología.

**61) Si un paciente como complicación del cuadro coronario agudo, presenta insuficiencia cardíaca congestiva, con estertores basales bilaterales, diríamos que presenta un estado clínico:**

- A) Killip I.
- B) Killip II.
- C) Killip III.
- D) Killip IV.

**62) En relación con las técnicas de diagnóstico rápido en infecciones respiratorias en Atención Primaria, señale la opción INCORRECTA:**

- A) Para que se consideren validas es suficiente un Valor Predictivo Negativo del 75%.
- B) En el adulto se recomienda realizar la técnica de diagnóstico rápido de detección de antígeno de estreptococo Beta-hemolítico del grupo A en una faringitis si existen al mismo tiempo dos o más criterios de Centor.
- C) En las técnicas de diagnóstico rápido de detección de antígeno de influenza virus, el frotis nasofaríngeo es más sensible que el frotis nasal.
- D) La validez del test rápido de detección de antígeno de estreptococo Beta-hemolítico del grupo A es menor en casos de faringitis crónica.

**63) De las siguientes, indique la respuesta INCORRECTA en relación con la Enfermedad Hepática Grasa No Alcohólica (EHGNA):**

- A) El tratamiento de primera línea son las medidas higiénico-dietéticas y de estilo de vida, y la pérdida de peso.
- B) El objetivo es frenar la progresión a cirrosis o a carcinoma hepatocelular (CHC) y la reducción de la mortalidad asociada a la EHGNA.
- C) Sólo el tratamiento con fármacos ha demostrado detener la progresión de la enfermedad.
- D) La característica histológica más importante asociada con enfermedad avanzada y mortalidad a largo plazo es la fibrosis.

**64) Paciente en tratamiento con anticoagulante antivitaminas K con INR objetivo 2-3, presenta buenos controles los últimos 6 meses, pero hoy acude a control y su INR es de 1,2. ¿Cuál sería la recomendación más apropiada?**

- A) No modificar pauta y citar en 7 días para control.
- B) Aumentar Dosis Total Semanal (DTS) un 10-20% y citar en 7 días para control.
- C) Aumentar DTS 5-10% y citar en 14 días.
- D) Aumentar DTS 5% y citar en 7 días.

**65) Entre las causas más frecuentes de anemia ferropénica se encuentran las siguientes, EXCEPTO:**

- A) Déficit dietético en ancianos.
- B) Enfermedades hematológicas en los niños.
- C) Pérdida digestiva en varón adulto.
- D) Pérdida ginecológica en mujer fértil.

**66) Niño de 2 años que acude por la noche al servicio de atención continuada de su centro de salud por presentar, de forma brusca, afonía, tos perruna y estridor. Señale la respuesta INCORRECTA:**

- A) El germen más frecuentemente relacionado es el *Haemophilus influenzae* tipo B.
- B) Es fundamental valorar la gravedad del cuadro considerando parámetros como el estridor, el tiraje, el nivel de conciencia o la coloración de la piel.
- C) En casos leves el tratamiento de elección es la dexametasona.
- D) En casos graves el tratamiento de elección es la adrenalina nebulizada.

**67) Está de guardia cuando acude un lactante de 7 meses por fiebre de unas 12 horas de evolución de hasta 40° de temperatura rectal. No tiene foco aparente. El bebé está despierto, se calma cuando papá lo tiene en brazos, la hidratación de piel y mucosas es buena y la exploración general es anodina, el test de orina es negativo. Sus padres están muy nerviosos por esa temperatura y piden que les recete algún "antibiótico fuerte". ¿Cuál es la actitud más correcta?**

- A) Según la OMS esa temperatura indica fiebre alta por lo que está indicado comenzar con un antibiótico empírico (amoxicilina) y control clínico a las 24h.
- B) El 90% de las fiebres sin foco en lactantes mayores de 6 meses son de origen vírico por lo que procede realizar tratamiento sintomático y control clínico a las 24h.
- C) Según la OMS esa temperatura indica fiebre alta y se deben solicitar cultivos de sangre y orina por el riesgo de bacteriemia oculta.
- D) Es un cuadro de hiperpirexia del lactante y procede remitir a urgencias hospitalarias.

**68) Señale el enunciado INCORRECTO sobre la meningitis bacteriana aguda en adultos:**

- A) La meningitis bacteriana puede ser adquirida en la comunidad o asociada a la atención médica.
- B) Las principales causas de meningitis bacteriana adquirida en la comunidad en adultos en los países desarrollados son el *Streptococcus pneumoniae* y la *Neisseria meningitidis*.
- C) La tríada clásica de meningitis bacteriana aguda (fiebre, rigidez de nuca y estado mental alterado) se presenta hasta en el 80% de los casos.
- D) Los pacientes de edad avanzada se presentan con más frecuencia con la tríada clásica que los pacientes más jóvenes.

**69) ¿Cuál de estas afirmaciones en relación a la clasificación de las recomendaciones de las intervenciones en salud es INCORRECTA?**

- A) Nivel A: Existe una evidencia muy clara para recomendar la realización de la medida en un examen periódico de salud.
- B) Nivel B: Existe una evidencia valorable para recomendar la realización de la medida en un examen periódico de salud.
- C) Nivel D: Existe una evidencia valorable para recomendar la exclusión de la medida en un examen periódico de salud.
- D) Nivel E: Existe una evidencia insuficiente para recomendar la realización de la medida en un examen periódico de salud, pero puede aconsejarse en circunstancias especiales.

**70) Con respecto a la Fiebre de Origen Desconocido (FOD) son ciertos los siguientes enunciados, EXCEPTO:**

- A) La FOD clásica es la temperatura corporal  $\geq 38^{\circ}$  C medida por vía rectal durante  $> 3$  semanas, sin causa identificable después de 3 días de internación en el hospital o de  $\geq 3$  consultas ambulatorias.
- B) Las principales causas de FOD en adultos son las infecciones, conectivopatías y los tumores.
- C) El pronóstico de FOD en niños es peor que en adultos.
- D) Las principales causas de FOD en pediatría son las infecciosas y la artritis crónica juvenil.

**71) Los resultados de una gasometría nos muestran: pH alto; PaCO<sub>2</sub> normal; HCO<sub>3</sub> muy alto. Con estos datos usted diagnosticaría:**

- A) Acidosis metabólica.
- B) Acidosis respiratoria.
- C) Alcalosis metabólica.
- D) Alcalosis respiratoria.

**72) ¿En cuál de los siguientes fármacos habría que esperar un tiempo mínimo de 24 horas entre la última toma y la realización de una espirometría?**

- A) Ipratropio.
- B) Terbutalina.
- C) Salbutamol.
- D) Tiotropio.

**73) Sobre la prescripción inadecuada en el anciano, señale la respuesta correcta:**

- A) Dentro de las herramientas para la detección de la prescripción inadecuada en ancianos, los criterios STOPP/START son de los más utilizados.
- B) La polifarmacia es el consumo de 8 o más fármacos.
- C) Los fármacos más habituales implicados en la prescripción inadecuada en los ancianos son las estatinas.
- D) La proporción de personas mayores con polifarmacia en nuestro medio está en torno a un 10%.

**74) En cuanto a la asignación aleatoria de un ensayo clínico, señale la respuesta INCORRECTA:**

- A) Tiende a asegurar la comparabilidad de los grupos.
- B) Es esencial que se produzca después de que el paciente haya sido incluido en el estudio.
- C) La comparabilidad de los grupos disminuye cuanto mayor es el tamaño de la muestra.
- D) Debe realizarse de manera que no influyan las preferencias del investigador ni las del paciente.

75) ¿Cómo clasificaríamos según la GEMA el asma de un paciente con síntomas diarios, uso de broncodilatadores de corta duración diario, síntomas nocturnos 3 veces por semana, 3 exacerbaciones en un año y un FEV1/PEF del 70% con una reversibilidad mayor del 30%?

- A) Asma persistente grave.
- B) Asma persistente moderada.
- C) Asma persistente recidivante.
- D) Asma persistente leve.

76) El análisis que hace una evaluación en la que se consideran los costes en relación con los resultados clínicos de un programa o tratamiento se llama:

- A) Análisis coste-efectividad.
- B) Análisis de minimización de costes.
- C) Análisis coste-utilidad.
- D) Análisis coste-beneficio.

77) ¿Cuál de los siguientes grupos terapéuticos considera MENOS indicado en el tratamiento de un paciente con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida (IC-FEr)?

- A) Inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina.
- B) Antagonistas de los receptores de mineralcorticoides/aldosterona.
- C) Bloqueadores de los canales del calcio.
- D) Bloqueadores beta.

78) En el diagnóstico diferencial entre el vértigo periférico y central ¿Cuál de los siguientes hallazgos en la anamnesis y exploración de un paciente le hará pensar en que pueda tratarse de un vértigo de origen central?

- A) Comienzo brusco, bien definido, generalmente de corta duración.
- B) Prueba de Romberg hacia el lado hipovalente.
- C) Nistagmus espontáneo de dirección variable y prolongado.
- D) Cuadro clínico severo con mucho malestar e intensa reacción vegetativa.

79) En relación con la Enfermedad de Crohn (EC) indique la respuesta correcta:

- A) El hallazgo histológico más típico es la presencia de granulomas y la presencia de inflamación afecta solo a la mucosa del tubo digestivo.
- B) El tratamiento más importante en la inducción de la remisión de los brotes de EC son los corticoides orales.
- C) El pronóstico de la EC diagnosticada en edad avanzada suele ser peor porque, con más frecuencia, afecta a más áreas del tubo digestivo.
- D) La mesalazina es el tratamiento de elección en la fase de remisión ya que ha demostrado beneficio para evitar futuras recaídas.

80) La agitación psicomotriz es un estado de hiperactividad física y mental descontrolada de gran intensidad. Señale la afirmación INCORRECTA:

- A) Debe sospecharse organicidad en todo cuadro de inicio agudo o subagudo o de aparición en adultos mayores o pacientes sin antecedentes psiquiátricos.
- B) La alteración del nivel de conciencia y desorientación temporo-espacial apuntan a una causa orgánica como origen de la agitación.
- C) Las alucinaciones visuales son un signo bastante específico de agitación de origen psiquiátrico.
- D) En la agitación orgánica el haloperidol es uno de los tratamientos de primera elección por su alta potencia, seguridad y eficacia.

**81) La tasa de letalidad de una enfermedad es una forma de expresar su:**

- A) Contagiosidad.
- B) Virulencia.
- C) Patogenicidad.
- D) Tasa de ataque.

**82) ¿Cuál de las siguientes recomendaciones del Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud 2020 (PAPPS) sobre el estilo de vida es correcta?**

- A) La periodicidad mínima de la detección del consumo de alcohol debe ser una vez cada 2 años a partir de los 18 años.
- B) El cuestionario de elección para la detección del síndrome de dependencia alcohólica es el AUDIT-10.
- C) Se recomienda reinterrogar sobre el consumo de tabaco a las personas mayores de 25 años, aunque se tenga constancia en la historia clínica de que nunca han fumado.
- D) Se recomienda utilizar los marcadores biológicos de consumo de alcohol como instrumentos de cribado.

**83) En las personas con VIH no diagnosticado que acuden a la consulta, debe considerarse la realización de la prueba del VIH si padece una de las siguientes enfermedades, EXCEPTO:**

- A) Síndrome mononucleósico.
- B) Dermatitis seborreica/exantema.
- C) Otitis externa aguda circunscrita.
- D) Displasia de cérvix.

**84) Señale el enunciado verdadero sobre al tratamiento del neuroma de Morton:**

- A) Se recomienda el uso de zapato ancho, con tacón bajo y material rígido.
- B) Las ortesis plantares con barras antecapitales pueden aliviar los síntomas.
- C) Las infiltraciones con corticoides aportan solución a largo plazo de los síntomas en un 30% de los casos.
- D) Más de un 85 % de los pacientes deciden someterse a cirugía.

**85) ¿Cuál de las siguientes es la principal causa de anafilaxia en nuestro medio?:**

- A) Alimentos.
- B) Picadura de insectos.
- C) Factores físicos.
- D) Fármacos y medios diagnósticos.

**86) Durante la entrevista clínica con el paciente, señale la respuesta INCORRECTA:**

- A) Se debe recoger información precisa, eficaz y con una clara percepción del problema del paciente.
- B) Se debe crear un clima de confianza y no se deben dar las instrucciones por escrito.
- C) En el adolescente se debe aprovechar el momento en el que el paciente realice una consulta por una patología para explorar otras áreas de salud.
- D) Se recomienda elogiar las conductas adecuadas.

**87) Todas estas condiciones clínicas producen una Hipoalfalipoproteinemia, EXCEPTO:**

- A) Insuficiencia Renal y Síndrome Nefrótico.
- B) Hipertiroidismo.
- C) Diabetes Mellitus tipo II.
- D) Alcoholismo crónico.

**88) Si utilizamos una tanda corta de corticoides en un paciente diabético con EPOC grave, en tratamiento con metformina a dosis medias y con controles de hemoglobina glicada inferiores a 7,5 %, la conducta más adecuada es:**

- A) Añadir glipizida.
- B) Añadir un comprimido más de metformina.
- C) Añadir insulina nocturna.
- D) Ninguna de las conductas anteriores es correcta.

**89) En cuanto a la quimioprofilaxis y manejo de contactos de la meningitis bacteriana aguda en adultos es INCORRECTO que:**

- A) Ante un contacto de meningitis, el principal factor de riesgo para desarrollar la enfermedad no es el propio estado de portador, sino, precisamente, la reciente adquisición de dicho estado.
- B) Los frotis nasofaríngeos contribuyen al manejo de los contactos y aceleran la pauta de tratamiento.
- C) En el caso de enfermedad invasora por *Haemophilus Influenzae* tipo b, la tasa de incidencia ha descendido en gran medida gracias a la vacunación sistemática.
- D) El principal objetivo de la quimioprofilaxis es reducir la transmisión a individuos susceptibles no portadores en la nasofaringe y, además, eliminar el estado de portador de los recién colonizados.

**90) Mujer de 25 años de edad que presenta desde hace dos días en su ojo derecho hiperemia ocular, dolor ocular leve y fotofobia. No hay secreción ocular mucopurulenta. Es miope y lleva lentes de contacto. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

- A) Queratitis infecciosa.
- B) Conjuntivitis aguda en portador de lentes de contacto.
- C) Conjuntivitis alérgica.
- D) Úlcera corneal recidivante.

**91) En relación al tratamiento de las dislipemias, señale la respuesta INCORRECTA:**

- A) Las estatinas son inhibidoras de la hidroximetilglutaril coenzima A (HMG-CoA).
- B) Es frecuente asociar estatinas con ezetimiba en los pacientes que no se logra un adecuado control de las cifras de colesterol solo con una estatina.
- C) Endocumab y alirocumab son Inhibidores de la PCSK9.
- D) Ezetimiba no influye en la absorción intestinal de colesterol.

**92) Con respecto al uso de antidepresivos en determinadas situaciones, indique la respuesta INCORRECTA:**

- A) El uso de trazodona es una opción para tratar el insomnio asociado a depresión.
- B) El bupropión aumenta la disponibilidad de dopamina y noradrenalina, por lo que se le considera un antidepresivo fundamentalmente activador.
- C) En pacientes polimedicados, sertralina, citalopram y venlafaxina son de preferencia por sus escasas interacciones.
- D) En pacientes con Parkinson es de elección la maprotilina.

**93) Ante un paciente al que debe atender en la vía pública, tras caída de un tejado desde 6 metros de altura, con traumatismo craneoencefálico, que presenta apertura ocular al recibir una orden verbal, respuesta verbal desorientada, pero pudiendo responder a preguntas sencillas, que obedece las órdenes que se le indican, podemos decir que presenta un Glasgow:**

- A) 10.
- B) 11.
- C) 12.
- D) 13.



**94) Con respecto al acné, señale la respuesta INCORRECTA.**

- A) El acné fulminante se presenta con mayor frecuencia en varones.
- B) El acné *conglobata* se presenta como un acné inflamatorio nóduloquístico, cicatricial con posible formación de fístulas.
- C) El acné puede ser inducido por fármacos como los esteroides orales o tópicos.
- D) A diferencia de la isotretinoína, los retinoides tópicos no tienen que suspenderse durante la gestación.

**95) Señale la respuesta INCORRECTA en relación a los estudios transversales:**

- A) Permiten estudiar varias enfermedades y factores de riesgo a la vez.
- B) Son de elección para estudiar enfermedades poco frecuentes.
- C) Los de tipo descriptivo tienden a sobrestimar la prevalencia de las enfermedades de mayor duración.
- D) Son sencillos en su diseño y ejecución.

**96) Dentro de los métodos indirectos para evaluar el grado de adherencia de un paciente a su tratamiento farmacológico, se encuentra el Test de Morisky-Green. Señale la respuesta INCORRECTA relativa al mencionado test:**

- A) Ha sido validado en una gran variedad de patologías crónicas y poblaciones.
- B) Uno de sus inconvenientes es la baja concordancia con los datos obtenidos por dispositivos electrónicos de dispensación de medicación.
- C) Se considera que el paciente es adherente al tratamiento si responde correctamente a las cuatro preguntas del test original.
- D) En 2008 se publicó una nueva versión del test con 8 preguntas, abarcando el aspecto de la infrautilización.

**97) Referente a la disfunción tiroidea por amiodarona, señale la respuesta correcta:**

- A) En áreas con suficiente aporte de yodo la incidencia de hipertiroidismo es mayor.
- B) Los casos con anti-TPO + tienen riesgo de hipotiroidismo definitivo a pesar de retirar la amiodarona.
- C) Una vez iniciado el tratamiento antiarrítmico es recomendable determinar la TSH cada 12 meses.
- D) En pacientes candidatos a tratamiento con amiodarona, antes de iniciarlo, es suficiente con la determinación de TSH.

**98) Sobre la administración de vacunas se debe tener en cuenta algunas consideraciones generales, EXCEPTO:**

- A) Se puede administrar en el mismo acto asistencial el máximo número de vacunas en diferentes lugares anatómicos.
- B) Se deben respetar los intervalos mínimos entre dosis.
- C) Dosis puesta, dosis contada.
- D) Existe un intervalo máximo entre dosis de vacuna.

**99) El Ministerio de Sanidad español definió en 2014 una cartera común básica del Sistema Nacional de Salud para el programa de cribado neonatal, que comprende varias enfermedades. Señala la que NO es:**

- A) Anemia de Fanconi.
- B) Hipotiroidismo congénito.
- C) Fenilcetonuria.
- D) Fibrosis quística.

**100) En relación a las hepatitis virales crónicas es cierto que:**

- A) Pueden ser producidas por cualquiera de los virus de la hepatitis.
- B) La elevación de las transaminasas suele correlacionarse bien con el grado de afectación histológica.
- C) Los pacientes con infección crónica por el virus de la hepatitis B que se sobreinfectan por el virus D tienen un pronóstico menos malo que si la infección por ambos virus se produce de forma simultánea.
- D) Cuanto más precoz es la infección por el virus de la hepatitis B mayor es el riesgo de evolución a cirrosis.

**101) En la hipoacusia por exposición a ruido, señale la opción INCORRECTA:**

- A) Se desarrolla de forma gradual, más rápidamente en los primeros 6-10 años de exposición al ruido.
- B) Inicialmente se afectan las altas frecuencias (4.000 a 6.000 Hz).
- C) El escotoma auditivo no se recupera en la frecuencia de 8.000 Hz.
- D) Los acúfenos suelen ser un síntoma inicial en esta patología.

**102) Se considera que alrededor del 50% de los episodios de urticaria son idiopáticos. Indique la posible causa más frecuente en el resto de los casos:**

- A) Estrés.
- B) Alimentos.
- C) Fármacos.
- D) Infecciones.

**103) En la orientación diagnóstica de un dolor abdominal, una causa frecuente es el síndrome del intestino irritable (SII). Actualmente se utilizan los criterios de Roma IV por ser los más sensibles y específicos para hacer un diagnóstico. Señale cuál de las siguientes opciones respecto a estos criterios es INCORRECTA:**

- A) Los hábitos intestinales predominantes se basan en la forma de las heces en los días con al menos una evacuación intestinal anormal.
- B) El dolor abdominal recurrente debe estar presente al menos tres días a la semana.
- C) En el SII con predominio de diarrea, más del 25% de las deposiciones corresponden a los tipos 6 ó 7 y menos del 25% de las deposiciones son de tipo 1 ó 2 de la escala de Bristol.
- D) En el SII mixto, más del 25% de las deposiciones corresponden a los tipos 1 ó 2 y más del 25% de las deposiciones corresponden a los tipos 6 ó 7 de la escala de Bristol.

**104) Atiende a un paciente oncológico que ha perdido la vía oral y está recibiendo tratamiento domiciliario por vía subcutánea de manera intermitente a través de una palomilla. De los siguientes, ¿cuál sería el fármaco de elección para administrar por vía subcutánea en el control de la fiebre?**

- A) Metamizol.
- B) Ketorolaco.
- C) Dexametasona.
- D) Paracetamol.

**105) En España, el Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C recomienda en la actualidad:**

- A) Tratar a todos los infectados independientemente del grado de fibrosis diagnosticada por elastografía.
- B) Tratar a los pacientes con grados de fibrosis  $\geq 2$ .
- C) Tratar solo a aquellos casos que presentan complicaciones.
- D) No tratar a los evolucionados ya a cirrosis.

**106) Una mujer de 75 años refiere visión borrosa de varios meses de evolución. No tiene dolor ni enrojecimiento ocular, pero comenta que cada vez ve peor los objetos lejanos y que, sin embargo, ha dejado de necesitar las gafas para cerca. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

- A) Neuritis óptica isquémica bilateral.
- B) Catarata bilateral.
- C) Glaucoma crónico simple.
- D) Degeneración macular senil.

**107) En relación a los fármacos opioides, señale la respuesta correcta:**

- A) La buprenorfina es un agonista total.
- B) El fentanilo es un agonista parcial.
- C) La oxicodeona es agonista total.
- D) Según la escalera analgésica de la OMS, se recomienda mezclar analgésicos de segundo escalón con los de tercer escalón para potenciarlos.

**108) Es característica clínica en la infección ocasionada por *Brucella* spp.:**

- A) La fiebre alta y fluctuante con sudoración profusa y artralgias.
- B) La fiebre y exantema palmo plantar.
- C) Febrícula asociada a una escara necrótica.
- D) Hay un primer episodio febril (3-5 días), apirexia de 1 semana y posteriormente se alternan períodos febriles con intervalos afebriles.

**109) ¿Cuál de las siguientes respuestas NO pertenece a la Cartera de Servicios de Atención Primaria del Sistema de Salud de Aragón?**

- A) Realización de coximetría.
- B) Consulta de terapia ocupacional.
- C) Consulta domiciliaria de enfermería de pediatría.
- D) Rehabilitación cognitiva.

**110) De los siguientes enunciados referidos a la EPOC, señale la propuesta INCORRECTA:**

- A) El estudio EPISCAN cifró la prevalencia de EPOC en población española mayor de 40 años en un 10,2%, con un infradiagnóstico del 73%.
- B) Se estima que un 80% de los pacientes con EPOC se controlan en Atención Primaria.
- C) La disnea se debe estratificar en grados según la escala *Medical Research Council* modificada (mMRC).
- D) La disnea grado 2 según la escala mMRC sin tratamiento es criterio de paciente EPOC de alto riesgo.

