

**PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN PLAZAS DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN.**

**Resolución de 4 de Abril de 2017 (B.O.A. número 80 de 28 de Abril de 2017)  
Resolución de 13 de Septiembre de 2017 (B.O.A. número 183 de 22 de Septiembre de 2017)**

Categoría:

**FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA**

**ADVERTENCIAS:**

- No abra este cuestionario hasta que se le indique.
- Este cuestionario consta de 110 preguntas de las cuales las 10 últimas son de reserva. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la "Hoja de Examen" entre los números 1 y 110.

Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario solicite su sustitución.

- El tiempo de realización de este ejercicio es de **2 horas**.
- Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor. Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las no contestadas no tendrán valoración alguna y las contestadas erróneamente restarán un tercio del valor de la respuesta correcta.
- Compruebe siempre que el número de respuestas que señale en la "Hoja de Examen" es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario.
- En cada pregunta existe una y sólo una respuesta correcta.
- Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- No se permite el uso de calculadora, libros ni documentación alguna, móvil o ningún otro elemento electrónico.

**SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR EN LA "HOJA DE EXAMEN" LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.**

**ESTE CUESTIONARIO NO DEBERÁ SER DEVUELTO AL FINALIZAR EL EJERCICIO.**

**TODOS LOS MÓVILES DEBERÁN ESTAR APAGADOS  
SU OMISIÓN PODRÁ SER MOTIVO DE EXPULSIÓN.**



## FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA

- 1 La práctica basada en la evidencia debe fundamentarse en:
  - A: Únicamente en la evidencia científica proveniente de estudios experimentales de gran tamaño.
  - B: La propia experiencia profesional.
  - C: La opinión de expertos.
  - D: La evidencia científica proveniente de estudios experimentales y otros métodos de investigación de tipo cualitativo u observacional.
  
- 2 En una población de 100 personas, el 20% tiene cierta enfermedad. Si una prueba diagnóstica tiene sensibilidad del 75% y especificidad del 96,25% ¿Cuál es el valor predictivo positivo?
  - A: 83,3%
  - B: 6%
  - C: 75%
  - D: 3%
  
- 3 De los siguientes componentes o dimensiones de calidad ¿cuál tiene en cuenta los recursos o el coste?
  - A: Eficacia.
  - B: Efectividad.
  - C: Eficiencia.
  - D: Continuidad.
  
- 4 Un fármaco diferente en su estructura química del original, pero del que se espera un efecto terapéutico y un perfil de efectos adversos similares cuando se administra a un paciente a dosis equivalentes, se denomina:
  - A: Intercambio terapéutico.
  - B: Equivalente terapéutico.
  - C: Fármaco Me too.
  - D: Fármaco genérico.
  
- 5 Según el "Decreto 23/2016, de 9 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Sanidad y del Servicio Aragonés de Salud", NO corresponde a la Dirección General de Asistencia Sanitaria, una de las siguientes competencias:
  - A: La promoción de la salud; la información y educación para la salud, y la prevención de enfermedades.
  - B: La planificación, evaluación y control de la organización asistencial en los centros y servicios del Servicio Aragonés de Salud.
  - C: La coordinación de la formación sanitaria especializada en ciencias de la salud y la formación continuada de las profesiones sanitarias.
  - D: El desarrollo e implantación de las políticas de calidad del Sistema de Salud de Aragón.

- 6 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones está recogida en la Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias?
- A: Las disposiciones de esta ley son aplicables tanto si la profesión se ejerce en los servicios sanitarios públicos como en el ámbito de la sanidad privada.
  - B: Regula los aspectos básicos de las profesiones sanitarias tituladas en lo que se refiere a su ejercicio exclusivamente por cuenta ajena.
  - C: Las profesiones sanitarias tituladas se estructuran en tres grupos: Licenciado, Diplomado y de Formación Profesional.
  - D: Corresponde a los Diplomados universitarios en Enfermería el enjuiciamiento y pronóstico de los procesos objeto de su atención.
- 7 Es uno de los principios de conducta enumerados en el artículo 54 del Estatuto Básico del Empleado Público:
- A: Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, aún cuando constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes.
  - B: Sólo aceptarán trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja, por parte de personas físicas o entidades privadas, cuando no suponga un menoscabo de intereses de terceros.
  - C: Mantendrán actualizada su formación y cualificación cuando su jornada laboral se lo permita.
  - D: Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
- 8 ¿Qué Ley recoge la creación, organización y funciones del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud?
- A: Ley 14/1986 General de Sanidad.
  - B: Ley 6/2002 de Salud de Aragón.
  - C: Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
  - D: Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal.
- 9 Señale cual de las siguientes materias NO es competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Aragón de acuerdo con lo establecido en el Artículo 71 de su Estatuto de Autonomía:
- A: Biotecnología, biomedicina y genética.
  - B: Sanidad exterior.
  - C: Sanidad y salud pública.
  - D: Ordenación farmacéutica.
- 10 Al aumentar el número de sujetos incluidos en un estudio, los sesgos:
- A: No se modifican.
  - B: Disminuyen.
  - C: Aumentan.
  - D: Desaparecen.
- 11 ¿Cuál de los siguientes gérmenes causa con mayor frecuencia los forúnculos del conducto auditivo externo?
- A: Pseudomona aeruginosa.
  - B: Aspergillus niger.
  - C: Staphylococcus aureus.
  - D: Haemophilus influenzae.

- 12 El sulcus vocalis es una anomalía que afecta fundamentalmente a:
- A: La lámina propia del pliegue vocal.
  - B: El epitelio de la cuerda.
  - C: El músculo cordal.
  - D: La apófisis vocal.
- 13 ¿Cuáles son las células diana para el virus del SIDA?
- A: Linfocitos CD4.
  - B: Mastocitos.
  - C: Histiocitos.
  - D: Linfocitos CD8.
- 14 En una aparente otospongiosis, ¿en qué caso está indicado realizar una estapedectomía/estapedotomía?
- A: En el síndrome de Gusher, o sordera DFN3.
  - B: En el síndrome de Minor o dehiscencia del conducto semicircular superior.
  - C: En la enfermedad de Lobstein (disminución de la concentración de colágeno tipo I en los huesos, ligamentos, etc.).
  - D: En la lisis de la rama larga del yunque.
- 15 Para el tratamiento medicamentoso de la enfermedad de Ménière NO debemos usar:
- A: Betahistina.
  - B: Diuréticos de asa.
  - C: Trimetazidina.
  - D: Corticoides.
- 16 ¿Cuál de las siguientes estructuras NO necesita ser extirpada en la intervención de Sistrunck?
- A: Tejido de base de lengua.
  - B: Cuerpo del hueso hioides.
  - C: Dermis adherida en un quiste infectado.
  - D: Cuerno menor del hueso hioides.
- 17 De las siguientes neuralgias, ¿cuál es la más frecuente?
- A: Neuralgia occipital o de Arnold.
  - B: Neuralgia del nervio de Jacobson.
  - C: Neuralgia del trigémino.
  - D: Neuralgia del nervio facial.
- 18 El síndrome de Eagle es:
- A: Disfunción de la articulación temporomandibular.
  - B: Algia provocada por la apófisis estiloides.
  - C: Síndrome del ganglio esfenopalatino.
  - D: Neuralgia del nervio glosofaríngeo.

- 19 Una de las siguientes consecuencias NO es causada por el SAOS:
- A: Cardiovasculares.
  - B: Traumáticas.
  - C: Neuropsíquicas.
  - D: Metabólicas.
- 20 El orificio del conducto de Jacobson da paso:
- A: A la arteria estapedial.
  - B: Al nervio piramidal.
  - C: Al nervio cuerda del tímpano.
  - D: Al nervio timpánico y a la arteria timpánica inferior.
- 21 En las hipoacusias hereditarias, ¿qué patrón de herencia es el más frecuente?
- A: Autosómica dominante.
  - B: Ligada al cromosoma X.
  - C: Autosómica recesiva.
  - D: Mitocondrial.
- 22 En relación con el melanoma maligno es FALSO que:
- A: Los nevus atípicos tienen un riesgo más alto de desarrollar melanoma.
  - B: Los melanomas neurotróficos aparecen con más frecuencia en cabeza y cuello.
  - C: El melanoma polipoide es una variante menos agresiva.
  - D: El melanoma transformador neural tiene proliferación de células fusiformes.
- 23 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA respecto a las estenosis postinflamatorias del conducto auditivo externo?
- A: La reestenosis es frecuente tras la intervención quirúrgica.
  - B: Se recomienda operar los casos bilaterales, si es necesario, interviniendo primero el oído con peor audición.
  - C: No se deben colocar implantes osteointegrados en estos pacientes.
  - D: En la cirugía, tras retirar el tejido cicatricial, es importante fresar ampliando el CAE.
- 24 En la cirugía reconstructiva utilizando colgajos libres, se considera un factor que favorece el fracaso de los mismos:
- A: La edad >70 años de los pacientes.
  - B: El tabaquismo.
  - C: Los vasos receptores utilizados.
  - D: El tipo de anastomosis realizada.
- 25 En relación con el Síndrome de Riley-Day o disautonomía familiar, es cierto que:
- A: Está asociado a la insuficiencia suprarrenal.
  - B: Se produce por toxicidad farmacológica.
  - C: Es más frecuente en mujeres.
  - D: Supone la ausencia de papilas fungiformes y caliciformes.

- 26 Las celulitis cérvico-medistínicas pueden ser consecuencia de una inoculación séptica de la cavidad bucal o de la orofaringe. Respecto a ello, señale cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA:
- A: Cursan con fiebre elevada y alteraciones hemodinámicas que hacen temer un shock séptico.
  - B: El tratamiento consiste en abrir todos los espacios celuloaponeuróticos y reseca los tejidos necróticos hasta llegar a tejido sano.
  - C: Es conveniente ligar la vena yugular interna para evitar la extensión de la infección.
  - D: Puede haber crepitación cervical.
- 27 Con respecto a los nódulos tiroideos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en relación con la Tomografía Computarizada?
- A: Es más eficaz que los ultrasonidos para su estudio.
  - B: Perjudica el uso posterior del Yodo radiactivo.
  - C: Es innecesaria para su estudio.
  - D: Es igual de útil que la gammagrafía.
- 28 En la clasificación de Ugo Fish de los paragangliomas del hueso temporal, la clase D, subclase Di3 significa que:
- A: El tumor no tiene extensión intradural.
  - B: El tratamiento de elección es la petrosectomía subtotal.
  - C: El tumor se limita a la caja timpánica.
  - D: El tumor es irreseca.
- 29 Los carcinomas escamosos de la región amigdalár:
- A: Son los segundos más frecuentes de la orofaringe.
  - B: Son más frecuentes los no queratinizantes.
  - C: Están relacionados con el virus del papiloma humano, en especial el serotipo 16.
  - D: No se ha visto relación con el uso del tabaco y el alcohol.
- 30 El síndrome de Lemierre asocia:
- A: Úlcera amigdalár y adenopatías satélites.
  - B: Amigdalitis pseudomembranosa, fiebre y rinitis.
  - C: Amigdalitis y tromboflebitis de la yugular interna.
  - D: Fiebre, amigdalitis eritematopultácea y exantema en tórax y raíz de extremidades.
- 31 La lesión más frecuente de la punta de peñasco (ápex petroso) es:
- A: Colesteatoma congénito.
  - B: Neurinoma del trigémino.
  - C: Granuloma de colesterol.
  - D: Mucocelo.
- 32 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es cierta respecto del glioma nasal?
- A: Es una lesión de origen congénito.
  - B: Está formado por tejido glial heterotópico.
  - C: No presenta metástasis.
  - D: Se presenta siempre con una prolongación del mismo dentro del sistema nervioso central.

- 33 ¿Cuál de las siguientes NO es una complicación en la exéresis de una ránula sublingual?
- A: Lesión del nervio lingual.
  - B: Lesión del nervio espinal.
  - C: Lesión del conducto de Warthon.
  - D: Hematoma.
- 34 La arteria palatina ascendente es rama de la:
- A: Arteria maxilar.
  - B: Arteria facial.
  - C: Arteria etmoidal anterior.
  - D: Arteria etmoidal posterior.
- 35 El agente etiológico más frecuente de las rinitis agudas es:
- A: Virus respiratorio sincitial.
  - B: Virus influenza.
  - C: Paramixovirus.
  - D: Rinovirus.
- 36 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a la mononucleosis infecciosa es FALSA?
- A: El ser humano es el único reservorio del virus.
  - B: La amigdalitis es clásicamente eritematopultácea, pero puede ser pseudomembranosa.
  - C: La hepatomegalia es más frecuente que la esplenomegalia.
  - D: Puede haber complicaciones neurológicas.
- 37 ¿Cuál es el signo más frecuente en las fracturas longitudinales del hueso temporal?
- A: Otorragia.
  - B: Parálisis facial.
  - C: Otolicuorrea.
  - D: Vértigo.
- 38 El pronóstico del carcinoma folicular de tiroides está marcado sobre todo por:
- A: Grado de ocupación tiroidea.
  - B: Edad del enfermo.
  - C: Grado de invasión de la cápsula.
  - D: Sexo del enfermo.
- 39 El reflújo faringolaríngeo:
- A: Es de predominio nocturno y en clinoposición.
  - B: Es de predominio diurno y en bipedestación.
  - C: Es más frecuente en casos de sobrepeso u obesidad.
  - D: Se caracteriza por la sensación de pirosis o dolor epigástrico.



- 40 ¿Cuáles de las siguientes papilas de la mucosa lingual NO tienen botones gustativos y no poseen finalidad gustativa?
- A: Papilas fungiformes.
  - B: Papilas caliciformes.
  - C: Papilas foliadas.
  - D: Papilas filiformes.
- 41 ¿Qué factor favorece el transporte mucociliar?
- A: Aumento de la temperatura ambiental.
  - B: Cocaína.
  - C: Benzodiazepinas.
  - D: Periodo nocturno.
- 42 Una de las complicaciones de la implantación coclear es la estimulación eléctrica del nervio facial. ¿Cómo se trata habitualmente?
- A: Desactivando electrodos o reprogramando los electrodos activos.
  - B: Reimplantando con una guía de electrodos perimodiolar.
  - C: Protegiendo el nervio con injertos óseos.
  - D: Inyección de toxina botulínica.
- 43 ¿Cuánta presión mínima subglótica hace falta para iniciar la vibración de las cuerdas vocales?
- A: 5 c.c. de agua.
  - B: 15 c.c. de agua.
  - C: 25 c.c. de agua.
  - D: 50 c.c. de agua.
- 44 Indique la respuesta INCORRECTA sobre las complicaciones en el postoperatorio inmediato de la traqueotomía:
- A: En algunos casos de aspiración está indicado realizar una gastrostomía.
  - B: El reflujo gastroesofágico es mucho más frecuente en niños.
  - C: Las bacterias más frecuentes en la infección de la herida son anaerobios.
  - D: Son más frecuentes los casos graves en el enfisema submucoso traqueal que en el subcutáneo.
- 45 El factor etiopatogénico menos probable en el divertículo de Zenker es:
- A: Contracción tónica del esfínter esofágico superior (EES).
  - B: Falta de relajación o relajación insuficiente del EES.
  - C: Incoordinación entre el EES y las contracciones faríngeas.
  - D: Efecto irritativo como consecuencia del reflujo gastroesofágico.
- 46 ¿Qué afirmación es FALSA en el síndrome de Ramsay-Hunt?
- A: Es una parálisis facial periférica.
  - B: Se puede asociar a alteraciones cocleovestibulares.
  - C: Es la 3ª causa más frecuente de parálisis facial.
  - D: Se produce por infección del virus VHS-1.

- 47 El ángulo de la válvula nasal interna normal debe ser de:
- A: 25 grados.
  - B: 45 grados.
  - C: 5 grados.
  - D: 15 grados.
- 48 ¿Dónde se encuentra el área VI cervical?
- A: Entre hioides, escotadura supraesternal y ambas carótidas.
  - B: Entre la clavícula y los bordes musculares del esternocleidomastoideo.
  - C: Encima del digástrico y debajo de la mandíbula.
  - D: Entre esternocleidomastoideo y trapecio.
- 49 ¿Cuál es la edad mínima de implantación coclear en los niños con hipoacusia prelingual?
- A: 11 meses.
  - B: 18 meses.
  - C: 15 meses.
  - D: Ninguna de las anteriores.
- 50 En los criterios diagnósticos para la migraña vestibular que marca el documento de consenso de la Bárány Society y la International Headache Society en 2013 NO se incluye:
- A: Al menos 5 episodios de síntomas vestibulares de cualquier intensidad y de cualquier duración.
  - B: Existencia de historia previa de migraña típica con o sin aura.
  - C: Una o más características de migraña en al menos el 50% de los episodios vestibulares.
  - D: Los síntomas no se atribuyen mejor a otra enfermedad vestibular.
- 51 Las tasas de curación de los carcinomas basocelulares de cabeza y cuello NO dependen de:
- A: Tipo histológico.
  - B: La cuantificación de anticuerpos contra la proteína S-100.
  - C: Localización.
  - D: Márgenes libres de células tumorales.
- 52 Indique la respuesta FALSA sobre los efectos fisiológicos de la intubación endotraqueal:
- A: Existe una disminución del espacio muerto respiratorio del 30%.
  - B: Hay un incremento de la presión intracraneal por hiperestimulación simpática.
  - C: Provoca una activación del sistema vegetativo.
  - D: Si existe patología respiratoria a flujos altos, se incrementa el trabajo respiratorio.
- 53 En cuál de las siguientes estructuras es más frecuente la inserción del septo interesfenoidal:
- A: Nervio óptico.
  - B: Cavum de Meckel.
  - C: Recesso opticocarotídeo.
  - D: Relieve carotídeo.

- 54 Un paciente anciano acude a nuestra consulta por inestabilidad crónica con algún episodio de caída. Es diabético e hipertenso. Tiene problemas visuales y está operado de rodilla y de cadera por artrosis. Padece una inestabilidad de origen multifactorial, presbivértigo o vértigo del anciano. ¿Qué tratamiento NO deberemos utilizar?
- A: Intentar tratar sus patologías de base.
  - B: Descartar y tratar si tiene alguna patología vestibular añadida.
  - C: Sedantes vestibulares.
  - D: Ejercicio en su domicilio y si lo necesita con rehabilitación vestibular.
- 55 Los focos lesionales de la otospongiosis NO se desarrollan en:
- A: Articulación incudo-estapedial.
  - B: Base de la apófisis estiloides.
  - C: Conductos semicirculares.
  - D: Sutura petroescamosa.
- 56 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?
- A: El epitelio del quiste mucoso de retención de la cuerda vocal es glandular con células ciliadas cilíndricas.
  - B: El epitelio del quiste mucoso de retención de la cuerda vocal es estratificado y queratinizado.
  - C: El epitelio del quiste epidérmico de la cuerda vocal es estratificado y queratinizado.
  - D: El contenido del quiste mucoso es secreción mucoide.
- 57 Una de estas afirmaciones es FALSA en la clínica del paraganglioma temporal:
- A: El primer síntoma suele ser el acúfeno pulsátil.
  - B: Aproximadamente un 10% son de herencia familiar.
  - C: Es cinco veces más frecuente en el sexo masculino.
  - D: Hay casos de malignidad con metástasis.
- 58 Señale entre las siguientes respuestas cuál es el marcador biomolecular que más se relaciona con el pronóstico de cáncer de orofaringe:
- A: P53.
  - B: P16.
  - C: El receptor de crecimiento epidérmico (rEGF).
  - D: El aumento de la concentración en sangre del anticuerpo IgM, del virus de Epstein Barr.
- 59 Señale la respuesta correcta sobre el tratamiento del liquen plano oral:
- A: Las formas resistentes se pueden beneficiar del uso de PUVA (terapia con psoraleno y luz ultravioleta).
  - B: La hidroxiclороquina se puede dar a dosis de 500 mg/día/8h durante 6 meses.
  - C: El dietilditiocarbamato (DTC) se puede usar a dosis 5 mg/kg/24h durante 3 meses.
  - D: Se puede dar tratamientos de griseofulvina de 3 meses con buenos resultados.
- 60 En el vaciamiento radical para el tratamiento del colesteatoma, ¿cuál es la técnica de Rambo?
- A: Resección de la punta de la mastoides.
  - B: Reconstrucción con cartílago en empalizada.
  - C: Reconstrucción osicular.
  - D: Obliteración del seno sigmoide o lateral.

- 61 ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es cierta en relación con el Sarcoma de Kaposi?
- A: No se da en varones.
  - B: Se da preferentemente en el niño.
  - C: Se asocia frecuentemente al V.I.H.
  - D: Es siempre benigno.
- 62 Señala entre las siguientes, la clasificación TNM de un paciente con un cáncer de laringe que se localiza en el tercio anterior de cuerda vocal, desciende 0,5 cm hacia subglotis, con la cuerda vocal paralizada, con dos adenopatías homolaterales de 2,5 cm de tamaño y sin metástasis a distancia:
- A: T2N<sub>0</sub>M<sub>0</sub>
  - B: T3N<sub>2a</sub>M<sub>0</sub>
  - C: T2N<sub>2b</sub>M<sub>0</sub>
  - D: T3N<sub>2b</sub>M<sub>0</sub>
- 63 En un traumatismo laríngeo es FALSO que:
- A: La técnica diagnóstica de elección es la RMN.
  - B: El objetivo inicial es asegurar la vía aérea.
  - C: Entre las indicaciones de una reparación abierta está la fractura conminuta.
  - D: Hay que tener especial precaución al reparar la comisura anterior.
- 64 El ion K<sup>+</sup>, responsable del potencial endococlear de +100 mV, se produce, fundamentalmente, a partir de:
- A: Los fenómenos de difusión a partir del ligamento espiral.
  - B: Por la actividad de la barrera hematoperilinfática.
  - C: La secreción en la zona del limbo espiral.
  - D: La actividad del saco endolinfático.
- 65 ¿En qué se basa la clasificación de Mirko Tos del colesteatoma?
- A: Sitio de asentamiento.
  - B: Edad de aparición.
  - C: Grado de osteitis.
  - D: Histología de la lesión.
- 66 La técnica quirúrgica del vaciamiento cervical funcional, que consiste en la extirpación de los tejidos que albergan los ganglios linfáticos del cuello sin reseca el esternocleidomastoideo, la glándula submaxilar ni la vena yugular interna, conservando el nervio espinal, fue descrita por:
- A: G. Crije.
  - B: H. Martin.
  - C: J. Medina.
  - D: O. Suárez.
- 67 Sobre el epitelio de la cavidad oral, ¿qué es correcto?
- A: Es epitelio plano estratificado.
  - B: Consta, fundamentalmente, de estrato córneo y estrato basal.
  - C: En el estrato granuloso se encuentran las células de Langerhans.
  - D: Es epitelio cilíndrico ciliado.

- 68 La función del músculo cricoaritenideo posterior es:
- A: Abrir la glotis.
  - B: Aumentar la intensidad vocal.
  - C: Cerrar la glotis.
  - D: Aumentar la frecuencia vocal.
- 69 Sobre el hipoparatiroidismo primario, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?
- A: La proteína reguladora del ciclo celular p27 se expresa más en adenomas paratiroides que en las hiperplasias paratiroides.
  - B: La hiperplasia de células translúcidas no se asocia a MEN.
  - C: En la hiperplasia de células principales predomina el patrón de crecimiento nodular.
  - D: La paratiromatosis se ha descrito en la hiperplasia de células principales.
- 70Cuál de las siguientes es una proteína que se considera marcador de LCR para el diagnóstico de fístula de LCR ante una rinorrea acuosa:
- A: Albúmina.
  - B: Prealbúmina.
  - C: Beta 2 transferrina.
  - D: Glucosamina.
- 71 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto a la adenoidectomía?
- A: La exéresis correcta incluye exclusivamente la masa central de adenoides.
  - B: Hay que tener cuidado en no traumatizar la fascia submucosa o el músculo constrictor superior.
  - C: Está contraindicado el uso del microdesbridador quirúrgico.
  - D: No se debe palpar el paladar blando previamente.
- 72 En los lipomas de cabeza y cuello podemos afirmar que:
- A: Los lipomas atípicos son la misma entidad que los pleomórficos.
  - B: Los lipomas de células fusiformes son menos frecuentes que los pleomórficos.
  - C: Los lipomas profundos son más frecuentes a nivel cervical que en extremidades.
  - D: En los lipomas infiltrantes se han descrito degeneraciones malignas.
- 73 La sección del nervio vidiano ha sido usada en el tratamiento de:
- A: Epífora excesiva.
  - B: Rinorrea acuosa excesiva.
  - C: Hipersialorrea.
  - D: Síndrome de Frey.
- 74 En la cirugía reconstructiva de los grandes defectos cervico-faciales, los colgajos en islote:
- A: Se utilizan para reconstruir islotes de tejidos análogos.
  - B: Sus mejores resultados se obtienen si son circulares.
  - C: Corresponden, sencillamente, a una translocación de los tejidos.
  - D: Tienen la ventaja de poder ser utilizados en defectos muy distantes de la zona donante.

- 75 La prueba más específica en la evaluación global de los nódulos tiroideos es:
- A: La ecografía.
  - B: La resonancia.
  - C: La gammagrafía.
  - D: Biopsia con aguja gruesa por ecografía.
- 76 En la parálisis facial, ¿cuál es el signo de Pitres?
- A: Epífora homolateral.
  - B: Rotación del globo ocular al cerrar los ojos.
  - C: Hiperacusia homolateral.
  - D: Separación labial en el lado sano al enseñar los dientes.
- 77 En la cirugía oncológica de los tumores de pared posterior de faringe en estadio T3 o T4 ¿cuál es la correcta?
- A: El colgajo regional más indicado es el colgajo de platisma.
  - B: El colgajo regional más indicado es el colgajo libre de yeyuno.
  - C: El colgajo regional más indicado es el colgajo libre gastrooimental.
  - D: El colgajo regional más indicado es la interposición gástrica.
- 78 Indica cuál de estos músculos NO está inervado por el nervio recurrente:
- A: Músculo cricotiroides.
  - B: Músculo cricoaritenoides posterior.
  - C: Músculo cricoaritenoides lateral.
  - D: Músculo tiroaritenoides.
- 79 La clasificación de la Presbiacusia en Sensorial, Neural, Metabólica y Mecánica la formuló:
- A: Von Bekesy.
  - B: Clark.
  - C: Schuknecht.
  - D: Scholtz.
- 80 ¿Qué respuesta es correcta respecto a los linfomas en el SIDA en el área ORL?
- A: Son más frecuentes a nivel extraganglionar: periórbita, fosa y senos paranasales.
  - B: Lo más característico son linfomas no Hodgkin tipo B de baja malignidad.
  - C: No suelen aparecer en cávum.
  - D: No suelen aparecer en glándulas salivares.
- 81 ¿Dónde está la válvula de Boehdalek en la vía lagrimal?
- A: En el canalículo superior.
  - B: En el canalículo inferior.
  - C: En el acceso al saco de los dos canalículos.
  - D: Está a nivel de la línea maxilar interna.

- 82 Respecto a la trompa de Eustaquio, ¿qué es INCORRECTO?
- A: Deriva de la segunda bolsa faríngea, de la que se origina todo el oído medio.
  - B: El músculo periestafilino externo está inervado por una rama del V par.
  - C: La porción ósea de la trompa está irrigada por una rama de la arteria meníngea media.
  - D: Comunica la pared lateral de la rinofaringe con la pared anterior de la caja del tímpano.
- 83 ¿Cuál de estas afirmaciones es FALSA con respecto a la anatomía del esófago cervical?
- A: El esfínter esofágico superior (EES) está formado por el músculo cricotiroideo.
  - B: El esfínter esofágico superior (EES) une el esófago al cricoides.
  - C: El epitelio de revestimiento esofágico está formado por epitelio plano poliestratificado no queratinizado.
  - D: La irrigación del esófago cervical procede fundamentalmente de ramas de la arteria traqueo-bronquial.
- 84 Según el criterio actualmente más admitido, el tratamiento de elección en un Neurinoma del Acústico grado IV de KOOS de 3,5 cm. de diámetro que clínicamente presenta una hipoacusia severa en ese oído será:
- A: Radioterapia convencional por el alto riesgo de la cirugía.
  - B: Radioterapia estereotáxica.
  - C: Cirugía por vía retrosigmoidea o translaberíntica.
  - D: Tratamiento quimioterápico.
- 85 ¿Cómo se denomina el síndrome que engloba micrognatia, glosoptosis y paladar hendido?
- A: Crouzon.
  - B: Treacher Collins.
  - C: Pierre Robin.
  - D: West.
- 86 La resección segmentaria y la anastomosis terminoterminal constituyen un procedimiento para tratar las estenosis laringotraqueales. Entre los pasos del mismo NO se encuentra:
- A: Abordaje cervical.
  - B: Resección de la zona afectada entre cartílagos sanos.
  - C: Suturar con material irreabsorbible y con los bordes de la mucosa evertidos.
  - D: En general, la extensión máxima será de 4 cm ó 6 anillos.
- 87 En la vía gustativa ¿dónde se encuentra la segunda neurona?
- A: En el núcleo ventral posterior del tálamo.
  - B: En el núcleo solitario.
  - C: En el núcleo de Anderch.
  - D: En el núcleo geniculado.
- 88 Entre los siguientes, señale cuál es el tipo anatomopatológico más frecuente en los tumores malignos de senos paranasales:
- A: Adenocarcinoma.
  - B: Estesioneuroblastoma.
  - C: Carcinoma adenoide quístico.
  - D: Carcinoma indiferenciado.

- 89 En la mucosa nasosinusal, las principales células productoras de moco son:
- A: Células basales o pluripotenciales.
  - B: Células cilíndricas ciliadas.
  - C: Células caliciformes.
  - D: Células neurosecretoras.
- 90 ¿Cuál de los siguientes músculos interviene en la apertura de la trompa de Eustaquio?
- A: Palatoestafilino.
  - B: Periestafilino interno.
  - C: Palatofaríngeo.
  - D: Palatogloso.
- 91 Para el tratamiento de un paciente diagnosticado de un Vértigo Posicional Paroxístico Benigno del Canal Horizontal por canalolitiasis del brazo posterior o variante geotrópica se recomienda utilizar:
- A: Maniobra de Dix Hallpike hacia el lado en el que el nistagmus es más intenso en la maniobra de desencadenamiento.
  - B: Maniobra de Lempert o de la Barbacoa.
  - C: Maniobra de Apiani.
  - D: Maniobra de Yacovino.
- 92 En la prueba del Test de impulso cefálico videoasistido (video Head Impulse test, vHIT), sospechamos patología central cuando:
- A: La ganancia visual-cefálica está disminuida.
  - B: Existen sacadas solamente tipo cubierto (covert).
  - C: Existen sacadas de los dos tipos: tanto tipo cubierto (covert) como abierto (overt).
  - D: Es un registro completamente normal.
- 93 Una de las siguientes afirmaciones es FALSA:
- A: Aproximadamente la mitad de las fracturas nasales ocurren en niños.
  - B: La nariz de los niños está parcialmente osificada.
  - C: Tras un traumatismo nasal pediátrico, el cartílago septal es más propenso a combarse que a luxarse.
  - D: La cirugía nasal de naturaleza estética se debe realizar rápidamente en niños.
- 94 La técnica quirúrgica de cirugía endoscópica que consiste en un abordaje de ambos senos frontales, en los que se reseca todo el suelo del seno frontal, la región superior del septo nasal adyacente al seno frontal y el septo interfrontal se denomina:
- A: Sinusotomía de tipo Draft I.
  - B: Sinusotomía de tipo Draft II.
  - C: Sinusotomía de tipo Draft III.
  - D: Sinusotomía de tipo Draft IV.
- 95 Siguiendo la clasificación de Keros, señale de qué tipo se trata cuando el techo etmoidal está situado a 15 mm de la lámina cribosa:
- A: Tipo I.
  - B: Tipo II.
  - C: Tipo III.
  - D: Tipo IV.



- 96 El rabdomioma se caracteriza por todo lo siguiente, EXCEPTO:
- A: Representan el 2% de los tumores con diferenciación muscular.
  - B: Se da predominantemente en varones.
  - C: En cabeza y cuello se localizan preferentemente en la rinofaringe.
  - D: Son excepcionales las recidivas locales.
- 97 ¿Cuál de estos datos es más útil para DESCARTAR el diagnóstico de una enfermedad autoinmune del oído interno?
- A: Determinación de autoanticuerpos negativa.
  - B: Test de Western-Blot negativo.
  - C: Determinación de subpoblaciones linfocitarias T en sangre periférica no alterado.
  - D: No respuesta al tratamiento con corticoides.
- 98 Con respecto a la regulación de la secreción mucosa, es cierto que:
- A: La acción del sistema simpático produce vasodilatación con aumento del volumen de los cornetes y aumento de la secreción de moco.
  - B: La acción del sistema parasimpático produce vasodilatación con aumento del volumen de los cornetes y aumento de secreción de moco.
  - C: La acción del nervio esfenopalatino produce vasodilatación con aumento del volumen de los cornetes y aumento de secreción de moco.
  - D: La acción del nervio facial produce vasodilatación con aumento del volumen de los cornetes y aumento de secreción de moco.
- 99 En relación con el reflujo gastroesofágico, es cierto que:
- A: Debe de considerarse patológico.
  - B: Existe un reflujo gastroesofágico fisiológico, pero sólo en los niños.
  - C: Existe un reflujo gastroesofágico fisiológico en adultos y niños.
  - D: Cuando se demuestra un reflujo gastroesofágico hay, también, un reflujo faringolaríngeo.
- 100 La causa más común de SAOS en niños es la siguiente:
- A: Laringomalacia.
  - B: Tumores malignos de la vía aérea superior.
  - C: Síndromes polimorfomatosos.
  - D: Hipertrofia del tejido linfóide faríngeo.
- 101 ¿Con qué forma el asa de Galeno el nervio recurrente?
- A: La porción anterior del laríngeo superior.
  - B: El asa descendente del hipogloso.
  - C: Con la porción posterior e interna del laríngeo superior.
  - D: La rama del nervio espinal.
- 102 ¿Cuál es la complicación más frecuente en la rinosinusitis pediátrica?
- A: Absceso orbitario.
  - B: Celulitis preseptal.
  - C: Absceso subperióstico.
  - D: Celulitis orbitaria.

- 103** Señale cuál NO es una indicación absoluta del tratamiento quirúrgico en el hiperparatiroidismo primario asintomático:
- A: Pacientes que no puedan tener un seguimiento adecuado en consulta.
  - B: Edad < 50 años.
  - C: Reducción de la función renal con aclaramiento de creatinina reducido en un 20%.
  - D: Calcio sérico > 11,5 mg/dl.
- 104** Las amígdalas producen elementos de defensa biológica frente a las infecciones:
- A: Que se segregan al exterior de las propias amígdalas.
  - B: Que se dirigen exclusivamente hacia el torrente circulatorio: sanguíneo y linfático.
  - C: Que quedan almacenados exclusivamente en la amígdala.
  - D: Que tienen memoria inmunológica escasa, por lo que las amigdalitis son tan frecuentes.
- 105** El síndrome de Grisel es una complicación de la adenoidectomía que se diagnostica con:
- A: La clínica de dolor cervical.
  - B: Radiografía lateral de cuello.
  - C: Orofaringoscopia.
  - D: Palpación cervical.
- 106** En la patología neurológica de la faringe:
- A: La afectación motora del núcleo y el tronco del X par craneal o neumogástrico, provoca una parálisis del velo del paladar, y de los constrictores de la faringe.
  - B: La afectación del IX par craneal o glossofaríngeo afecta a la sensibilidad del tercio anterior de la lengua.
  - C: Los trastornos sensitivos de la faringe pueden estar relacionados con la afectación del núcleo o del tronco del X par craneal, que es el responsable de las principales aferencias sensitivas de los dos tercios posteriores de la lengua y de la faringe.
  - D: Los trastornos de coordinación de los movimientos deglutorios, se producen solo en el curso de la disfunción cerebelosa.
- 107** El formante típico del cantante se sitúa:
- A: A 500 Hz.
  - B: En 8000 Hz.
  - C: Entre 1000 y 2000 Hz.
  - D: Entre 3000 y 4000 Hz.
- 108** Señala cuál de estos músculos intrínsecos de la laringe tiene una función de rotación interna de los aritenoides y aductora (aproximación) de los pliegues vocales, además de fijador y estabilizador del aritenoides en inspiración:
- A: Músculo cricotiroides.
  - B: Músculo cricoaritenoides posterior.
  - C: Músculo cricoaritenoides lateral.
  - D: Músculo tiroaritenoides.
- 109** ¿Cuál de los siguientes tipos de rinomanometría es el más útil en la práctica rinológica habitual?
- A: Rinomanometría anterior activa.
  - B: Rinomanometría posterior activa.
  - C: Rinomanometría anterior pasiva.
  - D: Rinomanometría posterior pasiva.

110 En los cuerpos extraños de rinofaringe es FALSO que:

- A: Los exámenes radiológicos suelen ser indispensables para su diagnóstico.
- B: Ocurre esencialmente en niños.
- C: Pueden dar complicaciones broncopulmonares.
- D: Los vómitos se encuentran entre su etiología.

