

Orden SAN 178/2023, de 17 de febrero

En vigor desde el 1/03/2023

Vers. 28/02/2023



CALENDARIO DE VACUNACIÓN SISTEMÁTICA EN POBLACIÓN ADULTA

PROGRAMA DE VACUNACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Más información en www.aragon.es/vacunas



VACUNACIÓN EN POBLACIÓN GENERAL

VACUNAS

15-64 años

65 y más años

Tétanos-difteria	Td ¹	Td ^{1,2}
Triple vírica	TV ³	
Varicela	VVZ ⁴	
Herpes zóster		HZ ⁵
Antineumocócica		VN ⁶
Gripe		Campaña anual

- 1 Vacunar o completar vacunación en caso de no tener 5 dosis administradas.
- 2 Revisar estado vacunal a los 65 años; iniciar o completar pauta de vacunación si procede. Si pauta completa (5 dosis), administrar una dosis de recuerdo si han transcurrido más de 10 años desde la última dosis.
- 3 Nacidos a partir de 1970, vacunar con 2 dosis si es susceptible. Pauta 2 dosis (0, 1 meses).
- 4 Personas que no han pasado la enfermedad ni han sido vacunadas. Si tiene 18 o más años, pedir serología. Pauta 2 dosis (0, 2 meses). Se realizará búsqueda activa en los nacidos después del 1/01/1970.
- 5 Cohortes que cumplen 65 años y 80 años en el año en curso. Dos dosis (0, 2 meses).
- 6 Cohorte que cumple 65 años en el año en curso. Una única dosis.

COHORTES ESPECÍFICAS

Hepatitis B	HB ⁷
Meningococo	Men ACWY ⁸
Virus papiloma humano	VPH ⁹

MUJER EMBARAZADA

Difteria-Tétanos-Tosferina	dTpa ¹⁰
Gripe	Gripe ¹¹

- 7 Nacidos a partir de 1980 no vacunados previamente. No se precisa serología pre- ni pos-vacunación. Pauta 3 dosis (0, 1 y 6 meses).
- 8 Nacidos después del 01/01/2000 hasta los 20 años, incluidos, si no han recibido 1 dosis de esta vacuna después de los 10 años de edad. Pauta 1 dosis.
- 9 Mujeres nacidas después del 1/1/1994 hasta los 26 años, incluidos. Pauta 3 dosis.
- 10 1 dosis en cada embarazo a partir de la semana 27 de gestación, preferentemente en la semana 27 o 28.
- 11 En cada embarazo, independiente de su edad gestacional, si coincide con la temporada gripal.

INDICACIONES DE SEROLOGÍA PREVIA: Varicela: en mayores de 18 años, sin antecedentes de padecer varicela o herpes zóster ni vacunación documentada. Solicitar IgG. Hepatitis B: solo en personas con alto riesgo de exposición (conviviente o contacto sexual de portador AgHBs, infección por el VIH, personas que se inyectan drogas o inmigrantes provenientes de países de alta endemia).