

**PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN PLAZAS DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN.**

Resolución de 16 de abril de 2018 (B.O.A. número 81 de 27 de abril de 2018)


**CATEGORÍA:**

**MÉDICO DE FAMILIA DE ATENCIÓN PRIMARIA**

**ADVERTENCIAS:**

- No abra este cuestionario hasta que se le indique. Para hacerlo introduzca la mano en el cuadernillo y con un movimiento ascendente rasgue el lomo derecho (ver figura esquina inferior derecha).
- Este cuestionario consta de 110 preguntas de las cuales las 10 últimas son de reserva. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la «Hoja de Examen» entre los números 1 y 110.
- Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario solicite su sustitución.
- **IMPORTANTE: Los aspirantes del turno de promoción interna estarán exentos de contestar a las preguntas números 1 a 15 (ambas incluidas)**
- El tiempo de realización de este ejercicio es de: **2:15 HORAS.**
- Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor. Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las no contestadas no tendrán valoración alguna y las contestadas erróneamente restarán un tercio del valor de la respuesta correcta.
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la «Hoja de Examen» es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario.
- En cada pregunta existe una y sólo una respuesta correcta.
- Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- No se permite el uso de calculadora, libros ni documentación alguna, móvil o ningún otro elemento electrónico.
- **SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR EN LA "HOJA DE EXAMEN" LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.**
- **ESTE CUESTIONARIO NO DÉBERÁ SER DEVUELTO AL FINALIZAR EL EJÉRCICIO.**
- **TODOS LOS MÓVILES DEBERÁN ESTAR APAGADOS SU OMISIÓN PODRÁ SER MOTIVO DE EXPULSIÓN.**

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL



- 1) **¿Cuál de los siguientes NO es un modelo o una norma de calidad?**
- A) La Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization (JCAHO).
  - B) La European Foundation for Quality Management.
  - C) Las normas ISO.
  - D) La Organización Panamericana de Salud (OPS).
- 2) **¿En cuál de los siguientes municipios NO se ubica un Hospital del Servicio Aragonés de Salud?**
- A) Alcañiz.
  - B) Monzón.
  - C) Jaca.
  - D) Calatayud.
- 3) **¿Cuál de los siguientes NO es un recurso administrativo?**
- A) Recurso extraordinario de revisión.
  - B) Recurso de alzada.
  - C) Recurso potestativo de reposición.
  - D) Recurso de súplica.
- 4) **En cuál de las siguientes materias sanitarias NO tiene el Estado competencia exclusiva:**
- A) Sanidad Exterior.
  - B) Legislación sobre productos farmacéuticos.
  - C) Bases y coordinación general de la Sanidad.
  - D) Organización y funcionamiento de centros y establecimientos sanitarios.
- 5) **Según el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, se procederá a la actualización de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud cuando la implantación de la técnica, tecnología o procedimiento (...):**
- A) Suponga un impacto económico nulo en el Sistema Nacional de Salud.
  - B) Modifique de modo poco significativo las formas o sistemas organizativos de atención a los pacientes.
  - C) Suponga un riesgo para los usuarios o profesionales sanitarios o el medio ambiente.
  - D) No requiera para su aplicación nuevos equipos específicos.
- 6) **El nivel organizativo de la gestión sanitaria que se corresponde con la gestión clínica es la:**
- A) Macrogestión.
  - B) Mesogestión.
  - C) Microgestión.
  - D) Ninguna de las anteriores.
- 7) **La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, dispone que:**
- A) Cada Comunidad Autónoma dispondrá, al menos, de un centro hospitalario.
  - B) Cada Sector Sanitario dispondrá, al menos, de un hospital general.
  - C) Cada Área de Salud estará vinculada o dispondrá, al menos, de un hospital general.
  - D) Cada Sector Sanitario dispondrá, al menos, de un Centro Hospitalario y un Centro de Especialidades y el desarrollo de Atención Primaria que se considere necesario para garantizar la asistencia sanitaria a la población protegida.
- 8) **¿Cuál de los siguientes contenidos NO se recogen en el Reglamento de Funcionamiento Interno del Equipo de Atención Primaria?**
- A) La asignación, a cada miembro del Equipo, de consultas, núcleos de población y consultorios locales habilitados al efecto.
  - B) La distribución puntual del horario dedicado a programas, reuniones y actividades de los diferentes miembros del Equipo, tanto en el Centro de Salud como en los consultorios locales.
  - C) La definición de los circuitos de derivación de pacientes a Atención Especializada.
  - D) El ámbito territorial de la Zona de Salud y referencias generales sobre la ubicación del Centro de Salud.

- 9) **¿Cuál de los siguientes principios generales de la relación entre los profesionales sanitarios y las personas atendidas por ellos, es INCORRECTO?**
- A) Los pacientes tienen derecho a recibir información de acuerdo con lo establecido en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
  - B) Los profesionales tienen el deber de respetar la personalidad, dignidad e intimidad de las personas a su cuidado y deben respetar la participación de los mismos en las tomas de decisiones que les afecten.
  - C) Los pacientes tienen derecho a la libre elección del médico que debe atenderles.
  - D) Los profesionales no facilitarán a sus pacientes el ejercicio del derecho a conocer el nombre, titulación y la especialidad de los profesionales sanitarios que les atienden.
- 10) **Según el vigente Estatuto de Autonomía de Aragón, en materia de Sanidad y Salud pública a la Comunidad Autónoma de Aragón le corresponde:**
- A) Competencia exclusiva.
  - B) Competencia ejecutiva.
  - C) Competencia compartida.
  - D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- 11) **Señale cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA, en relación con el consentimiento informado:**
- A) De acuerdo con la Ley de Autonomía del Paciente el consentimiento informado se prestará siempre por escrito en los casos de procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores.
  - B) En caso de riesgo para la salud pública por razones sanitarias el consentimiento informado no será preciso.
  - C) Por regla general, el consentimiento informado se prestará de forma verbal.
  - D) Es una obligación ética pero no jurídica para los profesionales.
- 12) **En relación con el sistema de agrupación casuística denominado ACG (Adjusted Clinical Groups o Grupos de Atención Ambulatoria), señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:**
- A) La unidad de análisis es el paciente concreto, no las visitas ni los servicios.
  - B) Puede utilizarse independientemente de que el registro de historia clínica sea manual o electrónico.
  - C) Cada ACG incluye individuos con un modelo similar de morbilidad pero con diferente uso esperado de recursos.
  - D) El mismo paciente puede encuadrarse en varios ACG diferentes.
- 13) **De los siguientes, ¿Qué instrumento se utiliza para evaluar la calidad de las guías de práctica clínica?**
- A) CONSORT.
  - B) AGREE II.
  - C) STROBE.
  - D) SIGN.
- 14) **Indique la respuesta INCORRECTA en relación con los tipos de nombramiento de personal estatutario temporal, según la regulación contenida en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud:**
- A) De carácter eventual.
  - B) De sustitución.
  - C) De interinidad.
  - D) De alta dirección.
- 15) **Es innegable el papel vertebrador del territorio que tienen la mejora de las comunicaciones y en particular el desarrollo de vías rápidas de comunicación. Señale cuál de las siguientes localidades NO está unida con la ciudad de Zaragoza por una autovía:**
- A) Calamocha.
  - B) Zuera.
  - C) La Almunia de doña Godina.
  - D) Alcañiz.

- 16) **¿Cuál de las siguientes enfermedades NO se considera definitiva de SIDA?**
- A) Herpes Zoster.
  - B) Cáncer cervical invasivo.
  - C) Candidiasis bronquial.
  - D) Candidiasis esofágica.
- 17) **Según los datos del último estudio del I.N.E., señale la principal causa de muerte en España por grupo de enfermedad:**
- A) Enfermedades del sistema nervioso.
  - B) Enfermedades del sistema respiratorio.
  - C) Tumores.
  - D) Enfermedades del sistema circulatorio.
- 18) **En relación a las consideraciones del Programa de Actividades Preventivas y de Promoción para la Salud (PAPPS) 2018 acerca de la hipertensión arterial (HTA) en Atención Primaria, señale la respuesta INCORRECTA:**
- A) Pese a que las recientes guías del ACC/AHA en Estados Unidos proponen definir la HTA como cifras de Presión Arterial superiores a 130/80, PAPPS mantiene las cifras de HTA en presiones superiores a 140/90, medida en consulta.
  - B) Se recomienda decididamente confirmar el diagnóstico de HTA mediante MAPA, (o AMPA si no hay disponibilidad), excepto en casos en que es necesario el tratamiento farmacológico inmediato.
  - C) Las intervenciones no farmacológicas consiguen un descenso moderado de las cifras de presión arterial.
  - D) Se recomienda que la periodicidad de la prueba de cribado sea cada 2 años en mayores de 40 años.
- 19) **¿Cuál de las siguientes definiciones relativas a un agente infeccioso pertenece al término de Infectividad?**
- A) Capacidad del microorganismo para producir enfermedad grave.
  - B) Capacidad del microorganismo para invadir y multiplicarse en el huésped.
  - C) Capacidad del microorganismo para inducir una respuesta inmune.
  - D) Capacidad del microorganismo para producir enfermedad.
- 20) **¿Cuál de los siguientes NO es criterio dermatoscópico de Carcinoma Basocelular Pigmentado?**
- A) Áreas en hojas de arce.
  - B) Telangiectasias.
  - C) Grandes nidos ovoides azul-grisáceos.
  - D) Retículo pigmentado.
- 21) **En la Guía de atención sanitaria a la mujer víctima de violencia doméstica en el Sistema de Salud de Aragón, se consideran como factores de vulnerabilidad en la mujer los siguientes, EXCEPTO:**
- A) Problemas de salud mental.
  - B) Edad superior a 24 años.
  - C) Embarazo y posparto.
  - D) Historia anterior de malos tratos.
- 22) **En los trastornos auditivos por ruido excesivo en el entorno laboral, señale la opción INCORRECTA:**
- A) Suele ser bilateral.
  - B) Se afectan las frecuencias por encima de 8.000 Hz.
  - C) Se afectan las estructuras nerviosas del órgano de Corti.
  - D) Suele existir el denominado "fenómeno de reclutamiento".
- 23) **¿Cuál de los siguientes tratamientos NO utilizaría en un paciente diabético con úlceras en los pies?**
- A) Sitagliptina.
  - B) Pioglitazona.
  - C) Canaglifozina.
  - D) Liraglutide.

- 24) Sobre las principales pautas terapéuticas en el tratamiento de la tuberculosis, ¿cuál de ellas es INCORRECTA, considerando Isoniazida (H), Rifampicina (R) Pirazinamida (Z) y Etambutol (E)?
- A) 2 meses HRZ seguida de 6 meses de HR.
  - B) En caso de no poder usar Isoniazida: 2 meses RZE seguido de 10 meses RE.
  - C) En caso de no poder usar Rifampicina: 2 meses HZE seguido de 10 meses HE.
  - D) En caso de no poder usar Pirazinamida :2 meses HRE seguido de 7 meses HR.
- 25) En relación con la terapia farmacológica antidepresiva todos los siguientes son errores que conviene evitar, EXCEPTO:
- A) Utilizar dosis subterapéuticas, por debajo de 75 mgr de los antidepresivos tricíclicos.
  - B) Emplear fármacos que asocien antidepresivos con otros psicofármacos.
  - C) Retirar precozmente los antidepresivos cuando haya mejoría clínica.
  - D) Al realizar el cambio de antidepresivos tricíclicos clásicos por inhibidores de la recaptación de serotonina (ISRS), reducir la dosis paulatinamente de tricíclicos e introducir el ISRS a dosis estándar.
- 26) Indique cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA en relación con la Enfermedad Inflamatoria Intestinal:
- A) La enfermedad de Crohn puede afectar a cualquier área del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano.
  - B) La Colitis Ulcerosa se asocia a un incremento de riesgo de Cáncer colorectal.
  - C) El síntoma más característico de la enfermedad de Crohn es la diarrea con sangre.
  - D) La Colitis Ulcerosa afecta característicamente al recto y se extiende de forma continua y proximal hasta el ciego.
- 27) Indique cual de las siguiente afirmaciones es INCORRECTA, en relación con el Cáncer Renal:
- A) Hipertensión, tabaquismo y obesidad son factores de riesgo establecidos en el cáncer renal.
  - B) La clásica triada de hematuria, dolor y masa palpable en el flanco ocurre en una pequeña proporción de pacientes y a menudo es indicativa de enfermedad avanzada.
  - C) El TAC Tórax-Abdomen-Pelvis es la prueba indicada en la estadificación inicial y la técnica de elección para el diagnóstico de masas renales.
  - D) La presencia de afectación tumoral de la vena renal, cava o de la aurícula constituyen una contraindicación absoluta para la cirugía.
- 28) ¿Qué agente patógeno sospecharía en un paciente de 75 años de edad que presenta fiebre, vómitos y diarrea, petequias, oliguria que refiere consumo en las últimas semana de leche no pasteurizada?
- A) Escherichia coli.
  - B) Francisella tularensis.
  - C) Yersinia pestis.
  - D) Leishmania donovani.
- 29) El diagnóstico de fibromialgia es fundamentalmente clínico, y dentro de la evaluación del paciente, en el examen físico, han de palparse una serie de puntos dolorosos bien definidos. Indique cuál de los siguientes puntos, NO entra en la sistemática de la exploración:
- A) Occipital.
  - B) Glúteo.
  - C) Gemelo.
  - D) Trocánter mayor.
- 30) El Programa de Atención Bucodental Infanto-Juvenil (PABIJ) en Aragón, incluye las siguientes medidas preventivas y asistenciales, EXCEPTO:
- A) Obturaciones en piezas permanentes.
  - B) Tartrectomías en piezas permanentes.
  - C) Endodoncia de piezas permanentes.
  - D) Tratamientos ortodóncicos.

**31) Señale la respuesta INCORRECTA en relación al tratamiento del asma bronquial:**

- A) Los antileucotrienos son una alternativa en pacientes que no pueden usar los corticoides inhalados y en asma asociado a rinitis.
- B) El bromuro de aclidinio es el broncodilatador más potente y de elección en las crisis asmáticas.
- C) Los corticoides inhalados son el tratamiento de elección en el asma persistente.
- D) Los corticoides orales se indican en el asma persistente grave, y en crisis moderadas y graves.

**32) Uno de estos fármacos usados para el tratamiento de la obesidad es un Inhibidor de la Lipasa Pancreática.**

- A) Sibutramina.
- B) Orlistat.
- C) Fenfluramina.
- D) Metilcelulosa.

**33) En relación a los objetivos terapéuticos en hipercolesterolemia y Riesgo Cardiovascular es INCORRECTO:**

- A) En Diabetes tipo 1 ó 2 con lesión en órgano diana el objetivo terapéutico de cLDL es <70 mg/dl.
- B) Si SCORE de 10% o mayor, el objetivo terapéutico de cLDL es <100 mg/dl.
- C) En enfermedad cardiovascular clínica o con prueba de imagen inequívoca, el objetivo terapéutico de cLDL es <70 mg/dl.
- D) En Insuficiencia Renal Moderada, el objetivo terapéutico de cLDL es <100 mg/dl.

**34) Señala la asociación tóxico-antídoto INCORRECTA:**

- A) Heparina-Protamina.
- B) Paracetamol-Flumacenil.
- C) Opiáceos-Naloxona.
- D) Isoniacida-Piridoxina (vitamina B6).

**35) En relación con las verrugas producidas por VPH (virus del papiloma humano), señale la respuesta correcta:**

- A) Los papilomas y verrugas genitales, laringeas, ano-genitales u oro-faríngeas están producidos habitualmente por los VPH tipo 6 y 11.
- B) En un 20 % de los casos la infección es transitoria.
- C) El Imiquinod se emplea exclusivamente en lesiones externas extragenitales.
- D) Deben tratarse a las parejas, aunque no presenten lesiones.

**36) En relación con las estrategias de reperfusión coronaria en nuestra Comunidad Autónoma en pacientes que presentan un Síndrome Coronario Agudo con elevación del Segmento ST (SCACEST). Señale la respuesta INCORRECTA:**

- A) El tiempo transcurrido desde la llegada del paciente a un centro asistencial con capacidad para realizar un ECG y establecer un diagnóstico del mismo, debe ser inferior a 10 minutos.
- B) El tiempo ideal desde el Primer Contacto Médico hasta que se practique una Intervención Coronaria Percutánea Primaria (ICPp) debe ser de menos de 120 minutos.
- C) En pacientes con contraindicación para una Fibrinólisis Farmacológica la indicación terapéutica será siempre la ICPp, independientemente del tiempo transcurrido desde el primer contacto Médico.
- D) En ámbito Extrahospitalario el tiempo ideal para realizar una fibrinólisis electiva es de menos de 12 horas desde el primer contacto médico.

**37) En educación para la salud, la técnica grupal que se basa en la escenificación de una situación previamente descrita para poner de manifiesto determinados comportamientos y actitudes se denomina:**

- A) Lluvia de ideas.
- B) Método del caso.
- C) Método del incidente.
- D) Role Playing.

- 38) En la exploración del hombro doloroso, cuando el paciente intenta hacer una rotación externa contrarresistencia del explorador y mantener el brazo elevado en abducción de 90° y flexión del codo de 90°, estamos realizando la:
- A) Maniobra de Jobe.
  - B) Maniobra de Yegarson.
  - C) Maniobra de Patte.
  - D) Maniobra de Gerber.
- 39) ¿Cuál de los siguientes fármacos, utilizados en el tratamiento de la osteoporosis, se ha asociado con aumento de probabilidad de aparición de trombosis venosa profunda?
- A) Raloxifeno.
  - B) Alendronato.
  - C) Teriparatida.
  - D) Risedronato.
- 40) ¿Cuál de estas afirmaciones en relación a la historia natural de la enfermedad es INCORRECTA?
- A) Las actividades de prevención secundaria pretenden detener la evolución de la enfermedad en la fase preclínica.
  - B) Las actividades de prevención terciaria están dirigidas a evitar la aparición de complicaciones de las enfermedades, o al menos retrasarlas.
  - C) Las actividades de prevención primaria pretenden llegar a un diagnóstico precoz de la enfermedad.
  - D) Actividades de prevención cuaternaria pretenden evitar las complicaciones de las intervenciones sanitarias.
- 41) Para la inclusión de un paciente en el Programa de Atención a Enfermos Crónicos Dependientes en Aragón, además del diagnóstico se utilizará uno de los siguientes criterios:
- A) Índice de Barthel igual o inferior a 90.
  - B) Grado de minusvalía concedido.
  - C) Test de Pfeiffer con 2 errores.
  - D) Test de Lobo de 25 puntos.
- 42) ¿Cuál de los siguientes es un factor de riesgo reconocido en la mujer para el cáncer de ovario?
- A) Alimentación baja en grasas.
  - B) Portador de mutación BRCA.
  - C) Multiparidad.
  - D) Lactancia.
- 43) Según la clasificación de la gravedad de la limitación del flujo aéreo EPOC (basada en el FEV1 posbroncodilatador), recogida en la Guía GOLD 2017, un paciente con FEV1 pb del 54% correspondería a:
- A) Gold 2.
  - B) Gold 3.
  - C) Gold 4.
  - D) Gold 5.
- 44) Se plantea el uso de Ezetimiba en los siguientes casos, EXCEPTO:
- A) Pacientes que no toleran las estatinas en monoterapia como primera opción.
  - B) Pacientes que no toleran las estatinas asociada a resinas de intercambio o fibratos.
  - C) Cuando estén contraindicadas las estatinas.
  - D) Pacientes con riesgo próximo al umbral del tratamiento.
- 45) De las benzodiacepinas enumeradas a continuación de vida media intermedia (5-12 horas), señale la que posee indicaciones como hipnótico:
- A) Flunitracepam.
  - B) Alprazolam.
  - C) Oxacepam.
  - D) Lorazepam.

**46) Respecto al calendario vacunal en edad pediátrica en Aragón, ¿cuál es INCORRECTA?**

- A) Vacuna Hepatitis B (HB) a los 2-4-11 meses.
- B) Vacuna meningococo C conjugada (MC) a los 4 y 12 meses y 12 años.
- C) Vacuna de Haemophilus influenzae (Hib) a los 2-4 y 11 meses.
- D) Vacuna del Virus del Papiloma Humano (VPH) a los 14 años.

**47) En relación al estudio de las alergias, señale el enunciado INCORRECTO de los propuestos a continuación:**

- A) En el estudio de alergia el PRICK-TEST es el método de elección y de valoración inmediata.
- B) La determinación de Ig E específica es más sensible y más barata que el PRICK-TEST.
- C) La provocación bronquial específica puede ser útil en casos de asma ocupacional.
- D) El diagnóstico molecular es un procedimiento de segundo nivel, útil en pacientes polisensibilizados.

**48) NO es un objetivo de la Función Educadora de la entrevista clínica:**

- A) Lograr un acuerdo.
- B) Disminuir estresores.
- C) Implicar al paciente.
- D) Aumentar conocimientos y conductas apropiadas.

**49) ¿Cuál de estas afirmaciones en relación con la alteración de los iones es INCORRECTA?**

- A) En Atención Primaria los tipos más frecuentes de hiponatremia son la dilucional y la debida al uso de fármacos.
- B) En la hipopotasemia al realizar un ECG encontramos, entre otras alteraciones, prolongación del QT y del PR.
- C) La causa más frecuente de hipocalcemia es el hipoparatiroidismo.
- D) En casos de hiperpotasemia graves en el ECG aparecen QRS estrechos con onda P picudas.

**50) El efecto secundario más frecuente de la vareniclina, utilizada en la deshabituación tabáquica, es:**

- A) Insomnio.
- B) Cefalea.
- C) Sequedad de boca.
- D) Náuseas.

**51) Respecto a la Retinopatía Diabética, señale la respuesta INCORRECTA.**

- A) La retinopatía Proliferativa es más frecuente en los diabéticos tipo I.
- B) La Retinopatía No proliferativa se define por la aparición de neovasos.
- C) No existen lesiones patognomónicas en la retinopatía diabética.
- D) Los Microaneurismas suelen ser la primera manifestación oftalmoscópica de la retinopatía diabética.

**52) Con respecto a la endometriosis, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA?**

- A) La localización más frecuente de la endometriosis es el peritoneo del fondo de saco de Douglas.
- B) En la clínica de la endometriosis, el dolor es más frecuente que las alteraciones menstruales.
- C) El diagnóstico definitivo se establece a través de la laparoscopia.
- D) En el tratamiento médico de la endometriosis se pueden emplear anticonceptivos orales.

**53) ¿Cuál de las siguientes zoonosis NO tiene como mecanismo de transmisión la picadura de garrapata?**

- A) Fiebre exantemática mediterránea o fiebre botonosa.
- B) Enfermedad de Lyme.
- C) Tularemia.
- D) Brucelosis.

**54) Respecto de la emisión de un certificado médico falso, es correcto:**

- A) Se sanciona al facultativo que libra un certificado falso según el uso para el que es destinado.
- B) La sanción por emisión de certificado falso es pena de multa de 24 a 36 meses.
- C) Los certificados incluyen los emitidos en papel médico oficial de Colegio de médicos o en papel donde el emisor se identifique, conste fecha, lugar de emisión, firma, número de colegiado y se utilice la fórmula "certifico".
- D) La falsedad no se comete cuando se miente en la fecha o lugar de emisión.



- 55) Son criterios de tratamiento sistémico de la onicomicosis todos, EXCEPTO:**
- A) Cinco o más uñas afectadas.
  - B) Afectación de más del 70 % en alguna uña.
  - C) Afectación de la matriz.
  - D) Recurrencia.
- 56) Las reglas de Ottawa son una serie de indicaciones de exploración, que de estar presentes, hacen recomendable la práctica de una radiografía. Señale la respuesta NO incluida en las mencionadas indicaciones tras un traumatismo de tobillo:**
- A) Dolor en el escafoides tarsiano.
  - B) Dolor selectivo a la palpación de cara posterior y distal del maléolo peroneo.
  - C) Dolor selectivo a la palpación de cara posterior y distal del maléolo tibial.
  - D) Dolor selectivo en la base del primer metatarsiano.
- 57) ¿En cuál de los siguientes criterios diagnósticos de Diabetes Mellitus NO es necesario confirmar el resultado?**
- A) Glucemia al azar (aunque sea sin ayuno previo)  $\geq 200$ mg/dl en presencia de síntomas de diabetes (poliuria, polidipsia o pérdida de peso inexplicada).
  - B) Glucemia basal (en ayunas, al menos durante 8 horas)  $\geq 126$ mg/dl
  - C) Glucemia  $\geq 200$  mg/dl a las 2 horas tras la sobrecarga oral con 75 gr de glucosa.
  - D) Hemoglobina glicosilada (HbA1c)  $\geq 6,5\%$ .
- 58) En relación a las recomendaciones del Programa de Actividades Preventivas de Atención Primaria y Promoción de la Salud (PAPPS) 2018 para el anciano, cuál es INCORRECTA:**
- A) Se recomienda el uso de protectores de cadera en las personas mayores que viven en la comunidad.
  - B) Ejercicio aeróbico un mínimo de 30 minutos de intensidad moderada 5 días a la semana.
  - C) Con la evidencia actual no puede aconsejarse administrar suplementos de vitamina D en mayores de 65 años que viven en la comunidad.
  - D) En el momento actual, no hay suficiente evidencia para aconsejar suplementos vitamínicos B o C, ácidos grasos ni Ginkgo biloba para prevenir el deterioro cognitivo o la demencia.
- 59) De las siguientes afirmaciones en relación con las trombosis, señale la INCORRECTA:**
- A) En la trombosis arterial la agregación plaquetaria juega un papel fundamental.
  - B) En la trombosis venosa el mecanismo fundamental es la activación de los factores de coagulación.
  - C) En la trombosis venosa el tratamiento se basa en fármacos anticoagulantes.
  - D) En la trombosis arterial su tratamiento preventivo se basa en fármacos fibrinolíticos.
- 60) ¿Cuál de las siguientes NO es causa de hipoacusia de transmisión?**
- A) Colesteatoma.
  - B) Otosclerosis.
  - C) Presbiacusia.
  - D) Perforación timpánica.
- 61) En la actualidad, las cifras para el diagnóstico de la presión arterial (PA), difieren según los métodos de medida de la PA. Indique la respuesta INCORRECTA sobre este aspecto:**
- A) 140/90 mm Hg estimados con la toma de PA en consulta.
  - B) 135/85 mm Hg al considerar los valores de las automedidas de la PA (AMPA) en el domicilio del paciente.
  - C) 130/80 mm Hg con medias promediadas de 24 horas en la monitorización ambulatoria de la PA (MAPA).
  - D) 120/70 mm Hg con cifras diurnas o de actividad de MAPA.

- 62) Señale la afirmación FALSA en relación con el tratamiento de la hepatitis viral crónica por el virus C:**
- A) Dentro de los pacientes prioritarios a tratar, están los incluidos en lista de espera de trasplante hepático, o con manifestaciones extrahepáticas clínicamente relevantes.
  - B) Todos los pacientes con una hepatitis crónica por virus C que no han respondido a un tratamiento antiviral previo (independientemente del tipo recibido) deben ser reevaluados como candidatos a un nuevo tratamiento antiviral.
  - C) Los pacientes con transaminasas normales deben ser excluidos inicialmente de la posibilidad de tratamiento antiviral.
  - D) Puede haber un grado elevado de fibrosis hepática en la elastografía y valores normales de transaminasas.
- 63) Ante un paciente anciano que presenta una anemia microcítica con sideremia baja y ferritina elevada, pensaremos en primer lugar:**
- A) Anemia ferropénica.
  - B) Beta Talasemia.
  - C) Anemia por trastorno crónico.
  - D) Anemia sideroblástica.
- 64) El índice BODEx incluye los siguientes parámetros, EXCEPTO uno. Señálelo:**
- A) Índice de masa corporal.
  - B) Número de ingresos hospitalarios en el último año.
  - C) Exacerbaciones graves.
  - D) Disnea.
- 65) Dentro de los nuevos anticoagulantes orales de acción directa, la inhibición de la trombina es el mecanismo de acción de:**
- A) Dabigatrán.
  - B) Rivaroxabán.
  - C) Apixabán.
  - D) Edoxabán.
- 66) ¿Cuál de éstas es la neoplasia tiroidea más prevalente?**
- A) Carcinoma medular.
  - B) Carcinoma papilar.
  - C) Carcinoma folicular.
  - D) Carcinoma anaplásico.
- 67) Respecto al diagnóstico de la meningitis, señale la respuesta INCORRECTA:**
- A) La antibioterapia inicial pocas horas antes de la punción lumbar no altera significativamente el recuento de leucocitos en LCR.
  - B) A la exploración son típicos la rigidez de nuca y los signos de Kerning y Brudzinski.
  - C) Las lesiones cutáneas petequiales, purpúricas o equimóticas sugieren etiología vírica.
  - D) El examen físico y la historia clínica no son suficientes para determinar si un paciente tiene meningitis.
- 68) Ante un paciente que acude a la consulta con un cuadro de fiebre, dolor abdominal y diarrea, que ha comenzado entre 16 y 48 horas después de consumir un alimento sospechoso de ser el causante de una toxiinfección alimentaria, cuál de los siguientes agentes etiológicos será el MENOS probable:**
- A) Salmonella enteriditis.
  - B) Staphylococcus aureus enterotóxico.
  - C) Campylobacter jejuni.
  - D) Shigella.

- 69) Indique cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA en la interpretación de un electrocardiograma:**
- A) En los bloqueos del haz de His se retrasa la despolarización ventricular y se alarga el qRS más de 0,1 s y más de 0,16 si es completo.
  - B) En el ECG normal del adulto el intervalo QT va desde el inicio del complejo qRS hasta el final de la onda T y representa el conjunto de la despolarización y la repolarización de los ventrículos.
  - C) La onda T tiene igual polaridad que el qRS y su amplitud varía entre 0,1 y 0,4 mV. Es positiva en todas las derivaciones excepto aVR, aunque puede también ser negativa en DII y V1.
  - D) La fibrilación auricular se caracteriza por la ausencia de ondas P junto con intervalos RR constantes a diferencia de la fibrilación ventricular donde no existe ningún trazado repetitivo ni ninguna onda o complejo identificable.
- 70) En cuanto a la cadena de supervivencia que se aplica en el Soporte Vital Básico de Adultos en una situación de emergencia fuera del ámbito hospitalario, indique el orden correcto de los eslabones, según las Recomendaciones 2015 del European Resuscitation Council:**
- A) Valoración y análisis de la situación, pedir ayuda, comprobar si respira, llamar al 061 ó 112, iniciar 30 compresiones/ 2 respiraciones.
  - B) Valoración y análisis de la situación, pedir ayuda, comprobar si respira, iniciar 30 compresiones/ 2 respiraciones.
  - C) Valoración y análisis de la situación, pedir ayuda, llamar al 061 ó 112, iniciar 30 compresiones/ 2 respiraciones.
  - D) Valoración y análisis de la situación, pedir ayuda, comprobar si respira, llamar al 061 ó 112, iniciar 15 compresiones/ 2 respiraciones.
- 71) Señale la respuesta INCORRECTA, en relación con la validez de una prueba diagnóstica:**
- A) La sensibilidad indica la probabilidad que tiene una prueba diagnóstica de dar resultados positivos entre los sujetos enfermos.
  - B) La especificidad indica la probabilidad que tiene una prueba diagnóstica de dar resultado negativo entre los sujetos que no presentan la enfermedad.
  - C) Las pruebas que se aplican en el cribado de una enfermedad requieren una alta sensibilidad.
  - D) Los valores predictivos no dependen de la prevalencia de la enfermedad.
- 72) Señale la respuesta INCORRECTA, respecto a los efectos de las siguientes intoxicaciones:**
- A) La sobredosis Cocaína produce Miosis.
  - B) La sobredosis Atropina produce Midriasis.
  - C) La Hemorragia subaracnoidea con rotura de la comunicante posterior produce Midriasis.
  - D) La intoxicación por Organofosforados produce Miosis.
- 73) ¿Cuál de las siguientes NO es Enfermedad de Declaración Obligatoria (EDO) urgente?**
- A) Brote de salmonelosis de transmisión alimentaria.
  - B) Tularemia.
  - C) Brucelosis.
  - D) Sarampión.
- 74) Interprete este resultado en relación con la serología del virus de la hepatitis B (VHB): HBsAg(-), HBsAc(+), HBcAc(+). Indique la respuesta correcta:**
- A) Vacunación.
  - B) Infección curada.
  - C) Infección aguda.
  - D) Infección crónica.
- 75) ¿Cuál de las siguientes técnicas de biopsia cutánea sería la más recomendable en las lesiones pediculadas?**
- A) Biopsia por afeitado.
  - B) Escisión fusiforme.
  - C) Punch-biopsia.
  - D) Curetaje.

- 76) Indique la respuesta INCORRECTA, en relación con la definición y componentes de la comunicación no verbal:**
- A) La posición corporal, los gestos con las manos y las expresiones faciales, definen la kinésica.
  - B) La proxémica define la utilización que hacemos del espacio en las relaciones interpersonales.
  - C) Los gestos adaptadores son gestos dirigidos hacia el cuerpo sin una intención comunicativa y tienden a incrementarse frente al desacuerdo, situaciones incómodas o en estados emocionales negativos.
  - D) Las expresiones faciales describen de manera fidedigna las emociones del individuo independientemente de su contexto.
- 77) El cociente entre los expuestos a un nuevo tratamiento o actividad preventiva y los no expuestos es:**
- A) El riesgo relativo (RR).
  - B) La reducción relativa de riesgo (RRR).
  - C) La reducción absoluta de riesgo (RAR).
  - D) El número de pacientes necesarios a tratar para reducir un evento.
- 78) Respecto al tratamiento de la Diabetes Mellitus tipo 2, señale cuál de los siguientes grupos farmacológicos produce hipoglucemia y ganancia de peso:**
- A) Inhibidores SGLT-2.
  - B) Agonistas GLP-1.
  - C) Sulfonilureas.
  - D) Inhibidores DPP-4.
- 79) De los siguientes grupos patológicos, ¿cuál es la etiología más frecuente en España de enfermedad renal crónica en tratamiento sustitutivo renal?**
- A) Glomeruloesclerosis diabética.
  - B) Glomerulonefritis.
  - C) Enfermedades vasculares, incluida hipertensión arterial.
  - D) Enfermedades renales quísticas.
- 80) Si queremos evaluar el riesgo de padecer un fibroadenoma de mama asociado al uso de anticonceptivos orales, y planteamos comparar un grupo de mujeres diagnosticadas de fibroadenoma y otro grupo de mujeres sin dicha patología, estudiando la historia previa de consumo de anticonceptivos en ambos grupos, estamos diseñando un:**
- A) Estudio transversal.
  - B) Estudio de cohortes prospectivo.
  - C) Estudio de casos y controles.
  - D) Ensayo clínico controlado.
- 81) Sólo una de las siguientes afirmaciones es correcta en el tratamiento del dolor en el paciente oncológico:**
- A) El fentanilo transdérmico presenta menor potencia analgésica que la morfina.
  - B) Al inicio de tratamiento con morfina se recomienda utilizar morfina oral de liberación retardada, ya que permite realizar un mejor ajuste de dosis.
  - C) La dosis aproximada de morfina subcutánea a administrar en 24 horas se obtiene dividiendo por dos la dosis diaria total de morfina oral. La dosis obtenida se reparte cada 4-6 horas.
  - D) El citrato de fentanilo transmucoso está indicado para el tratamiento de dolor irruptivo en pacientes que todavía no reciben tratamiento de mantenimiento con opioides potentes.
- 82) Respecto a los bebedores de riesgo, señale la opción INCORRECTA:**
- A) Puede utilizarse como cuestionario de cribado el "Test AUDIT".
  - B) Tienen un consumo semanal de 17 a 27 UBE (unidad de bebida estándar) en el hombre o de 11 a 16 UBE en la mujer.
  - C) En estas personas, las técnicas de consejo breve tienen una eficacia significativa.
  - D) Las técnicas de consejo breve pueden utilizarse de forma oportunista o dentro de una labor de cribado sistemático.

- 83) La situación clínica en la que existe una temperatura axilar termometrada superior a 38° C, diaria o intermitente, sin focalidad clínica, con una duración entre 1 y 4 semanas, sin antecedentes de estancia hospitalaria, de inmunodeficiencia u otra enfermedad subyacente crónica que pueda ocasionar la presencia de fiebre, y que tras una evaluación clínica y complementaria elemental (hemograma, creatinina estudio de la orina y radiografía PA y lateral de tórax) permanece sin orientación diagnóstica es una:
- A) Fiebre de corta duración.
  - B) Fiebre de origen desconocido.
  - C) Fiebre prolongada sin foco.
  - D) Fiebre no infecciosa.
- 84) De los enunciados referidos a continuación en torno a una prescripción responsable de antibióticos, señale el que considere correcto:
- A) Ante la sospecha de una faringo-amigdalitis bacteriana, si no se dispone de la prueba antigénica para Streptococcus pyogenes, es suficiente un criterio de Centor para acometer el tratamiento antibiótico.
  - B) En sospecha de neumonía han de emplearse antibióticos eficaces contra las cepas de neumococo resistente a la penicilina, siendo de elección las cefalosporinas de 3ª generación.
  - C) En infecciones de la piel de características bacterianas no complicadas, es recomendable usar pautas cortas de 3 días de antibiótico oral.
  - D) Ninguno de los enunciados anteriores es correcto.
- 85) Señale la respuesta INCORRECTA en relación a los estudios transversales:
- A) Permiten estudiar varias enfermedades y factores de riesgo a la vez.
  - B) De elección para estudiar enfermedades poco frecuentes.
  - C) Los de tipo descriptivo tienden a sobrestimar la prevalencia de las enfermedades de mayor duración.
  - D) Son sencillos en su diseño y ejecución.
- 86) Indique la respuesta INCORRECTA sobre la hipertensión arterial:
- A) Es consenso aceptado que en situaciones clínicas donde se objete una presión arterial mayor o igual a 190/110 mm Hg debe remitirse al paciente con carácter urgente al Hospital.
  - B) Los factores relacionados con el aumento de la prevalencia de HTA de bata blanca son la edad, el sexo femenino y ser no fumador.
  - C) La inercia terapéutica se define como la falta de decisión médica para el inicio o la modificación del tratamiento establecido en un paciente.
  - D) Una de las ventajas de la AMPA es la delimitación del sesgo del observador.
- 87) En un manejo racional de las pruebas diagnósticas en Atención Primaria, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA respecto de la utilización del monofilamento en los pacientes diabéticos?
- A) El monofilamento se aplica perpendicularmente a la piel del paciente.
  - B) La presión sobre la piel se va incrementando hasta que el monofilamento se dobla.
  - C) Debe mantenerse apoyado más de 5 segundos.
  - D) La exploración debe realizarse en cuatro puntos plantares de cada pie.
- 88) Ante un paciente con un dolor abdominal de comienzo súbito, de localización periumbilical, de carácter difuso, elevada intensidad, y sin irradiación, ¿cuál de las siguientes enfermedades sería la primera sospecha diagnóstica?
- A) Diverticulitis.
  - B) Embolia arteria mesentérica superior.
  - C) Enfermedad inflamatoria pélvica.
  - D) Apendicitis.
- 89) En los pacientes con Fibrilación Auricular no valvular, se recomienda calcular el riesgo de ictus con el sistema de puntuación CHA2DS2-VASc. Se considera indicación de tratamiento anticoagulante cuando la puntuación alcanzada sea, al menos:
- A) Menor o igual a 1.
  - B) Mayor o igual a 2.
  - C) Mayor o igual a 5.
  - D) Mayor o igual a 7.

- 90) Un lactante de 6 meses que estando previamente bien, comienza bruscamente con vómitos asociados a episodios de llanto intenso, palidez y heces en "jarabe de grosella", presenta como diagnóstico más probable:
- A) Gastroenteritis vírica.
  - B) Apendicitis aguda.
  - C) Cólicos del lactante.
  - D) Invaginación intestinal.
- 91) La proporción de pacientes hipertensos correctamente identificados por una prueba diagnóstica es del 85%. Este valor representa:
- A) La especificidad.
  - B) El valor predictivo positivo.
  - C) El valor predictivo negativo.
  - D) La sensibilidad.
- 92) En un accidente de tráfico frontal de alta energía, atendemos a una joven de 27 años que presenta deformidad del miembro inferior derecho en aducción y rotación interna de la cadera. Cualquier intento de manipulación causa intenso dolor. El diagnóstico más probable es:
- A) Luxación coxofemoral anterior.
  - B) Luxación coxofemoral posterior.
  - C) Fractura de cóndilo femoral.
  - D) Fractura subcapital de fémur.
- 93) Las siguientes situaciones clínicas pueden hacernos sospechar una hipertensión enmascarada, EXCEPTO:
- A) Paciente varón con presión arterial normal en consulta y hepatitis crónica B.
  - B) Paciente mujer con índice de masa corporal 22, diabetes mellitus tipo 1 y presión arterial normal en consulta.
  - C) Paciente varón con presión arterial ocasionalmente elevada en consulta.
  - D) Paciente varón con presión arterial normal en consulta y antecedentes familiares de primer grado de HTA.
- 94) El Síntoma principal del carcinoma de laringe subglótico es:
- A) La disnea.
  - B) La disfonía.
  - C) La disfagia.
  - D) La odinofagia.
- 95) En el tratamiento anticoagulante oral, son contraindicaciones relativas todas, EXCEPTO:
- A) Epilepsia.
  - B) Gestación.
  - C) Retinopatía hemorrágica.
  - D) Derrame pericárdico.
- 96) ¿Cuál de los siguientes fármacos sería el menos indicado en el tratamiento de las crisis de ausencia?
- A) Valproato de sodio.
  - B) Fenitoína.
  - C) Etosuximida.
  - D) Lamotrigina.
- 97) En relación a la estratificación del riesgo cardiovascular mediante tablas de riesgo, señale la respuesta INCORRECTA:
- A) SCORE mide riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular (coronaria y no coronaria) en los próximos 10 años en pacientes entre 40 y 65 años.
  - B) La diabetes no se contempla en la escala REGICOR.
  - C) Un riesgo de muerte cardiovascular superior o igual a 5% e inferior a 10% determina un riesgo cardiovascular alto en la escala SCORE.
  - D) REGICOR abarca un rango de edades entre 35 y 74 años.

- 98) Señale de entre los siguientes el agente causal más frecuente de la meningitis en pacientes mayores de 20 años:
- A) Neisseria meningitis.
  - B) Listeria monocytogenes.
  - C) Streptococo pneumoniae.
  - D) Haemophilus influenzae.
- 99) En el abordaje de un paciente con tabaquismo, el test de Glover-Nilsson valora:
- A) El grado de dependencia física hacia el tabaco.
  - B) El grado de deterioro de las relaciones sociales por tabaquismo.
  - C) El grado de dependencia psicológica hacia el tabaco.
  - D) El grado de motivación para dejar de fumar.
- 100) A una mujer de 27 años, embarazada de 28 semanas y con pirosis sintomática a pesar de cambios en la dieta (disminución de la ingesta de chocolate, café, té y grasas) y en el estilo de vida (no utilizar prendas ajustadas en el abdomen, elevar la cabecera de la cama y evitar ingerir alimentos en las 2-4 horas previas al descanso nocturno), se le puede pautar cualquiera de los siguientes fármacos, EXCEPTO:
- A) Famotidina.
  - B) Almagato.
  - C) Misoprostol.
  - D) Ranitidina.
- 101) En las enfermedades cardiovasculares ocupacionales, hay una asociación definida o probable entre los nitratos y una de las siguientes enfermedades:
- A) Isquemia cardiaca sin coronariopatía.
  - B) Hipertensión arterial.
  - C) Cardiomiopatía.
  - D) Enfermedad vascular periférica.
- 102) En un paciente en coma, ¿qué sospecharemos si aparecen movimientos conjugados lentos en el plano horizontal (roving ocular)?
- A) Existe una lesión protuberancial.
  - B) Puede tratarse de un accidente cerebrovascular en el territorio basilar.
  - C) Existe una lesión medular alta.
  - D) No hay lesión troncoencefálica.
- 103) Con respecto a los virus de la hepatitis, VHA, VHB y VHC, podemos afirmar que:
- A) Los tres son virus ADN.
  - B) VHA y VHB son ARN, y VHC es ADN.
  - C) VHA y VHC son ARN, y VHB es ADN.
  - D) Los tres son virus ARN.
- 104) Indique cuál de las siguientes afirmaciones en relación con el Síndrome de Piernas Inquietas (SPI) es INCORRECTA:
- A) El SPI primario es familiar en más de la mitad de los pacientes.
  - B) La forma secundaria del SPI es más frecuente en los pacientes en los que la enfermedad aparece a una edad avanzada.
  - C) El tratamiento de elección son los hipnóticos no benzodiacepínicos.
  - D) La patogenia del SPI implica déficit general o cerebral de hierro y afectación de la neurotransmisión dopaminérgica.
- 105) Cuando los efectos de una intervención se miden a través de una unidad que integra cantidad de vida con calidad de vida, hablamos de:
- A) Análisis Coste-efectividad.
  - B) Análisis de minimización de costes.
  - C) Análisis Coste-utilidad.
  - D) Análisis Coste-beneficio.

**106) La infección por gérmenes ureasa (+) favorece la aparición de litiasis renal por cálculos de:**

- A) Sales cálcicas.
- B) Estruvita.
- C) Acido úrico.
- D) Cistina.

**107) Respecto al tratamiento de las infecciones no complicadas del tracto urinario, señale la opción INCORRECTA:**

- A) En la insuficiencia renal es posible que el riñón no sea capaz de concentrar un antibiótico en la orina, y dificultar la erradicación de la bacteriuria.
- B) Generalmente existe una elevada relación entre la respuesta de la bacteriuria al tratamiento antibiótico y el nivel sanguíneo alcanzado por el antibiótico.
- C) El nivel del pH urinario puede afectar a la actividad antibacteriana de los antibióticos.
- D) En la bacteriuria asintomática de los ancianos el tratamiento antibiótico no suele modificar la evolución del paciente.

**108) En relación con el coma mixedematoso, señale la opción correcta:**

- A) Tiene una tasa de mortalidad baja.
- B) Ocurre casi siempre en mujeres en edad fértil.
- C) Suele desencadenarse por enfermedades intercurrentes y fármacos.
- D) Cursa generalmente con hiperventilación.

**109) Respecto a la vacunación tetravírica en Aragón, es INCORRECTO:**

- A) Se administrará a los 3 años como segunda dosis de calendario.
- B) Se administrará en mayores, adolescentes o adultos que sea preciso inmunizar de acuerdo a recomendaciones oficiales.
- C) Se administrará en menores de 3 años si por la causa que fuera tuviera que adelantarse la segunda dosis.
- D) No debe administrarse si presenta reacción a vacuna de varicela o triple vírica previa.

**110) Ante una lesión genital ulcerada única debemos pensar en todos los siguientes procesos, EXCEPTO:**

- A) Carcinoma ulcerado.
- B) Virus Herpes Simple Genital.
- C) Sífilis.
- D) Linfogranuloma venéreo.



**ESTA PÁGINA ESTÁ EN BLANCO INTENCIONADAMENTE**

