

PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN PLAZAS DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN.

Resolución

RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2020 (B.O.A. 242 de 9 de diciembre de 2020)

Categoría:

Facultativo Especialista de Área de OTORRINOLARINGOLOGÍA

ADVERTENCIAS:

- No abra este cuestionario hasta que se le indique.
- Este cuestionario consta de 110 preguntas de las cuales las 10 últimas son de reserva. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la "Hoja de Examen" entre los números 1 y 110.
Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario solicite su sustitución.

IMPORTANTE: Los aspirantes del turno de promoción interna estarán exentos de contestar a las preguntas número 1 a 10.

- **El tiempo de realización de este ejercicio es de: 120 MINUTOS.**
- Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor. Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las no contestadas no tendrán valoración alguna y las contestadas erróneamente restarán un tercio del valor de la respuesta correcta.
- Compruebe siempre que el número de respuestas que señale en la "Hoja de Examen" es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario.
- En cada pregunta existe una y sólo una respuesta correcta.
- Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- No se permite el uso de calculadora, libros ni documentación alguna, móvil o ningún otro elemento electrónico.
- Cualquier marca en la hoja de respuestas podrá dar lugar a la anulación del examen.

SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR EN LA "HOJA DE EXAMÉN" LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.

ESTE CUESTIONARIO NO DEBERÁ SER DEVUELTO AL FINALIZAR EL EJERCICIO.

TODOS LOS MÓVILES DEBERÁN ESTAR APAGADOS

SU OMISIÓN PODRÁ SER MOTIVO DE EXPULSIÓN.

FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA

- 1 En cuanto a los Recursos de Alzada y Potestativo de Reposición, indique la respuesta correcta:
 - A: El Recurso de Alzada podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto impugnado.
 - B: El plazo de interposición del Recurso de Alzada será de 2 meses, si el acto fuera expreso.
 - C: El plazo de interposición del Recurso Potestativo de Reposición será de 3 meses, si el acto fuera expreso.
 - D: El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del Recurso Potestativo de Reposición será de 3 meses.

- 2 Un ensayo clínico en el que se establecen la relación dosis-respuesta y se amplían los datos de seguridad es un:
 - A: Ensayo clínico en fase I.
 - B: Ensayo clínico en fase II.
 - C: Ensayo clínico en fase III.
 - D: Ensayo clínico en fase IV.

- 3 El médico debe de contribuir a la rentabilidad del Sistema Sanitario. Señale lo que más ayuda a lograrlo:
 - A: Exigir que los presupuestos sean controlados rigurosamente por los gestores.
 - B: Conocer y controlar los costes de los recursos que usa.
 - C: Primar los aspectos socio-económicos en la indicación diagnóstica.
 - D: Posponer la atención a los enfermos que demandan pruebas costosas.

- 4 Señale la opción INCORRECTA en relación con el régimen disciplinario regulado en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud:
 - A: Las sanciones que, en su caso, se impongan tendrán validez y eficacia en todos los servicios de salud.
 - B: La cancelación de las sanciones disciplinarias no impedirá la apreciación de reincidencia.
 - C: Las normas definidoras de infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica.
 - D: La potestad disciplinaria corresponde al servicio de salud en el que el interesado se encuentre prestando servicios en el momento de comisión de la falta, con independencia de aquel en que obtuvo el nombramiento.

- 5 El Ministerio de Sanidad respecto a las entidades no integradas en el Sistema Nacional de Salud NO ejercerá:
 - A: Control de la titularidad de las relaciones laborales del personal que en ellos preste su servicio.
 - B: Control con las actividades de salud pública.
 - C: Control en materia de garantías de información.
 - D: Control en materia de seguridad.

- 6 Según la ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente, señale la respuesta FALSA:
- A: Según la normativa vigente el paciente tiene derecho de acceso al contenido íntegro de su historia clínica
 - B: Según la normativa vigente el paciente tiene derecho de acceso al contenido íntegro de su historia clínica, con ciertas limitaciones
 - C: El acceso de un tercero a la historia clínica, motivado por un riesgo para su salud, se limitará a los datos pertinentes
 - D: El derecho de acceso del paciente a la historia clínica puede ejercerse también por representación debidamente acreditada
- 7 Uno de los siguientes tipos de estudios NO es un estudio analítico observacional:
- A: Estudio de cohortes.
 - B: Ensayo Clínico Aleatorizado.
 - C: Estudio de casos y controles
 - D: Estudio transversal
- 8 Respecto al modelo EFQM, es FALSO:
- A: El criterio de Liderazgo se considera como un agente facilitador.
 - B: El criterio de Procesos se considera un agente facilitador
 - C: Tiene 10 criterios: 5 agentes facilitadores y 5 criterios de resultados.
 - D: La autoevaluación del EFQM permite identificar los puntos fuertes de la organización y las áreas de mejora.
- 9 El llamado "ciclo de mejora continua" incluye las siguientes fases, EXCEPTO:
- A: Análisis de la realidad y planificación de objetivos.
 - B: Realizar las acciones necesarias para desarrollar los objetivos fijados.
 - C: Determinar los incentivos necesarios para retribuir a los profesionales que cumplen los objetivos.
 - D: Evaluar los resultados obtenidos para aprender de los errores y fracasos.
- 10 Las recomendaciones desarrolladas de manera explícita y sistemática para ayudar al clínico y al paciente a tomar decisiones adecuadas en circunstancias clínicas específicas, reciben el nombre de:
- A: Revisión sistemática.
 - B: Consensos de experto.
 - C: Guía de práctica clínica.
 - D: Vías clínicas.
- 11 Con respecto a la dismorfia septal ¿Cuál de las siguientes repuestas es INCORRECTA?
- A: Las dismorfias congénitas pueden ser por compresiones intrauterinas
 - B: Las deformaciones septales que afectan a las áreas I,II,III son de menor impacto funcional que las que afectan a las áreas IV y V.
 - C: Son más frecuentes en la raza caucásica
 - D: La zona más vulnerable es la unión condrovomeriana
- 12 En la tromboflebitis del seno cavernoso NO aparece:
- A: Síndrome del ápex orbitario
 - B: Malestar general con cefalea
 - C: Afectación del ojo contralateral
 - D: Miosis

- 13** Los colgajos tisulares libres, para la reconstrucción cervico-facial, se denominan compuestos:
- A: Si asocian varios tipos de tejidos incluidos huesos, músculos, y componentes fasciocutáneos.
 - B: Si asocian únicamente el componente fasciocutáneo.
 - C: Si conservan el pedículo vasculo-nervioso sin seccionar.
 - D: Pueden incluir diferentes tejidos, pero no pueden incluir tejidos óseos.
- 14** Indica la respuesta correcta, sobre los cánceres de piel de cabeza y cuello:
- A: El tamaño tumoral no es un factor de riesgo.
 - B: La incidencia global de metástasis ganglionares es superior al 90% de casos.
 - C: La presencia de metástasis ganglionares no significa un mal pronóstico.
 - D: Los carcinomas basocelulares rara vez metastatizan en los ganglios linfáticos.
- 15** La primera ley de Ewald afirma que:
- A: El eje del nistagmo es igual al eje del conducto que lo genera.
 - B: El nistagmo espontáneo es, siempre, patológico.
 - C: En los nistagmos de origen vestibular, sólo la fase lenta se debe a la enfermedad vestibular.
 - D: La fase rápida, o de sacudida, define por convención, el sentido del nistagmo.
- 16** El segundo arco branquial o hioideo da origen los siguientes músculos, EXCEPTO uno. Señale el músculo que NO deriva del segundo arco.
- A: El músculo del estribo.
 - B: El músculo masetero.
 - C: El músculo estilohioideo.
 - D: El vientre posterior del músculo digástrico.
- 17** En relación a las fracturas longitudinales del hueso temporal, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?
- A: Predomina en ellas la hipoacusia de transmisión.
 - B: Es frecuente encontrar el signo de Battle.
 - C: La afectación de la cápsula ótica suele ser constante.
 - D: La otorragia es un hallazgo muy habitual.
- 18** ¿Cuál de las siguientes respuestas se considera más importante para el diagnóstico de la Enfermedad Autoinmune del oído interno?
- A: Western-blot
 - B: Estudio de poblaciones linfocitarias en sangre periférica
 - C: Respuesta clínica favorable al tratamiento con corticoides
 - D: Test de inhibición de migración de linfocitos
- 19** Señale la respuesta INCORRECTA respecto a la hendidura laríngea:
- A: Es una alteración congénita poco frecuente
 - B: Se caracteriza por una separación incompleta entre el esófago y el eje laringotraqueal
 - C: No se asocia a prematuridad
 - D: Lo habitual es que se presente como una malformación aislada

- 20** En la base de cráneo anterior; el techo de las celdas más superiores, localizadas por delante de la lamela basal del cornete medio, es parte del hueso:
- A: Frontal
 - B: Etmoidal
 - C: Esfenoidal
 - D: Palatino
- 21** Según la clasificación clínica de la función facial de House-Brackmann, la disfunción severa es un grado:
- A: Grado V
 - B: Grado VI
 - C: Grado I
 - D: Grado II
- 22** ¿Cuál es el tumor maligno más frecuente en el oído medio?
- A: Adenocarcinoma
 - B: Carcinoma epidermoide
 - C: Condrosarcoma
 - D: Metástasis
- 23** En las sinusitis infantiles ¿Qué respuesta es FALSA?
- A: En la edad infantil, las celdas etmoidales son las más afectadas
 - B: Los virus respiratorios más comunes son los rinovirus.
 - C: El agente etiológico bacteriano más frecuente en la sinusitis agudas es la *Moraxella Catarrhalis*
 - D: La complicación más frecuente es la celulitis preseptal
- 24** Los criterios clásicos para calificar una adenopatía como metástasis de origen desconocido son los siguientes, EXCEPTO:
- A: Ausencia de antecedentes de lesión maligna
 - B: Presencia de manifestaciones clínicas específicas de algún órgano
 - C: Ausencia de datos de laboratorio que demuestren la existencia de una neoplasia
 - D: Comprobación histológica de la malignidad de una adenopatía
- 25** Dentro de los tumores petroclivales o del ápex petroso, ¿cuál es el más frecuente?
- A: Cordoma
 - B: Quiste aracnoideo
 - C: Meningioma
 - D: Granuloma de colesterol
- 26** El granuloma laríngeo postintubación es bilateral en torno al:
- A: 10,00%
 - B: 20,00%
 - C: 50,00%
 - D: 90,00%

- 27** En relación a los quistes de conducto tirogloso, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?
- A: La mayoría se presentan en niños y adolescentes como una masa ceryical en línea media
 - B: Es aconsejable comprobar la existencia de tejido tiroideo en su localización habitual, previamente a la cirugía
 - C: La resección con la técnica de Sistrunk reduce las recurrencias del quiste
 - D: El carcinoma en el quiste tirogloso es raro que sea de origen tiroideo
- 28** Los cartílagos aritenoides se pueden desplazar 2 mm. hacia delante gracias a la acción del:
- A: Musculo cricotiroideo
 - B: Músculo cricoaritenosoideo
 - C: Músculo interaritenosoideo
 - D: Músculo tiroaritenosoideo
- 29** ¿Qué hueso del macizo facial se fractura con más frecuencia?
- A: La lámina papirácea
 - B: El hueso propio nasal
 - C: El suelo de la órbita
 - D: El hueso lagrimal
- 30** En relación a las pruebas de imagen utilizadas para valorar una otitis externa maligna cuál es FALSA:
- A: La gammagrafía Galio-67 es útil para evaluar la respuesta al tratamiento
 - B: La TC es útil para valorar extensión y complicaciones
 - C: La gammagrafía Tecnecio-99 detecta afectación ósea de manera precoz
 - D: La gammagrafía Galio-67 con afectación ósea es un criterio mayor diagnóstico
- 31** ¿Qué clasificación describe los distintos tipos de timpanoplastias, según las situaciones patológicas observadas?
- A: La de Palva
 - B: La de Rambo
 - C: La de Wüllstein
 - D: La de Von Bekesy
- 32** ¿Cuál es la etiología más frecuente de las hipoacusias prenatales adquiridas?
- A: Ototoxicidad
 - B: Infecciones
 - C: Radiaciones
 - D: Ninguna de las anteriores
- 33** ¿De dónde derivan el cartilago tiroides, corniculados, constrictor inferior faringe, aorta izquierda embrionaria y parte proximal subclavia derecha?
- A: Tercer arco
 - B: Cuarto arco
 - C: Quinto arco
 - D: Sexto arco

- 34** ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA en relación con las anomalías del aparato branquial?
- A: El quiste de la 2ª hendidura puede estar en relación con los grandes vasos cervicales
 - B: La otorrea puede ser manifestación de anomalía de la 1ª hendidura
 - C: Las anomalías derivadas de la 3ª hendidura son las más frecuentes
 - D: La duplicación del CAE y pabellón es anomalía de la 1ª hendidura
- 35** Señale cuál de estas afirmaciones es FALSA en relación a la atresia de coanas congénita:
- A: Es la anomalía congénita nasal más común.
 - B: Lo más frecuente es que el cierre de la coana sea solo óseo.
 - C: Son algo más frecuentes las formas unilaterales que las bilaterales.
 - D: La cirugía endoscópica es un abordaje utilizado en muchos casos.
- 36** En el liquen plano encontramos las estrías de Wickham ¿en qué forma?
- A: Forma reticular
 - B: Forma papular
 - C: Forma en placa
 - D: Forma atrófica
- 37** ¿Cómo se denomina el síndrome caracterizado por micrognatia, glosoptosis y paladar hendido?
- A: Crouzon
 - B: Treacher Collins
 - C: Pierre Robin
 - D: West
- 38** La enfermedad de Schölein-Henoch es una:
- A: Vasculopatía adquirida
 - B: Vasculopatía congénita
 - C: Trombocitopenia
 - D: Trombocitopatía
- 39** ¿Cuál de los siguientes agentes terapéuticos NO tiene recomendación de uso, según evidencia actual, en la rinosinusitis aguda viral o catarro común?
- A: Corticosteroides nasales
 - B: Descongestionantes nasales
 - C: Bromuro de ipratropio
 - D: Gluconato de Zinc
- 40** Indique cuál es el estadio tumoral de un carcinoma epidermoide de laringe que afecta a la epiglotis infrahioidea, la banda y el espacio preepiglótico:
- A: T1
 - B: T2
 - C: T3
 - D: T4

41 Respecto al SAOS una de las siguientes respuestas es FALSA:

- A: El SAOS es una enfermedad que supone un alto impacto económico y una gran repercusión social
- B: Los pacientes con SAOS tienen un riesgo mayor de tener bajas laborales y de sufrir accidentes de tráfico
- C: Los individuos con SAOS no tratados consumen un mayor número de recursos que los pacientes con SAOS tratados
- D: El tratamiento no ha demostrado disminuir el coste excesivo de las enfermedades cardiovasculares

42 ¿De dónde procede el 80% de la hormona tiroidea T3?

- A: De la actividad de la TSH
- B: De la transformación de la T4
- C: De la actividad de las células parafoliculares
- D: De la estimulación de la TRH

43 ¿Cuál de las siguientes complicaciones de la faringoamigdalitis aguda estreptocócica en la edad pediátrica es INCORRECTA?

- A: Fiebre reumática
- B: Corea de Huntington
- C: Trastorno neuropsiquiátrico autoinmune
- D: Glomerulonefritis aguda

44 ¿Cómo se denomina la falta de despegamiento del polo superior del pabellón auditivo del cráneo?

- A: Pabellones en copa
- B: Criptotia
- C: Minipabellón
- D: Microtia o atresia auris congénita

45 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA sobre los mucocelos?

- A: Para un buen tratamiento es indispensable la exéresis completa de la pared del mucocelo.
- B: En algunos casos de mucocelos gigantes puede plantearse el abordaje externo.
- C: La marsupialización es un tratamiento adecuado.
- D: La localización más frecuente es la frontoetmoidal.

46 ¿Qué finalidad tiene la maniobra de Heimlich?

- A: Abrir rápidamente la tráquea
- B: Facilitar la intubación
- C: Expulsar cuerpos extraños
- D: Facilitar la traqueotomía

47 En las embarazadas con SAOS, señale la respuesta INCORRECTA:

- A: El diámetro de la luz orofaríngea aumenta a medida que progresa la preñez
- B: En la mucosa nasal aparece una congestión
- C: El desplazamiento de los líquidos de los pies al cuello facilita el SAOS
- D: El aumento de la progesterona provoca un incremento de la ventilación

- 48** En relación con la cefalea de Horton o cefalea en racimos. ¿Cuál de las siguientes respuestas es FALSA?
- A: Es más frecuente en el sexo masculino
 - B: Es debida a una alteración vegetativa, aumento de la actividad simpática y disminución de la actividad parasimpática
 - C: Es de mal pronóstico el inicio tardío
 - D: Son típicos la rinorrea y el lagrimeo
- 49** ¿Cuál es el tumor maligno más frecuente del hueso temporal en el niño?
- A: Rabdomioma
 - B: Adenocarcinoma primario
 - C: Carcinoma epidermoide
 - D: Condrosarcoma
- 50** ¿Cuál es, entre las siguientes, la manifestación oral más común de la infección por VIH (SIDA)?
- A: La candidiasis oral
 - B: Las aftas recidivantes
 - C: El liquen plano
 - D: El papiloma epitelial orofaríngeo
- 51** Respecto a la papilomatosis laríngea recurrente, señale la respuesta INCORRECTA:
- A: Se presenta en respuesta a la infección por el virus del papiloma humano
 - B: Es la neoplasia laríngea más frecuente en los niños
 - C: Se suele presentar inicialmente con disfonía
 - D: La forma clínica de presentación más frecuente en los niños es la que corresponde a un papiloma solitario
- 52** ¿Dónde se localizan las células parafoliculares tiroideas?
- A: En el tercio superior de los lóbulos tiroideos
 - B: En el istmo tiroideo
 - C: En el tercio medio y posterior de los lóbulos tiroideos
 - D: Diseminadas en todo el tiroides
- 53** ¿Cuál es la bacteria, entre las siguientes, que se asocian con mayor frecuencia a la aparición de la Otitis Media Aguda?
- A: Staphilococcus aureus
 - B: Haemophilus influenza
 - C: Pseudomona aeruginosa
 - D: Streptococcus faecalis
- 54** ¿Cuál de los siguientes NO es un criterio de CENTOR de predicción de faringoamigdalitis aguda por Estreptocóco BHGA?
- A: Ausencia de tos
 - B: Comienzo brusco de los síntomas
 - C: Fiebre de más de 38°C
 - D: Exudado o hipertrofia amigdalal

- 55** En la técnica de dacriocistorrinostomía endonásal, se introduce una sonda de silicona a través de cada canalículo y se dejan suturados los dos cabos en el interior de la fosa nasal. La sonda se retira al cabo de:
- A: Dos o tres meses
 - B: Una semana
 - C: Dos días
 - D: A las 24 horas, una vez comprobado el drenaje lagrimal sobre la sonda en la fosa nasal
- 56** La amígdala palatina aparece entre el tercer y el quinto mes del desarrollo embrionario a partir:
- A: De las cuatro hendiduras branquiales ectoblásticas.
 - B: Del tercer arco branquial.
 - C: De la segunda bolsa faríngea.
 - D: Del cuarto arco branquial.
- 57** En el paciente laringectomizado, ¿Cuánta es la capacidad de retener aire en el esófago con carácter general?
- A: 200cc
 - B: 70cc
 - C: 15cc
 - D: 500cc
- 58** ¿Cuáles, entre los siguientes, son los nervios que se unen para formar el nervio vidiano?
- A: Nervio petroso profundo mayor y nervio de Jacobson.
 - B: Nervio petroso superficial mayor y ramas del ganglio ótico.
 - C: Nervio petroso profundo mayor y cuerda del tímpano.
 - D: Nervio petroso superficial mayor y nervio petroso profundo.
- 59** En la enfermedad de Marshall o síndrome PFAPA, señale la respuesta correcta:
- A: Su etiología es desconocida.
 - B: La elevación de la PCR es específica para su diagnóstico.
 - C: En los periodos intercrisis, puede existir febrícula.
 - D: Se la relaciona con la fiebre mediterránea familiar.
- 60** La utilización de la técnica de PCR permite detectar agentes víricos en la secreción de oído en la otitis media aguda. La infección vírica más frecuente detectada es:
- A: Virus respiratorio sincitial
 - B: Virus Influenza
 - C: Herpes Virus
 - D: Virus de Epstein Barr
- 61** Además de en los nódulos tóxicos, ¿En dónde aparece hipertiroidismo?
- A: Adenomas tiroideos
 - B: Bocios multinodulares
 - C: Carcinoma papilar
 - D: Graves Basedow

- 62** Marque la respuesta FALSA de estas posibles etiologías de hipoacusia perinatal:
- A: Hiperbilirrubinemia
 - B: Hipoxia
 - C: Rubeola
 - D: Prematuridad
- 63** ¿Qué músculo forma el esfínter esofágico superior?
- A: Constrictor superior
 - B: Constrictor medio
 - C: Cricofaríngeo
 - D: Cricotiroideo
- 64** Respecto a la parálisis del nervio facial en un paciente con fractura del hueso temporal cuál es FALSA:
- A: Es más frecuente en fracturas que afectan a la cápsula ótica
 - B: En caso de parálisis completa puede estar indicada la exploración quirúrgica
 - C: Si la parálisis se presenta de manera diferida al traumatismo el pronóstico suele ser peor
 - D: La electroneuronografía es útil para decidir la actitud terapéutica
- 65** Según la clasificación internacional de la anatomía del seno frontal (International Frontal Sinus Anatomy Classification IFAC 2016) una celda etmoidal anterior que se extiende en el seno frontal se denomina:
- A: Celda supra agger frontal
 - B: Celda de Khun tipo 2
 - C: Celda supraorbitaria
 - D: Celda etmoidal superior
- 66** ¿Cuál de estos es un método subjetivo de valoración de la audición?
- A: Potencial evocado de estado estable
 - B: Otoemisiones provocadas
 - C: Productos de distorsión
 - D: Logaudiometría
- 67** En un paciente que presenta un carcinoma epidermoide glótico T3 y que ha sido tratado realizando una laringectomía total y vaciamiento ganglionar. ¿En cuál de las siguientes circunstancias NO se indica la radioterapia postoperatoria según los protocolos de la NCCN (National Comprehensive Cancer Network)?
- A: Afección ganglionar clasificada como pN2b
 - B: Invasión del espacio paraglótico
 - C: Márgenes de resección positivos
 - D: Extensión extranodal
- 68** El tipo histológico más frecuente de carcinoma nasosinusal es:
- A: Adenocarcinoma
 - B: Carcinoma epidermoide
 - C: Carcinoma indiferenciado
 - D: Estesioneuroblastoma

- 69** Indique la respuesta correcta sobre la disfagia faringea de origen neurológico:
- A: No puede estar producida por la enfermedad de Parkinson.
 - B: No puede estar producida por el síndrome coreico (corea).
 - C: No puede estar producida por una esclerosis múltiple.
 - D: Puede estar producida por una lesión de X par craneal.
- 70** Indique la respuesta INCORRECTA, sobre las complicaciones de la cirugía de las paratiroides:
- A: Se pueden observar parálisis recurrenciales.
 - B: Se pueden dar hemorragias post-operatorias.
 - C: Se puede infectar la herida quirúrgica.
 - D: Nunca se observan complicaciones ni locales ni generales.
- 71** El agente etiológico más frecuente del edema de Reinke, entre los siguientes, es:
- A: El tabaquismo
 - B: El etilismo
 - C: El reflujo gastroesofágico
 - D: El hipotiroidismo
- 72** ¿Qué variedades del VPH se han relacionado más con el cáncer de orofaringe?
- A: 2 y 4
 - B: 8 y 29
 - C: 16 y 18
 - D: 18 y 39
- 73** ¿En qué síndrome es recomendable realizar la amigdalectomía en una posición neutra, sin hiperextensión, por el riesgo de inestabilidad occipito-atloaxoidea?
- A: Pierre Robin
 - B: Down
 - C: Cogan
 - D: Acondroplasia
- 74** La disnea laríngea:
- A: Siempre es inspiratoria.
 - B: Nunca es inspiratoria.
 - C: Puede ser inspiratoria y espiratoria.
 - D: Puede ser espiratoria.
- 75** ¿Las alteraciones cualitativas de la percepción olfativa se llaman?
- A: Hiperosmias
 - B: Cacosmias
 - C: Parosmias
 - D: Anosmias

- 76** ¿Cuál de estas maniobras podemos utilizar en el tratamiento del Vértigo Posicional Paroxístico Benigno del Canal Semicircular posterior?
- A: Maniobra de DIX HALLPIKE
 - B: Maniobra de GUFONI
 - C: Maniobra de EPLEY
 - D: Maniobra de YACOVINO
- 77** Cual de estas pruebas valora la función vestibular simulando el giro de cabeza con una intensidad más fisiológica (1-3 Hz)
- A: VEMPs
 - B: Prueba Calórica
 - C: vHIT
 - D: Test rotatorio
- 78** ¿Qué es INCORRECTO sobre los rinolitos?
- A: Se componen fundamentalmente de sales minerales
 - B: Se asientan más frecuentemente en el meato medio
 - C: Existe un predominio femenino
 - D: Los rinolitos bilaterales son infrecuentes
- 79** La deglución clásicamente se divide en tres fases. Señale la respuesta correcta:
- A: La primera fase es la oral y es voluntaria
 - B: La segunda fase es la esofágica y es voluntaria
 - C: La tercera fase es la faríngea y es voluntaria
 - D: En la primera fase de la deglución las vías aéreas están cerradas
- 80** ¿Cuál de estas complicaciones de la otitis media crónica es intracraneal?
- A: Tromboflebitis del seno lateral
 - B: Absceso de Luc
 - C: Absceso de Mouret
 - D: Absceso de Bezold
- 81** ¿Cuál de las siguientes citoquinas participan en la respuesta inmune de tipo 2 relacionada con la fisiopatología de rinosinusitis crónica con poliposis?
- A: IL4, IL5, IL 13
 - B: IL17, IL 22
 - C: Interferon gamma y TNF alfa
 - D: IL18, IL 12
- 82**Cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA en la Otitis externa maligna:
- A: La fiebre es un signo muy constante
 - B: La biopsia es imprescindible para el diagnóstico
 - C: Pueden afectarse pares craneales
 - D: La edad no es un factor relevante

- 83** En relación a la rinitis no alérgica con eosinofilia nasal (NARES), ¿Cuál de las siguientes respuestas es FALSA?
- A: Puede asociarse a intolerancia a AAS y asma
 - B: Responde mal a la corticoterapia tópica nasal
 - C: Los niveles de IgE total no están elevados
 - D: Cursa con clínica perenne
- 84** Los aneurismas de la carótida extracraneal más frecuentes son:
- A: Los de la bifurcación carótidea
 - B: Los de la carótida interna
 - C: Los de la carótida externa
 - D: Los renales
- 85** ¿Cuál de estos síntomas NO es típico de la Migraña Basilar?
- A: Crisis Vertiginosas
 - B: Hipoacusia
 - C: Acúfeno
 - D: Parálisis Facial
- 86** En la cirugía de implantación coclear, el "gusher" es más frecuente en:
- A: Citomegalovirus congénito
 - B: Meningitis
 - C: Otoesclerosis
 - D: Malformación coclear
- 87** Señale la respuesta correcta en relación con la anatomía patológica de la otosclerosis:
- A: Los focos de otosclerosis son más frecuentes en la raza negra.
 - B: Los focos de otosclerosis, tienen una localización más típica en la "fissula ante fenestram".
 - C: Los focos de otosclerosis, tienen una localización más típica en la "fossula post fenestram".
 - D: Los focos de otosclerosis no aparecen en la base de la apófisis estiloides.
- 88** El dolor faríngeo provocado o exacerbado durante la deglución (odinofagia) puede ser de origen faríngeo o extra faríngeo. Señale, de los siguientes, cuál tendría un origen faríngeo:
- A: La disfunción de la articulación temporomandibular
 - B: La neuralgia del nervio glosofaríngeo
 - C: La carotidodinia
 - D: La otalgia refleja
- 89** En relación a la parotiditis aguda epidémica ¿qué afirmación es correcta?
- A: La afectación parotídea es unilateral
 - B: Nunca se afectan las glándulas submaxilares y sublinguales
 - C: Su padecimiento no suele conferir inmunidad permanente
 - D: Puede provocar laberintitis e hipoacusia

- 90** ¿Cuál de estas lesiones neurales implica mejor pronóstico en una parálisis facial?
- A: Neurotmesis
 - B: Neuroapraxia
 - C: Axonotmesis
 - D: Degeneración walleriana
- 91** Con respecto a la rinomanometría. ¿Cuál es FALSA?
- A: El sistema más útil actualmente es la rinomanometría anterior activa
 - B: Estudia las resistencias mecánicas que ofrecen las fosas nasales.
 - C: Se basa en el análisis de la reflexión del sonido
 - D: Estudia el efecto de insuficiencias respiratorias de vías aéreas bajas que altera la función respiratoria nasal.
- 92** Una de estas teorías etiopatogénicas corresponde al colesteatoma congénito, indique la respuesta correcta:
- A: Metaplasia de la mucosa del oído medio
 - B: Proliferación papilar
 - C: Invaginación timpánica
 - D: Ausencia de reabsorción de células embrionarias epidérmicas
- 93** Una de las siguientes NO es causa de parálisis congénita de las cuerdas vocales:
- A: Compresión del tronco en el foramen magnum debida a una malformación de Arnold-Chiari
 - B: Estiramiento de las fibras proximales por el desplazamiento caudal del tronco del encéfalo
 - C: Disgenesia del bulbo afectando a los núcleos del vago
 - D: Hipóxia intermitente crónica causada por una apnea obstructiva del sueño
- 94** ¿Qué es la enfermedad de Sutton?
- A: Úlceras pequeñas en boca
 - B: Úlceras aftosas grandes recidivantes
 - C: Eritema oral
 - D: Gingivitis aftosa
- 95** El signo inmediato más frecuentemente asociado con una deformidad ósea postraumatismo nasal es:
- A: Edema
 - B: Desviación de tabique
 - C: Epístaxis
 - D: Crepitación
- 96** Según la clasificación de estadiaje por tomografía computerizada de Lund y Mckay, un paciente con ocupación completa del seno maxilar izquierdo, ocupación completa del complejo osteomeatal izquierdo, ocupación parcial del seno frontal izquierdo y ocupación parcial del seno etmoidal anterior izquierdo tendrá una puntuación de:
- A: 3
 - B: 6
 - C: 9
 - D: 12

- 97** ¿Qué tratamiento se debe dar en las aftosis bucales no palatales, primarias, recidivantes?
- A: Antimicóticos
 - B: Antibióticos
 - C: Corticoides preventivos
 - D: Vacunas
- 98** ¿Qué nervio inerva el músculo omohioideo?
- A: Nervio neumogástrico
 - B: Ramo nervioso de C4
 - C: Nervio glossofaríngeo
 - D: Nervio hipogloso
- 99** Indique la respuesta correcta, a propósito de la estomatitis herpética:
- A: Puede estar causada tanto por VHS tipo 1 como por tipo 2.
 - B: Es una enfermedad no viral.
 - C: Se dan más seropositivos en las clases de mayor nivel socioeconómico.
 - D: Es una alteración ótica.
- 100** ¿Cómo es la voz del paciente cuanto más baja se sitúa la fístula fonatoria?
- A: Más grave
 - B: Más aguda
 - C: Más potente
 - D: Menos potente
- 101** ¿Cuál es la respuesta verdadera sobre la mucosa olfatoria?
- A: Tiene un epitelio ciliado pseudoestratificado
 - B: La célula neurosensorial olfatoria es monopolar
 - C: Las células sustentaculares pueden transformarse en células neurosensoriales
 - D: La estimulación olfatoria no estimula la regeneración de las células neurosensoriales
- 102** Una de las siguientes denominaciones NO hace referencia a una parte del cartílago alar inferior, señale de cuál se trata:
- A: Crura medial
 - B: Crura intermedia
 - C: Crura lateral
 - D: Crura marginal
- 103** En relación al adenoma pleomorfo de parótida, ¿cuál de éstas afirmaciones es FALSA?
- A: Es el tumor parotídeo más frecuente
 - B: Con el tiempo puede malignizar
 - C: Tiene tendencia a la recidiva
 - D: La parálisis facial es frecuente en tumores grandes

- 104** Señale la respuesta correcta con respecto a la válvula de Hasner:
- A: Corresponde a la porción más anterior del vestíbulo nasal, entre la cabeza del cornete y el cartílago alar inferior.
 - B: Forma parte del ductus lagrimonasal y se encuentra en el meato inferior de la fosa nasal.
 - C: Es el reborde prominente de la parte más distal de la trompa de Eustaquio y está formada por la musculatura del rodete tubárico.
 - D: Se encuentra localizada en el ángulo supero-externo de la órbita entre lóbulo palpebral y el lóbulo orbitario de la glándula lagrimal.
- 105** El MEN II b incluye Carcinoma medular de tiroides, feocromocitoma y:
- A: Carcinoma renal
 - B: Carcinoma suprarrenal
 - C: Ganglioneuroma
 - D: Tumor ovárico
- 106** ¿Cuál es la clasificación N clínica de una adenopatía metastásica de un carcinoma de células escamosas de origen desconocido, con resultado negativo en la evaluación del HPV (virus del papiloma humano) y del virus de Epstein-Barr, que tiene un tamaño de 4,5 cm en su mayor dimensión, que infiltra el tejido muscular próximo a ella?
- A: N1
 - B: N2a
 - C: N2b
 - D: N3b
- 107** Indique la respuesta correcta, a propósito de las perforaciones de hipofaringe:
- A: Son trastornos banales.
 - B: No deben buscarse de forma sistemática ante una mediastinitis de origen incierto.
 - C: La dieta oral debe ser a base de verduras.
 - D: Precisan un tratamiento urgente, dadas las posibles complicaciones que se puedan dar.
- 108** ¿Cual es el objetivo primordial del colgajo de Palva?
- A: Limitar el volumen de la cavidad de vaciamiento petromastoideo
 - B: Acceder a la trompa de Eustaquio
 - C: Visualizar el annulus
 - D: Ninguna de las anteriores
- 109** Respecto al vaciamiento radical clásico de cuello, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?
- A: Consiste en la extirpación de los tejidos que contienen los ganglios linfáticos de un lado del cuello
 - B: Incluye la sección del nervio espinal
 - C: Se extirpa la vena yugular interna
 - D: Conserva el músculo esternocleidomastoideo
- 110** Respecto a las indicaciones absolutas de la amigdalectomía en niños, señale la respuesta correcta:
- A: Síndrome PANDAS
 - B: Síndrome PFAPA
 - C: Apnea obstructiva del sueño grave
 - D: Nefropatía por IgA



