

**PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN PLAZAS DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN.**

Resolución de 17 de diciembre de 2020 (publicada en B.O.A. nº 16 de 26/1/2021)

Categoría:

**Facultativo Especialista de Área en Medicina del Trabajo  
LLAMAMIENTO EXCEPCIONAL****ADVERTENCIAS:**

- No abra este cuestionario hasta que se le indique.
- Este cuestionario consta de 110 preguntas de las cuales las 10 últimas son de reserva. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la "Hoja de Examen" entre los números 1 y 110.  
Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario solicite su sustitución.
- **El tiempo de realización de este ejercicio es de: 120 MINUTOS.**
- Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor. Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las no contestadas no tendrán valoración alguna y las contestadas erróneamente restarán un tercio del valor de la respuesta correcta.
- Compruebe siempre que el número de respuestas que señale en la "Hoja de Examen" es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario.
- En cada pregunta existe una y sólo una respuesta correcta.
- Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- No se permite el uso de calculadora, libros ni documentación alguna, móvil o ningún otro elemento electrónico.
- Cualquier marca en la hoja de respuestas podrá dar lugar a la anulación del examen.

**SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR EN LA "HOJA DE EXAMÉN" LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.****ESTE CUESTIONARIO NO DEBERÁ SER DEVUELTO AL FINALIZAR EL EJERCICIO.****TODOS LOS MÓVILES DEBERÁN ESTAR APAGADOS****SU OMISIÓN PODRÁ SER MOTIVO DE EXPULSIÓN.**



## FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA EN MEDICINA DE TRABAJO

---

- 1 Dentro de las principales diferencias entre los estudios cuasi-experimentales y los estudios experimentales, se encuentran todas EXCEPTO una:
  - A: No hay aleatorización en la distribución de los sujetos en los grupos.
  - B: No existe un control absoluto de todas las variables relevantes.
  - C: Son más vulnerables a los sesgos.
  - D: Hay una hipótesis que contrastar.
  
- 2 La denominación de Consentimiento Informado (CI) nace en un contexto legal por la necesidad de manifestar externamente la información y el consentimiento, para que sea conocido por los demás y de forma escrita. Existen tres tipos de CI. Indique cual NO es un tipo de CI:
  - A: Consentimiento tácito o implícito.
  - B: Consentimiento expreso o informado.
  - C: Consentimiento cooperativo.
  - D: Consentimiento presunto.
  
- 3 Señale la respuesta INCORRECTA según lo estipulado en el artículo 48 de la Ley 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón:
  - A: La Comunidad Autónoma de Aragón velará por el cumplimiento del principio de igualdad entre mujeres y hombres en los planes de prevención de riesgos.
  - B: Los planes de prevención de riesgos que se apliquen a los centros de trabajo de la Comunidad Autónoma de Aragón prestarán especial atención a la salud de las trabajadoras durante el embarazo, en el período inmediato a su reincorporación laboral tras el parto y durante la lactancia.
  - C: Los departamentos competentes en materia de salud y seguridad y de salud laboral deben registrar, debidamente desglosados por sexo, edad y ocupación, los procesos de incapacidad temporal, tanto por contingencias comunes como por contingencias profesionales.
  - D: El Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud deberá fomentar la recogida y el tratamiento de la información existente en los centros de atención primaria y en las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, desglosada por sexos, a fin de identificar riesgos específicos en las trabajadoras debido a su actividad laboral.
  
- 4 En el marco de la evolución y cambios sociales del mundo occidental, la implicación de los profesionales para adaptarse a las demandas de la sociedad ha originado su implicación en la gestión clínica, que descansa en tres pilares fundamentales. Por favor indique cual NO es un pilar:
  - A: Orientación al proceso asistencial.
  - B: Lo importante no es la eficiencia económica.
  - C: Realizar autoevaluación permanente.
  - D: Tener autonomía de gestión.

- 5 La Ley 39/2015, de 1 de octubre, regula:
- A: El Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
  - B: El Régimen Jurídico de las Administraciones Autonómicas.
  - C: El Régimen Jurídico del Sector Público.
  - D: El régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
- 6 El proyecto de GUÍA-SALUD consiste en todas las siguientes premisas, indique la que NO es correcta:
- A: Es un organismo del Sistema Nacional de Salud, en el que participan las 17 Comunidades Autónomas y el Ministerio de Sanidad.
  - B: Fue creado en el año 2002 y adaptado en el 2003 por el Consejo Interterritorial como instrumento para mejorar la calidad de la Atención Sanitaria en el Sistema Nacional de Salud.
  - C: El Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón ejerce la secretaría del Organismo.
  - D: En la página web de GUÍA-SALUD, es el mecanismo por el que se facilita el acceso a Guías de Práctica Clínica elaboradas por el Sistema Nacional de Salud.
- 7 La gestión de la Calidad total es un sistema para el que, satisfacer al cliente, es mas importante que obtener resultados. ¿Cuál de de estos elementos NO es un elemento de la calidad total?.
- A: La tecnología.
  - B: Los recursos humanos.
  - C: El proceso.
  - D: El cliente.
- 8 Según la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, tendrá la consideración de falta muy grave:
- A: La negativa expresa a hacer uso de los medios de protección disponibles y seguir las recomendaciones establecidas para la prevención de riesgos laborales.
  - B: El descuido o negligencia en el cumplimiento de sus funciones cuando-no afecte a los servicios de salud, Administración o usuarios.
  - C: La incorrección con los superiores, compañeros, subordinados o usuarios.
  - D: El incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que, acumulado, suponga más de 20 horas al mes.
- 9 Para considerar la modificación de servicios ya incluidos en la cartera de servicios del Sistema de Salud de Aragón, centros sanitarios y unidades clínicas, debe producirse, al menos, una de las siguientes circunstancias (situaciones de modificación de las condiciones de uso de servicios), EXCEPTO una:
- A: La mejora de la calidad de vida percibida por los usuarios.
  - B: El incremento de la eficacia y/o efectividad.
  - C: El aumento de la productividad.
  - D: Máxima utilización de recursos para alcanzar un nivel concreto de efectividad.
- 10 Según la Ley General de Sanidad, los servicios sanitarios adecuarán su organización y funcionamiento a los principios de:
- A: Eficacia, celeridad, economía y flexibilidad.
  - B: Eficiencia, economía y flexibilidad.
  - C: Eficacia, calidad, economía y flexibilidad.
  - D: Eficacia, eficiencia y calidad.

- 11** El antagonista del metanol es:
- A: El etanol, por su acción competitiva con la aldehidodeshidrogenasa, ADH.
  - B: El etanol, porque revierte el efecto funcional del metanol.
  - C: El etanol, por su acción competitiva en la absorción digestiva.
  - D: La aldehído deshidrogenasa.
- 12** El tumor radioinducido más común es:
- A: Mama.
  - B: Leucemia.
  - C: Próstata.
  - D: Osteosarcoma.
- 13** ¿Cómo se le considera a una trabajadora embarazada de 12 semanas en un puesto de trabajo con exposición a antineoplásicos desde el punto de vista de vigilancia de la salud?
- A: Debe aconsejarse incapacidad temporal por causa común.
  - B: Trabajadora especialmente sensible.
  - C: Riesgo laboral para el embarazo.
  - D: Situación de incapacidad temporal por contingencia profesional.
- 14** ¿Qué periodicidad de los exámenes de salud establece el Protocolo de Vigilancia Sanitaria Asma Laboral, para un Nivel de Riesgo I (aceptable)?:
- A: Cada tres años.
  - B: Cada dos años.
  - C: Cada año.
  - D: Cada seis meses.
- 15** El método diseñado por la Régie National d'Usines Renault (R.N.U.R.) o Método de los perfiles de puestos evalúa los factores ergonómicos de la carga mental a partir de los indicadores:
- A: Rapidez de ejecución y nivel de atención.
  - B: Operaciones mentales y nivel de atención.
  - C: Presión de tiempos, esfuerzo de atención, fatiga percibida, sobrecarga y percepción subjetiva de la dificultad.
  - D: Apremio de tiempo, complejidad-rapidez, atención y minuciosidad.
- 16** En el tratamiento farmacológico de la deshabitación tabáquica, es FALSO:
- A: Se administran parches de nicotina desde el día en que se produce el cese del consumo.
  - B: Se puede tomar Bupropion 150 mg (1-1-0) iniciando tratamiento la semana previa con 150 mg/día.
  - C: La Varenaclina es el tratamiento más eficaz en monoterapia.
  - D: Los parches de nicotina no se deben combinar con el uso de chicles, comprimidos o spray bucal de nicotina.
- 17** Una persona trabajadora con una hernia discal C4-C5 y radiculopatía C5 tendrá abolido/afectado el reflejo:
- A: Bicipital.
  - B: Bicipital y estiloradial.
  - C: Tricipital.
  - D: Tricipital y estilocubital.

- 18** Según el RDL 8/2015, Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en las situaciones determinantes de Incapacidad Temporal, ¿cuál es la duración máxima de dicha situación de Incapacidad Temporal?:
- A: Ciento ochenta días, prorrogables por otros ciento ochenta días cuando se presuma que durante ellos puede el trabajador ser dado de alta médica por curación.
  - B: Trescientos sesenta y cinco días, prorrogables por otros ciento ochenta días cuando se presuma que durante ellos puede el trabajador ser dado de alta médica por curación.
  - C: Trescientos sesenta y cinco días, prorrogables por otros trescientos sesenta y cinco días cuando se presuma que durante ellos puede el trabajador ser dado de alta médica por curación.
  - D: Trescientos sesenta y cinco días, no prorrogables.
- 19** ¿Cuáles de los siguientes métodos para estimar la carga mental de trabajo NO es un método objetivo?
- A: Método NASA TLX.
  - B: Método LEST.
  - C: Método RNUR.
  - D: Método OWAS.
- 20** Trabajador de 53 años sin antecedentes de interés que tras un mal movimiento en el trabajo nota un dolor lumbar que al pasar las horas irradia hacia la pierna derecha por la parte posterior y llega al borde lateral del pie. Presenta en la exploración maniobra de Lasègue positiva a 40º, reflejo aquileo abolido y no se puede poner de puntillas. El diagnóstico etiológico más probable es:
- A: Hernia discal L2-L3 derecha.
  - B: Hernia discal L3-L4 derecha.
  - C: Hernia discal L4-L5 derecha.
  - D: Hernia discal L5-S1 derecha.
- 21** ¿Cuál es la principal complicación en caso de ingestión de tricloroetileno?
- A: Confusión y somnolencia.
  - B: Neumonía por aspiración.
  - C: Vómitos.
  - D: Insuficiencia hepática.
- 22** El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, en los términos previstos en el Reglamento (UE) 2016/679, cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de:
- A: Real Decreto.
  - B: Ley.
  - C: Orden.
  - D: Decreto.
- 23** El Protocolo de Vigilancia Específica del Amianto recoge el contenido de los exámenes de salud de los trabajadores, señale la prueba que NO está incluida:
- A: Inspección y búsqueda de acropaquias.
  - B: Auscultación y búsqueda de crepitantes.
  - C: Control biológico de biomarcadores.
  - D: Estudio funcional respiratorio.

- 24** ¿Cuál de los siguientes agentes químicos no tienen asignado Valores Límites Ambientales en el documento "Límites de exposición profesional para agentes químicos en España para el 2021?"
- A: El formaldehído.
  - B: El glutaraldehído.
  - C: El monóxido de carbono.
  - D: El sevoflurano.
- 25** Se consideran efectos estocásticos por radiaciones ionizantes, los siguientes EXCEPTO:
- A: Leucemia.
  - B: Radiodermatitis crónica.
  - C: Epitelioma espinocelular cutáneo.
  - D: Osteosarcoma.
- 26** Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo:
- A: El trabajador tiene derecho a paralizar la actividad, aunque no hubiese recibido instrucciones de actuación y bajo su propio criterio.
  - B: Este derecho a la paralización solo pueden ejercerlo los delegados de prevención, por mayoría simple de sus miembros.
  - C: El empresario no está obligado a informar a los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de protección.
  - D: Los trabajadores y sus representantes pueden sufrir perjuicio derivado de la adopción de medidas de protección a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave.
- 27** En relación a las reacciones fisiológicas que generan estrés en el organismo, señale la respuesta INCORRECTA:
- A: Los factores estresantes activan los sistemas noradrenérgicos.
  - B: Los factores estresantes disminuyen la neurotransmisión dopaminérgica.
  - C: El hipotálamo secreta el factor liberador de corticotropina generando liberación hormona adrenocorticotropa.
  - D: La generación del eje hipotálamo - hipófisis - suprarrenal puede generar una respuesta tanto de inhibición como de activación del sistema inmunitario.
- 28** Señale la respuesta correcta respecto al Riesgo Relativo:
- A: Mide la proporción de casos atribuibles a la exposición.
  - B: Se calcula mediante la diferencia de riesgos entre expuestos y no expuestos.
  - C: Indica la magnitud de un problema de salud.
  - D: Estima la fuerza de asociación entre exposición y efecto de la misma.
- 29** ¿Dónde desecharía una jeringa vacía utilizada para administrar medicación habitual?
- A: Contenedor amarillo de punzantes.
  - B: Grupo III.
  - C: Grupo II.
  - D: Grupo I.

- 30** Entre las recomendaciones para los sanitarios que realizan viajes de cooperación internacional, es FALSO que:
- A: La vacunación frente a la fiebre amarilla se deber realizar al menos 10 días antes del viaje.
  - B: La vacuna inyectable frente a la fiebre tifoidea debe administrarse al menos 3 semanas antes del viaje.
  - C: La vacuna de hepatitis A debe administrarse al menos 6 meses antes de la partida.
  - D: Para que la quimioprofilaxis antipalúdica sea eficaz se deberá seguir tomando durante las 4 semanas siguientes del abandono de la zona palúdica.
- 31** De acuerdo con el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, cual de las siguientes dosis efectiva para personas profesionalmente expuestas es cierta:
- A: 500 mSv/año oficial.
  - B: 100 mSv/5 años oficiales consecutivos.
  - C: 150 mSv/año oficial.
  - D: 200 mSv/5 años oficiales consecutivos.
- 32** En virtud de lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 25 sobre protección de trabajadores especialmente sensible a determinados riesgos. Indique la opción correcta.
- A: El empresario deberá tener en cuenta en las evaluaciones los factores de riesgo que puedan incidir en la función de procreación de los trabajadores y trabajadoras, en particular por la exposición a agentes físicos, químicos y biológicos que puedan ejercer efectos mutagénicos o de toxicidad para la procreación, tanto en los aspectos de la fertilidad, como del desarrollo de la descendencia, con objeto de adoptar las medidas preventivas necesarias.
  - B: El empresario deberá tener en cuenta en el plan de prevención de riesgos laborales los factores de riesgo que puedan incidir en la función de procreación de los trabajadores y trabajadoras, en particular por la exposición a agentes físicos, químicos y biológicos que puedan ejercer efectos mutagénicos o de toxicidad para la procreación, tanto en los aspectos de la fertilidad, como del desarrollo de la descendencia, con objeto de adoptar las medidas preventivas necesarias.
  - C: El empresario deberá tener en cuenta en las evaluaciones los factores de riesgo que puedan incidir en la función de procreación de las trabajadoras, en particular por la exposición a agentes físicos y químicos que puedan ejercer efectos mutagénicos para la procreación, tanto en los aspectos de la fertilidad, como del desarrollo de la descendencia, con objeto de adoptar las medidas preventivas necesarias.
  - D: El empresario deberá tener en cuenta en las evaluaciones los factores de riesgo de naturaleza física que puedan incidir en la función de procreación de las trabajadoras, por la exposición a agentes físicos que puedan ejercer efectos mutagénicos o de toxicidad para la procreación, tanto en los aspectos de la fertilidad, como del desarrollo de la descendencia, con objeto de adoptar las medidas preventivas necesarias.
- 33** Se entiende por accidente de trabajo:
- A: Toda lesión corporal que un trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena, si de dicha lesión precisa asistencia médica.
  - B: Toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo y que dé lugar a una baja laboral.
  - C: Toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.
  - D: Toda lesión corporal que un trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena, si de dicha lesión precisa asistencia médica, aunque no requiera baja.

- 34** ¿Cuál de los siguientes tóxicos pueden producir cuadros de psicosis en trabajadores manuales?
- A: Disulfuro de carbono.
  - B: Arsénico.
  - C: Antimonio.
  - D: Cadmio.
- 35** ¿Qué tipo de análisis es el más frecuente utilizado en la vigilancia colectiva de la salud?
- A: Casos y controles.
  - B: Estudios de intervención comunitaria.
  - C: Cohortes.
  - D: Transversales.
- 36** Sobre las lesiones oculares tras exposición a radiaciones, señale la respuesta INCORRECTA:
- A: La exposición intensa y sin protección a rayos ultravioleta sin protección puede provocar una queratitis descamativa superficial.
  - B: La fotoqueratitis se manifiesta con lagrimeo, fotofobia, quemosis y puede provocar blefaroespasmos.
  - C: En función de la edad y la dosis recibida, tras un periodo de latencia más o menos prolongado, la lesión más frecuente tras exposición a radiaciones ionizantes es la catarata.
  - D: El efecto lesivo del láser es independiente de la longitud de onda, por lo que no es necesario usar equipos de protección.
- 37** Indique cual de las siguientes definiciones es correcta:
- A: La fracción de polvo respirable es la fracción del aerosol capaz de llegar a unidades alveolares. El 100% está compuesto por partículas de 1 micra o menor.
  - B: Las partículas de más de 5 micras quedan depositadas en vías aéreas superiores.
  - C: La fracción de sílice cristalina respirable es la proporción de sílice que se encuentra en el polvo respirable.
  - D: El cuarzo, la cristobalita y la sistovita tienen capacidad fibrogénica.
- 38** En relación con el riesgo de transmisión del virus de la hepatitis B en trabajadores sanitarios señale la respuesta INCORRECTA:
- A: El riesgo de transmisión por exposición accidental de riesgo a sangre contaminada por el VHB en trabajadores no inmunizados es menor del 6% si la paciente fuente es AgHBe negativo.
  - B: Se recomienda realizar estudio de marcadores postvacunales a todos los sanitarios con vacunación previa, completa documentada, si no se les realiza evaluación serológica cuando fueron vacunados.
  - C: Los marcadores antiHBs solo tienen valor si se realizan entre 1-2 meses después de la última dosis ya que entre el 15-50% se negativizan entre 5-15 años después de la última dosis.
  - D: En trabajadores sanitarios correctamente vacunados con pauta completa y documentada y sin serología previa conocida, si los antiHBs son menores de 10 mUI/ml no es necesario administrar ninguna dosis adicional si hace menos de 30 años de la vacunación.
- 39** La metodología PICO para formular preguntas de investigación específica cuatro componentes en dicha pregunta. ¿Cuál de ellos es FALSO?:
- A: Pregunta.
  - B: Intervención.
  - C: Comparación (opción diferente con la que se quiere comparar).
  - D: Resultados medibles a obtener.

- 40** En virtud de lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 27 sobre protección de los menores; antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, y previamente a cualquier modificación importante de sus condiciones de trabajo, el empresario deberá:
- A: Efectuar una evaluación de los puestos de trabajo a desempeñar por los mismos.
  - B: Asignarles un delegado de prevención que vigilará el desempeño de los mismos.
  - C: Asignarles un recurso preventivo que vigilará el desempeño de los mismos.
  - D: Adecuar el plan formativo en materia de riesgos laborales a las necesidades de los menores.
- 41** Señale la opción INCORRECTA en relación con la fibromialgia:
- A: Es una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud.
  - B: Tiene un código específico en la CIE-10.
  - C: Su prevalencia en nuestra población es elevada y afecta especialmente a mujeres de edad media.
  - D: Los familiares directos de las personas con fibromialgia no tienen mayor probabilidad de padecerla.
- 42** En virtud de lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 26 sobre protección de la maternidad; cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase posible o, a pesar de tal adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto:
- A: La trabajadora deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado.
  - B: La trabajadora, en cualquier caso, deberá solicitar la baja por contingencia común.
  - C: La trabajadora será declarada no apta por los servicios médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas.
  - D: La trabajadora será declarada no apta condicionada por los servicios médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas.
- 43** Entre las vacunas más recomendadas a todo el personal sanitario, en activo y en formación, NO se encuentra:
- A: Tétanos-difteria.
  - B: Fiebre tifoidea.
  - C: Hepatitis B.
  - D: Gripe.
- 44** En relación con las actividades de cribado y salud laboral señale la respuesta INCORRECTA:
- A: La ley 33/2011 General de Salud Pública establece que la normativa laboral puede prever la realización de pruebas de cribado.
  - B: La práctica de pruebas de detección precoz de enfermedad esta debe ser justificada explícitamente en base a los riesgos laborales específicos.
  - C: Las actividades de cribado en el ámbito laboral deben coordinarse con los programas de cribado poblacional, y no realizarse fuera de programas poblacionales organizados por la administración sanitaria.
  - D: Para las actividades de cribado en la empresa, al tratarse de actividades sanitarias de salud pública, no es de aplicación la consulta a los trabajadores con la debida antelación, acorde al art. 33 y 36 de la Ley 31/1995.
- 45** En que caso estaría indicado realizar una espirometría para la valoración médica de una persona trabajadora, que manipula uno de los siguientes medicamentos:
- A: Azatioprina.
  - B: L-asparaginasa.
  - C: Pentamidina.
  - D: Clorambucilo.

- 46 ¿Cuál de estas enfermedades pueden transmitirse de persona a persona?
- A: Carbunco.
  - B: Leptospirosis.
  - C: Brucelosis.
  - D: Ninguna de ellas.
- 47 De acuerdo con el protocolo de vigilancia sanitaria específica de movimientos repetidos de miembro superior en función de los signos y síntomas corresponde con un grado 3 la siguiente situación:
- A: Dolor en reposo y/o existencia de sintomatología sugestiva.
  - B: Dolor en reposo y/o existencia de sintomatología sugestiva, más contractura sin dolor a la movilización.
  - C: Dolor en reposo y/o existencia de sintomatología sugestiva, más contractura y/o dolor a la movilización, más dolor a la palpación y/o percusión.
  - D: Dolor en reposo y/o existencia de sintomatología sugestiva, más contractura y/o dolor a la movilización.
- 48 Entre las recomendaciones preventivas recogidas en el Protocolo de Vigilancia específica frente al ruido señale la opción INCORRECTA:
- A: En los casos en que exista una exposición conjunta a ruido y vibraciones mano-brazo establecer un seguimiento más estrecho de las personas que padezcan dedo blanco por vibraciones.
  - B: Cambiar de puesto y evitar la exposición de la mujer embarazada al ruido laboral a partir de la notificación de embarazo con la finalidad de prevenir posibles efectos en la audición del niño que va a nacer.
  - C: Si se detecta la toma de fármacos que pueden presentar una interacción con el ruido, reforzar la necesidad del uso de las medidas de protección y de su correcta utilización.
  - D: Caso de confirmarse la existencia de consumo de tabaco, proporcionar consejo antitabáquico.
- 49 La vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos a ruido en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción debe hacerse como mínimo con la siguiente periodicidad:
- A: Anual.
  - B: Cada 3 años.
  - C: Cada 5 años.
  - D: No se establece ninguna periodicidad.
- 50 Las medidas de prevención secundaria de agentes biológicos:
- A: Utilizan el diagnóstico precoz para disminuir la prevalencia.
  - B: Disminuyen la probabilidad de que aparezca la enfermedad.
  - C: Atenúan las consecuencias de la enfermedad.
  - D: Su objetivo es disminuir la incidencia.
- 51 La prevención en salud se establece en tres tipos de niveles que dependen del nivel en el que se encuentre la enfermedad. En relación con los niveles de prevención señale la respuesta FALSA:
- A: La vacunación es una estrategia de prevención primaria.
  - B: Los cribados son una estrategia de prevención secundaria.
  - C: La prevención primaria tiene como objetivo disminuir la prevalencia.
  - D: Los programas de promoción de hábitos saludables son una estrategia de prevención primaria.

- 52** Una zona de permanencia limitada para la exposición a radiaciones ionizantes, debe estar señalizada con el siguiente pictograma:
- A: Trébol amarillo sobre fondo blanco.
  - B: Trébol gris/azulado sobre fondo blanco.
  - C: Trébol rojo sobre fondo blanco.
  - D: Trébol verde sobre fondo blanco.
- 53** Señale la opción INCORRECTA en relación con la Infección Tuberculosa Latente (ITL):
- A: La persona con ITL no transmite la tuberculosis.
  - B: La persona con ITL tienen síntomas de tuberculosis.
  - C: El riesgo medio de progresión de una ITL a tuberculosis activa es de un 10% de los infectados.
  - D: La persona con ITL no tiene evidencia en la radiografía de tórax de enfermedad activa.
- 54** Para el reflejo bicipital, la respuesta normal consiste en:
- A: Una flexión del codo.
  - B: Una pequeña flexión del codo asociado a una inclinación radial de la muñeca.
  - C: Una flexión de los dedos de la mano.
  - D: Una extensión del codo.
- 55** De entre las siguientes pruebas complementarias en la vigilancia de la salud anual en trabajadores expuestos a cloruro de vinilo monómero, señale la que considera más útil:
- A: Alfafetoproteína.
  - B: Ecografía hepática.
  - C: Estudio de función hepática.
  - D: Hemograma anual.
- 56** Para tener derecho a prestaciones económicas de incapacidad temporal por accidente de trabajo se requiere:
- A: Un periodo de cotización de 180 días en los 5 años previos.
  - B: Estar en periodo de pruebas.
  - C: No se precisa periodo de cotización previo.
  - D: Causar baja por un periodo de tres meses.
- 57** Señale la respuesta CORRECTA:
- A: El trabajador deberá velar, según sus posibilidades, por su seguridad y salud, y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional.
  - B: El trabajador deberá velar, según sus posibilidades, por su seguridad y salud.
  - C: El trabajador deberá velar prioritariamente, por la seguridad y la salud de aquellas personas a las que pueda afectar su actividad profesional.
  - D: El trabajador deberá velar por la seguridad de sus compañeros que desarrollen su actividad próximos a su puesto de trabajo.

- 58** Si en un estudio de contacto de tuberculosis un trabajador tiene una prueba de tuberculina previa al inicio del estudio negativa, ¿qué actuación estaría indicada realizar en dicho trabajador?:
- A: Realizar prueba de Tuberculina y si es negativa, repetirla a las 8-12 semanas, y si ésta continúa siendo negativa se iniciaría tratamiento de Infección Tuberculosa Latente.
  - B: Realizar prueba de Tuberculina y si es negativa, repetirla a las 8-12 semanas, y si ésta continúa siendo negativa se finalizaría el estudio.
  - C: Realizar prueba de Tuberculina y si es positiva, realizar quimioprofilaxis primaria frente a tuberculosis.
  - D: Realizar prueba de Tuberculina y si es positiva, procedería siempre realizar tratamiento de Infección Tuberculosa Latente.
- 59** El objetivo de PRIMA-EF (Psychosocial Risk Management-Excellence Framework) es proporcionar un marco de actuación para la promoción de políticas y prácticas de gestión del riesgo psicosocial en la Unión Europea. Las etapas del modelo son:
- A: Evaluación del riesgo, revisión de las prácticas ya existentes, desarrollo de un plan de acción, implementación de un plan de acción, evaluación del plan de acción, aprendizaje organizacional, y resultados del proceso de gestión de riesgos.
  - B: Desarrollo de un plan de acción, evaluación del riesgo, revisión de las prácticas ya existentes, implementación de un plan de acción, evaluación del plan de acción, aprendizaje organizacional, y resultados del proceso de gestión de riesgos.
  - C: Resultados del proceso de gestión de riesgos, evaluación del riesgo, revisión de las prácticas ya existentes, desarrollo de un plan de acción, implementación de un plan de acción, evaluación del plan de acción y aprendizaje organizacional.
  - D: Aprendizaje organizacional, desarrollo de un plan de acción, evaluación del riesgo, revisión de las prácticas ya existentes, implementación de un plan de acción, evaluación del plan de acción, y resultados del proceso de gestión de riesgos.
- 60** Según el Real Decreto 487/1997 Manejo manual de cargas y la guía técnica de aplicación, si se quiere proteger a la mayoría de la población, incluidas mujeres, trabajadores jóvenes o mayores no se deberían manejar cargas superiores a:
- A: 3 kg.
  - B: 10 kg.
  - C: 15 kg.
  - D: 25 kg.
- 61** En relación al estrés laboral es FALSO que:
- A: Puede producir trastornos de pánico y de ansiedad generalizada.
  - B: Puede producir trastornos no orgánicos del sueño.
  - C: Puede producir trastornos somatomorfos.
  - D: El porcentaje de morbilidad oculta en Salud Mental en el ámbito laboral se estima sobre el 10%.
- 62** ¿Con qué frecuencia está establecido en la Comunidad Autónoma de Aragón que se reúna la Comisión Autonómica de Prevención de Riesgos Laborales?:
- A: Bimensualmente.
  - B: Bimestralmente.
  - C: Trimestralmente.
  - D: Semestralmente.

- 63** En relación al sistema de información PANOTRATSS, señale la respuesta FALSA:
- A: El contenido del fichero está declarado en la Orden TIN 1448/2010, de 2 de junio.
  - B: Son patologías que adquiere el trabajador estando en su trabajo no siendo necesario probar que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo.
  - C: No considera las patologías que puedan contemplarse en el cuadro de enfermedades profesionales y cumplan los criterios definidos en el Real Decreto 1299/2006.
  - D: Contendrá las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente.
- 64** Los métodos de valoración de carga física mediante la medición de parámetros fisiológicos se basan en:
- A: Frecuencia respiratoria y consumo de oxígeno.
  - B: Frecuencia cardíaca y consumo de oxígeno.
  - C: Gasto cardíaco.
  - D: Edad.
- 65** De las siguientes manifestaciones clínicas. ¿Cuál es más probable que esté producida por gomas?
- A: Fotodermatosis.
  - B: Cloracné.
  - C: Pseudoesclerodermiforme.
  - D: Urticaria de contacto.
- 66** Con respecto al síndrome del túnel del carpo señale la respuesta FALSA:
- A: La edad más frecuente de aparición es entre los 40 y 60 años.
  - B: Es más frecuente en las mujeres que en los hombres.
  - C: El 60% de los casos son bilaterales.
  - D: La prueba complementaria más importante para el diagnóstico es la RMN de la muñeca.
- 67** Son medidas de prevención en la exposición laboral a cromo, todas EXCEPTO:
- A: Delimitar las zonas de riesgo mediante señalización de seguridad.
  - B: Limitar el número de trabajadores expuestos.
  - C: Diseñar los procesos de trabajo y medidas técnicas que minimice o evite la exposición a cromo.
  - D: Métodos de medición adecuados que permitan la detección tardía de exposiciones anormales (imprevistos accidentes).
- 68** Señale la respuesta INCORRECTA sobre las condiciones necesarias para realizar la Valoración del Daño Corporal:
- A: El paciente debe ser diagnosticado previamente por terceros y después presentado para su evaluación.
  - B: La valoración se realiza cuando existe la máxima mejoría clínica de la enfermedad.
  - C: La deficiencia asociada a la limitación puede sobrepasar el 100% del total de la persona.
  - D: En enfermedades que cursan en forma de brotes, la valoración se realiza en los períodos intercríticos.
- 69** El término Karoshi hace referencia a:
- A: Muerte por exceso de trabajo.
  - B: Intoxicación medioambiental por plaguicidas organofosforados.
  - C: Test de demanda-control en ambiente laboral.
  - D: Sistema de alarma ante riesgo químico.

- 70** Se ha asociado la aparición de cáncer de fosas nasales con la exposición ocupacional a los siguientes agentes EXCEPTO a:
- A: Níquel.
  - B: Asbesto.
  - C: Polvo de maderas duras.
  - D: Cromo.
- 71** Señale la respuesta correcta sobre las reclamaciones por los daños sufridos en un accidente laboral:
- A: Es un derecho establecido en el Real Decreto Legislativo 8/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
  - B: El pago de la indemnización corresponde en su totalidad al empresario.
  - C: La percepción de una indemnización por lesiones permanentes no invalidantes es siempre incompatible con la prestación de incapacidad permanente.
  - D: El sistema de baremación establece una indemnización que se percibe anualmente hasta el cese de actividad en la empresa.
- 72** Tomando como referencia la clasificación de agentes biológicos que recoge el Real Decreto 664/1997, es cierto que:
- A: El SARS-Cov-2 es de tipo 2.
  - B: Virus de la hepatitis B es de tipo 3.
  - C: Virus Zika es de tipo 3.
  - D: Virus de la gripe B es de tipo 1.
- 73** Según las definiciones establecidas en artículo 2 del Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos, ¿cómo se consideran las interferencias generadas por el mero hecho de acceder un trabajador con marcapasos cardíaco a una sala de resonancia magnética (campo magnético estático)?
- A: Efecto indirecto.
  - B: Efecto biofísico directo.
  - C: Efecto térmico.
  - D: Efecto no térmico.
- 74** Las excretas de los pacientes tratados con medicamentos citostáticos pueden ser potencialmente tóxicas. Conforme al protocolo de vigilancia sanitaria específica de agentes citostáticos, por regla general, deberán considerarse peligrosas hasta:
- A: 12 horas después de finalizar el tratamiento.
  - B: 24 horas después de finalizar el tratamiento.
  - C: 36 horas después de finalizar el tratamiento.
  - D: 48 horas después de finalizar el tratamiento.

- 75** Según el RDL 8/2015, Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ¿qué se entiende por incapacidad permanente parcial para la ocupación habitual?:
- A: Aquella que sin alcanzar el grado de total, ocasione al trabajador una disminución no inferior al 33 por ciento en su rendimiento normal para dicha profesión, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma.
  - B: Aquella que sin alcanzar el grado de total, ocasione al trabajador una disminución inferior al 33 por ciento en su rendimiento normal para dicha profesión, impidiendo la realización de las tareas fundamentales de la misma.
  - C: Aquella que sin alcanzar el grado de total, ocasione al trabajador una disminución no inferior al 33 por ciento en su rendimiento normal para dicha profesión, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma.
  - D: Aquella que sin alcanzar el grado de total, le impide al trabajador la realización de al menos un 33 por ciento de las tareas fundamentales de su profesión.
- 76** Según la Clasificación de los Tipos de Violencia en el Trabajo de la California Division of Occupational Health and Safety (Cal/OSHA), ¿qué tipo de violencia se correspondería con la dirigida a un sanitario por un paciente que asiste?:
- A: Violencia Tipo I.
  - B: Violencia Tipo II.
  - C: Violencia Tipo III.
  - D: Violencia Tipo IV.
- 77** Sobre la vibración, ¿cuál es la opción correcta?:
- A: La dirección de la vibración se produce en dos direcciones lineales y tres rotacionales.
  - B: Los ejes de la dirección son longitudinal, lateral y vertical.
  - C: La magnitud de una vibración se expresa en ciclos por segundo, siendo la unidad el Hertzio.
  - D: Ninguna es cierta.
- 78** Según el Real Decreto 664/1997, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, ¿en qué grupo se clasifica el agente biológico que puede causar una enfermedad en el hombre y puede suponer un peligro para los trabajadores, siendo poco probable que se propague a la colectividad y existiendo generalmente profilaxis o tratamiento eficaz?:
- A: En el Grupo 1.
  - B: En el Grupo 2.
  - C: En el Grupo 3.
  - D: En el Grupo 4.
- 79** ¿Cuál de las siguientes aseveraciones NO es cierta en relación a la vacunación frente a varicela?:
- A: Se recomienda la vacunación en todo trabajador sanitario susceptible.
  - B: Se administrarán dos dosis de vacuna frente a la varicela con un intervalo de al menos 4 semanas, sin necesidad de marcadores posvacunales.
  - C: En caso de producirse un exantema posvacunación deberá separarse al profesional sanitario de los servicios donde existan pacientes de riesgo, por un periodo entre 5-7 días.
  - D: Se administrarán dos dosis aun en el caso de haber recibido una dosis con anterioridad.

- 80** El signo más característico de la intoxicación por mercurio y afectación del sistema nervioso central es:
- A: Temblor.
  - B: Trastornos del carácter, de la personalidad, del rendimiento psicomotor.
  - C: Anomalías electroencefalograma.
  - D: Trastornos de la memoria.
- 81** De acuerdo con las recomendaciones del Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de medicamentos peligrosos, son medidas de prevención para su preparación y administración en el caso de metotrexato comprimidos deberá utilizar:
- A: Guante doble.
  - B: Guante simple.
  - C: Bata.
  - D: Mascarilla.
- 82** De entre los productos que pueden producir una enfermedad profesional están los metalés. ¿Cuál de los siguientes elementos NO es un metal?:
- A: Arsénico.
  - B: Fósforo.
  - C: Vanadio.
  - D: Antimonio.
- 83** ¿Cuál de los siguientes disolventes tiene acción mielotóxica?
- A: Xileno.
  - B: Benceno.
  - C: Hexano.
  - D: Acetona.
- 84** Señale la respuesta correcta en el examen de salud de personas que realizan movimientos repetidos con las extremidades superiores:
- A: Una prueba de Phalen positiva indica neuropatía del nervio cubital.
  - B: El signo de Froment indica patología del radial.
  - C: El signo de Flick indica patología del mediano.
  - D: El signo de Tinell aparece si hay alteración sensitiva del nervio cubital.
- 85** En relación a los estudios epidemiológicos, es correcto:
- A: En los experimentales, la asignación de la exposición a cada uno de los individuos o grupos la realiza el propio investigador
  - B: Los estudios cuasi-experimentales siempre tienen grupo control.
  - C: Entre las fortalezas de los estudios experimentales, destaca la posibilidad de generalizar los resultados a otras poblaciones.
  - D: La principal limitación de todos los estudios observacionales para realizar inferencias causales proviene del sesgo de agregación.

- 86** Sobre el protocolo de vigilancia específica de los trabajadores expuestos a plomo inorgánico, señale la respuesta FALSA:
- A: El examen inicial incluye historia laboral y clínica, exploración y control biológico.
  - B: Los trabajadores que sufran trastornos neuropsiquiátricos y patología derivada del alcohol, serán declarados no aptos.
  - C: El examen periódico se realizará con periodicidad mínima anual, y aumentará con el grado de exposición.
  - D: El test biológico de elección es la determinación de plomo en orina (plumburia).
- 87** A la hora de valorar la pérdida global de audición, ¿qué respuesta es INCORRECTA?:
- A: Se recurren a las normas de la Asociación Americana de Oftalmología y Otorrinolaringología.
  - B: La pérdida global de audición se evalúa sólo en función de la suma de las pérdidas de las frecuencias de 500, 1500 y 4000.
  - C: Para conseguir la pérdida binaural tenemos que aplicar una fórmula que nos dé el porcentaje de la pérdida auditiva global.
  - D: Para determinar la valoración global de la pérdida de audición hay que atenerse a las tablas JAMA actuales en las que se ha añadido la pérdida de frecuencia 3000 y por tanto ha variado el factor porcentual mono y binaural.
- 88** En relación con la gestación y el riesgo de exposición al VIH en el puesto de trabajo, señale la respuesta INCORRECTA:
- A: La condición de embarazo de una trabajadora expuesta no presupone la existencia de riesgo.
  - B: La Profilaxis Postexposición (PPE) frente al VIH está indicada en cualquier momento durante el embarazo siempre que haya existido exposición significativa.
  - C: La monitorización de los posibles efectos secundarios e interacciones se debe realizar, al menos, cada dos semanas, hasta completar las 4 semanas de PPE.
  - D: La infección transplacentaria se produce con más frecuencia en el 1 y 2 trimestre del embarazo.
- 89** El signo de Finkelstein lo encontramos en:
- A: Epicondilitis.
  - B: Síndrome del túnel carpiano.
  - C: Síndrome del pronador redondo.
  - D: Tenosinovitis estenosante de De Quervain.
- 90** Sobre las resinas epoxi es FALSO:
- A: Tienen efecto sensibilizante pero no irritante.
  - B: Pueden producir reacciones urticariformes.
  - C: Pueden producir dermatitis aerotransportadas.
  - D: Son capaces de penetrar los guantes de plástico y de goma.
- 91** Según el Real Decreto 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención ¿qué función sanitaria NO es propia de los Servicios de Prevención?:
- A: Colaborar con el Sistema Nacional de Salud para el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de enfermedades relacionadas con el trabajo.
  - B: Colaborar en las campañas sanitarias y epidemiológicas organizadas por las Administraciones públicas competentes en materia sanitaria.
  - C: Gestión de la Incapacidad Laboral del Sistema de Seguridad Social.
  - D: Proveer el Sistema de Información Sanitaria en Salud Laboral.

- 92** La expresión control biológico se encuentra expresamente recogida en el ordenamiento jurídico en las siguientes disposiciones, EXCEPTO en:
- A: RD 39/1997.
  - B: RD 487/1997.
  - C: RD 374/2001.
  - D: RD 665/1997.
- 93** En relación a la exposición profesional a metales cancerígenos que es correcto:
- A: La enfermedad de Bowen es una lesión precancerosa relacionada con la exposición a arsénico.
  - B: El personal sanitario tiene más riesgo de desarrollar leucemias por la exposición profesional a berilio.
  - C: En la exposición ocupacional a producción de materiales de asilamientos como denominador es común es la exposición a harina.
  - D: La exposición a insecticidas arseniales produce tumores malignos de tiroides.
- 94** ¿Cuál es la definición de Valor Límite Ambiental para Exposiciones de Corta Duración según el Real Decreto 374/2001?:
- A: El valor límite de la concentración media, medida o calculada para 8 horas de jornada laboral.
  - B: El valor límite de la concentración media de aquellos agentes químicos con un periodo de referencia inferior, recalculada para un periodo de 15 minutos.
  - C: El valor límite de la concentración media, medida o calculada para cualquier periodo de 15 minutos a lo largo de la jornada laboral, excepto para aquellos agentes químicos para los que se especifique un periodo de referencia inferior.
  - D: El valor límite de la concentración media, medida o calculada para 8 horas de jornada laboral y/o 40 horas semanales.
- 95** En caso incapacidad temporal por accidente de trabajo o enfermedad profesional, indique la opción correcta:
- A: El subsidio se abonará desde el día siguiente al de la baja en el trabajo, estando a cargo del empresario el salario íntegro correspondiente al día de la baja.
  - B: El subsidio se abonará a partir del cuarto día de baja en el trabajo.
  - C: El subsidio se abonará siempre a cargo de empresarios, desde el 1º día hasta el alta.
  - D: El subsidio se abonará hasta el fin del contrato del trabajador.
- 96** En los tipos de sorderas, ¿qué respuesta es correcta?:
- A: En las sorderas de conducción está afectado oído externo y oído interno.
  - B: En las sorderas neurosensoriales está afectado el oído interno.
  - C: En las sorderas mixtas está solo afectado el oído externo.
  - D: En las sorderas de transmisión la curva de la vía aérea no está descendida.
- 97** En relación con los criterios de aplicación del apartado específico para el plexo braquial en las neuropatías por presión señale la respuesta INCORRECTA:
- A: Fenómeno de Raynaud en manos.
  - B: Parestesias, dolor o insensibilidad en la zona cubital de antebrazo y mano.
  - C: Torpeza para movimientos finos de los dedos durante el trabajo.
  - D: Pérdida de fuerza en interóseos.

- 98** Según el protocolo de actuación ante la violencia externa en el lugar de trabajo del personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, señalar la opción INCORRECTA en relación con la violencia externa en el lugar del trabajo:
- A: Tiene lugar cuando una persona es agredida, amenazada, humillada o lesionada por otra en el ejercicio de su actividad profesional.
  - B: Tiene lugar cuando una persona es agredida, amenazada, humillada o lesionada por otra como consecuencia directa de la actividad profesional.
  - C: Tiene lugar entre los trabajadores, incluidos directivos y supervisores.
  - D: No es un problema individual ni aislado, es un problema estructural y estratégico
- 99** Sobre los objetivos en un proyecto de investigación, es FALSO:
- A: Deben ser claros, medibles y dar respuesta a la hipótesis planteada.
  - B: Se deben establecer objetivos futuros que puedan ser abordados en un proyecto posterior.
  - C: Se debe exponer un objetivo principal y varios secundarios.
  - D: Los objetivos deben correlacionarse con las variables de medida utilizadas.
- 100** Un trabajador acude a su consulta tras sufrir una contusión ocular, señale la respuesta INCORRECTA:
- A: Se debe alertar al trabajador sobre la presencia de hiposfagma (hemorragia subconjuntival) ya que es un signo de mal pronóstico.
  - B: El enfisema subconjuntival puede provocarse por rotura del seno etmoidal o del suelo de la órbita.
  - C: Puede aparecer aumento de la presión intraocular.
  - D: Un traumatismo contuso puede provocar una conmoción retiniana en el lado contrario al del impacto directo.
- 101** Indique cuál de las siguientes condiciones NO se recoge en el Real Decreto 486/1997, sobre disposiciones mínimas de los lugares de trabajo:
- A: Las escaleras tendrán una anchura mínima de 1 metro, excepto en las de servicio, que será de 55 centímetros.
  - B: Los peldaños de una escalera tendrán las mismas dimensiones.
  - C: Se prohíben las escaleras de caracol.
  - D: Los escalones de las escaleras que no sean de servicio tendrán una huella comprendida entre 23 y 36 centímetros, y una contrahuella entre 13 y 20 centímetros.
- 102** Según la NTP - 606 "Exposición laboral a gases anestésicos", publicada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿Qué efecto NO genera la exposición aguda a Óxido Nitroso en un quirófano?
- A: Anestesia clínica por exposición a concentraciones mayores al 50%.
  - B: Congelación grave por contacto de líquido con piel, mucosas y ojos.
  - C: Efectos dañinos por contacto de la piel con gas a temperatura ambiente.
  - D: Excitación, vértigo, somnolencia e incoordinación por inhalación.
- 103** ¿Cuándo está obligado el empresario, por el Real Decreto 664/1997, a disponer de una lista de trabajadores expuestos a agentes biológicos y a un registro de las correspondientes exposiciones, accidentes e incidentes?:
- A: Siempre que los trabajadores estén expuestos a agentes biológicos.
  - B: Cuando los trabajadores están expuestos a agentes biológicos de los grupos 2, 3 y 4 del Real Decreto 664/1997.
  - C: Sólo cuando los trabajadores están expuestos a agentes biológicos de los grupos 3 y 4 del Real Decreto 664/1997.
  - D: Sólo cuando los trabajadores están expuestos a agentes biológicos del grupo 4 del Real Decreto 664/1997.

- 104** ¿En cuál de estos diseños de estudios epidemiológicos se mide la incidencia?
- A: Casos y controles.
  - B: Cohortes.
  - C: Series de casos.
  - D: Estudio transversal.
- 105** Tras una baja por incapacidad temporal (IT), transcurridos 545 días naturales desde la baja médica:
- A: Se extinguirá el derecho al subsidio por IT.
  - B: En ningún caso se extinguirá el derecho al subsidio si no ha recibido un alta médica.
  - C: Se examinará necesariamente, en el plazo máximo de seis meses, el estado del incapacitado a efectos de su calificación, en el grado de incapacidad permanente que corresponda.
  - D: No es posible una baja por incapacidad temporal durante 545 días, el máximo son 365 días.
- 106** Para la detección de adicciones en el transcurso de la Vigilancia de la Salud, es FALSO que podamos utilizar:
- A: Test MultiCAGE Cad-4, como test de control de impulsos y adicciones.
  - B: Test AUDIT para el consumo de tabaco.
  - C: Test ASSIST dependencia de alcohol, tabaco, cocaína y cannabis entre otros.
  - D: El test de Fagerström para evaluar el grado de dependencia física del tabaquismo.
- 107** Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo recogidos en su artículo:
- A: 23
  - B: 15
  - C: 14
  - D: 24
- 108** En un accidente de riesgo biológico de transmisión sanguínea, ¿cuál de estos fluidos orgánicos se considera potencialmente infectante?:
- A: Sólo sangre.
  - B: Cualquier fluido biológico tenga o no sangre visible.
  - C: Cualquier fluido biológico que proceda de una persona VIH, VHC o VHB positiva.
  - D: Sangre o cualquier fluido biológico con sangre visible.
- 109** ¿Cuál de los siguientes cuestionarios es un instrumento reconocido de apoyo al diagnóstico de la sensibilidad química múltiple?:
- A: Quick Environmental Exposure and Sensitive Inventory – QEESI (Inventario rápido para la exposición ambiental y sensibilidad).
  - B: Cuestionario de síntomas por exposición a tóxicos químicos (QSET).
  - C: Cuestionario autoadministrado de registro de síntomas alérgicos.
  - D: Cuestionario general de síntomas idiopáticos de la Universidad de California.

**110** ¿Cuál de las siguientes aseveraciones NO es cierta en relación a la vacunación frente a rubeola?:

- A: Se consideran inmunes a la rubeola los trabajadores sanitarios con documentación escrita de haber recibido una dosis de vacuna frente a la rubeola o vacuna triple vírica.
- B: No se precisa ninguna restricción laboral tras recibir la vacuna.
- C: Se precisa la realización de marcadores postvacunales.
- D: Las mujeres en edad fértil deben evitar el embarazo en el mes siguiente a la recepción de la vacuna triple vírica.