

**GOBIERNO DE ARAGÓN  
DEPARTAMENTO DE SANIDAD  
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD**

---

**PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE  
PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN PLAZAS DEL SERVICIO ARAGONÉS  
DE SALUD DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN**

Resoluciones de 16 de octubre de 2020 (BOA nº 222 de 9/11/2020)

Categoría:

**PEDIATRÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA**

**ADVERTENCIAS:**

- No abra este cuestionario hasta que se le indique.
- Este cuestionario consta de **110 preguntas** de las cuales las 10 últimas son de reserva. Las preguntas deben ser contestadas en la hoja de examen entre los números 1 y 110 (compruebe que coinciden los números señalados en la hoja con los del cuadernillo).
- **El tiempo de realización del ejercicio es de 120 minutos.**
- Todas las preguntas tienen el mismo valor: las correctas puntuarán positivamente, las no contestadas no puntuarán, y las incorrectas restarán un tercio del valor de la respuesta correcta.
- Sólo existe una respuesta correcta.
- El cuestionario sirve como borrador, pero no se podrá utilizar móvil, calculadora, reloj o ningún otro medio electrónico. **El móvil deberá, a su vez, estar apagado.**
- **Lea atentamente las instrucciones al dorso de la hoja de examen.**



**1) Sobre el ejercicio de derechos relativos a la protección de datos de carácter personal, señale la afirmación INCORRECTA:**

- A) Por medio de ley se puede establecer un régimen especial en el ejercicio de los derechos.
- B) No existe, en ningún caso, la posibilidad de establecerse un régimen especial en el ejercicio de los derechos.
- C) Los titulares de la patria potestad podrán ejercer determinados derechos de los menores de 14 años, en su nombre y representación.
- D) El responsable del tratamiento estará obligado a informar al afectado sobre los medios a su disposición para ejercer los derechos que le correspondan.

**2) La probabilidad que tiene una prueba diagnóstica de dar un resultado negativo entre los sujetos que NO tienen una determinada enfermedad (sujetos sanos) se denomina:**

- A) Sensibilidad.
- B) Valor predictivo positivo.
- C) Especificidad.
- D) Valor predictivo negativo.

**3) En las Cortes de Aragón, NO existe una Comisión Permanente sobre:**

- A) Sanidad.
- B) Ciudadanía y Derechos sociales.
- C) Medicamentos y vacunación.
- D) Educación, cultura y deporte.

**4) NO es un recurso administrativo típico:**

- A) Casación.
- B) Alzada.
- C) Reposición.
- D) Extraordinario de revisión.

**5) En un estudio de cohortes, la medida epidemiológica que informa sobre el exceso absoluto de riesgo de enfermar entre los expuestos se denomina:**

- A) Riesgo atribuible.
- B) Riesgo relativo.
- C) Índice de intervención.
- D) Fracción etiológica.

6) La prestación sanitaria consistente en la utilización de productos sanitarios, implantables o no, cuya finalidad es sustituir total o parcialmente una estructura corporal, o bien de modificar, corregir o facilitar su función, es...

- A) Una prestación farmacéutica.
- B) Una prestación de urgencia.
- C) Una prestación de asistencia socio-sanitaria.
- D) Una prestación ortoprotésica.

7) En relación con los programas de intercambio terapéutico entre dos medicamentos señale la respuesta correcta:

- A) El intercambio terapéutico sólo se puede realizar entre distintas marcas de un mismo principio activo.
- B) El intercambio terapéutico se puede realizar entre medicamentos de los que se espera igual actividad o efecto terapéutico y seguridad cuando se administran a dosis equipotentes.
- C) El intercambio terapéutico sólo se puede realizar entre medicamentos bioequivalentes.
- D) El intercambio terapéutico sólo se puede realizar entre distintas dosis de un mismo principio activo.

8) Señale la respuesta correcta en relación con el Servicio Aragonés de Salud:

- A) Es una entidad pública empresarial.
- B) Es un organismo autónomo de carácter administrativo.
- C) Es una entidad de derecho público.
- D) Es una fundación pública sanitaria.

9) Señale la respuesta correcta en relación con la denominada Medicina Basada en la Evidencia (MBE):

- A) En la toma de decisiones clínicas basadas en la evidencia no se incluye una revisión crítica y exhaustiva de la investigación científica.
- B) La MBE es una disciplina obsoleta y actualmente en desuso.
- C) La MBE se aplica en la mejora de la práctica clínica y en la mejora de la gestión de los servicios sanitarios.
- D) La MBE no contribuye a la formación de los profesionales sanitarios.

**10) Todas las siguientes son medidas adoptadas para reducir el riesgo en la práctica asistencial dentro de las organizaciones sanitarias EXCEPTO una:**

- A) Pueden ser proactivas como el AMFE (análisis de fallos y efectos) o reactivas como el análisis de causas profundas.
- B) El análisis de fallos y efectos es una medida reactiva realizada tras detectar un incidente.
- C) Son acciones encaminadas a reducir, gestionar o controlar futuros daños asociados a un incidente o la probabilidad que se produzcan.
- D) El análisis probabilístico del riesgo es también una acción proactiva que puede utilizarse.

**11) Respecto al ensayo clínico aleatorio señale la afirmación FALSA:**

- A) Es el estudio experimental más frecuente.
- B) La primera fase es la selección de pacientes tras definir los criterios de selección.
- C) Los participantes deben dar su consentimiento salvo decisión del equipo investigador.
- D) La asignación aleatoria de pacientes a cada grupo es condición imprescindible.

**12) ¿Cuál de los siguientes soplos cardiacos sugiere un soplo fisiológico?**

- A) Soplo sistólico, de intensidad media y más audible en foco pulmonar.
- B) Soplo diastólico que se ausculta después de S2 (segundo ruido) de intensidad baja.
- C) Soplo sistólico eyectivo de intensidad moderada-fuerte.
- D) Soplo continuo que ocupa toda la sístole y parte de la diástole.

**13) La parte exploratoria de la entrevista semiestructurada NO comprende:**

- A) Establecer planes de contingencia o toma de precauciones.
- B) Delimitar la demanda.
- C) Explorar al paciente.
- D) Comprobar e integrar la información.

**14) Señale el tratamiento correcto de la vía aérea de un niño de 6 años atropellado por un automóvil, que se encuentra en estado de agitación y responde a la estimulación verbal con movimientos de las 4 extremidades:**

- A) Intubación orotraqueal directa.
- B) Inserción de una cánula nasal y administración de Oxígeno a 12 l/m.
- C) Intubación nasotraqueal.
- D) Intubación endotraqueal en secuencia rápida con administración de sedantes y compuestos paralizantes después de oxigenación previa.

**15) ¿Cuál de los siguientes fármacos presenta un riesgo alto para el recién nacido durante la lactancia materna?**

- A) Metamizol.
- B) Propiltiouracilo.
- C) Doxicilina.
- D) Metimazol.

**16) De los siguientes corticoides, ¿cuál de ellos está indicado en el tratamiento de la esofagitis eosinofílica?**

- A) Mometasona furoato.
- B) Fluticasona furoato.
- C) Betametasona viscosa (consucralosa).
- D) Propionato de fluticasona.

**17) ¿Cuál de los siguientes es un factor compensador asociado al cuidador en relación con el desarrollo integral del menor?**

- A) Consumo de tóxicos.
- B) Enfermedad crónica.
- C) Antecedentes de maltrato, identificados, procesados y madurados por la víctima.
- D) Padres adolescentes.

**18) En el modelo ICP ("Infancy, Childhood, Puberty") de Karlberg, NO es característico del periodo prepuberal o de la segunda infancia:**

- A) La deceleración de la velocidad de crecimiento.
- B) Que la talla en este periodo es similar en ambos sexos.
- C) Se producen variaciones estacionales de la velocidad de crecimiento, siendo menor el crecimiento en los meses calurosos.
- D) El principal determinante del crecimiento en este periodo es el genotipo, y su principal regulador junto con las hormonas tiroideas es el eje de la hormona de crecimiento.

**19) En el Programa de Salud Mental Infanto-Juvenil en Aragón son criterios de derivación todos los siguientes EXCEPTO:**

- A) Existencia de varias señales de alerta.
- B) Dificultad del pediatra de atención primaria para asumir el caso.
- C) Larga duración del problema.
- D) Solicitud de UNO de los progenitores.

**20) Señale cuál de los siguientes es un criterio mayor para el cálculo del índice predictivo de asma modificado:**

- A) Diagnóstico médico de eccema atópico.
- B) Eosinofilia en sangre periférica superior al 4%
- C) Sibilancias no relacionadas con los catarros.
- D) Alergia a leche, huevo o frutos secos.

**21) Sobre el Síndrome de Di George, indique la respuesta FALSA:**

- A) Se produce por una anomalía cromosómica por delección 22q11.2
- B) El fenotipo clínico es similar en todos los casos.
- C) Pueden presentar hipocalcemia neonatal que suele remitir con la edad, aunque puede reaparecer tras procesos infecciosos.
- D) Las malformaciones cardíacas están presentes en más del 50 % de los casos.

**22) Sobre la necrosis grasa subcutánea del recién nacido, indique la respuesta FALSA:**

- A) Puede calcificarse.
- B) Suele estar presente desde el nacimiento.
- C) Puede presentar diferentes tonalidades de color.
- D) No presenta dolor a la palpación.

23) En una tabla para evaluar la aplicación de un test en donde VP son los verdaderos positivos, VN verdaderos negativos, FP falsos positivos y FN falsos negativos. Para calcular el Valor predictivo positivo, señale la opción correcta:

- A)  $VP/(VP+FN)$
- B)  $VN/(VN+FP)$
- C)  $VP/(VP+FP)$
- D)  $VN/(VN+FN)$

24) ¿Cuál de los siguientes signos y síntomas NO es habitual observar en una pericarditis?

- A) Dolor torácico.
- B) El dolor empeora con el decúbito y la inspiración profunda y mejora sentado o inclinado hacia delante.
- C) A la auscultación puede apreciarse roce y tonos cardiacos apagados si hay derrame.
- D) El electrocardiograma muestra los cambios típicos de descenso generalizado del segmento ST, que evolucionan secuencialmente en semanas con normalización del ST y posterior negativización de la onda T.

25) ¿Cuál de las siguientes recomendaciones del Protocolo de seguimiento para el recién nacido menor de 1500 g o menor de 32 semanas de gestación (SENeo) es FALSA?

- A) Deben efectuarse mediciones seriadas de peso, longitud-talla y PC y trasladarlas a las gráficas de crecimiento según edad corregida hasta los 2 años.
- B) Para la evaluación del crecimiento tras el alta se recomienda el uso de las curvas de Fenton revisadas hasta las 44 semanas de edad corregida.
- C) Se recomienda que los niños de bajo peso para la edad gestacional que a los 2-3 años tengan una talla por debajo de 2 desviaciones estándar en las gráficas de la OMS, se remitan al endocrinólogo para completar el estudio y valorar el tratamiento con hormona de crecimiento.
- D) El objetivo deseable es que en los tres primeros meses tras el alta se alcance una ganancia ponderal de 15-20 g/día.

**26) Según el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en sus recomendaciones de vacunación frente a gripe en la temporada 2020-2021, ¿en qué caso estaría indicada esta vacunación?**

- A) Niño de 4 meses con antecedentes de prematuridad menor de 32 semanas de gestación.
- B) Enfermedad celiaca.
- C) Polinosis.
- D) Déficit de inmunoglobulina A (IgA).

**27) Niña de 12 meses con 39° de temperatura axilar y cuadro convulsivo. ¿Qué medida sería la primera a adoptar?**

- A) Metamizol IV.
- B) Diazepam rectal.
- C) Midazolam vía nasal.
- D) Control de funciones vitales y mantener vías respiratorias.

**28) Respecto a los trastornos de cierre del tubo neural, señale la respuesta FALSA:**

- A) El mielomeningocele es el tipo más grave y también el más común de espina bífida.
- B) La espina bífida oculta es la forma más leve.
- C) La iniencefalia es un tipo raro, pero de buen pronóstico, de defecto de cierre del tubo neural.
- D) En algunos casos, el único signo externo de un defecto del tubo neural cerrado puede ser un hoyuelo o mechón de pelo en la columna.

**29) Los trastornos gastrointestinales funcionales (según criterios Roma IV) son todos los siguientes EXCEPTO:**

- A) Diarrea crónica.
- B) Aerofagia.
- C) Regurgitación y rumiación del lactante.
- D) Síndrome del intestino irritable.

**30) ¿Cuál de las siguientes acciones NO forma parte de las actividades de consejo, promoción y prevención de la salud?**

- A) Informar del empleo de dispositivos de seguridad en el coche.
- B) Promover la lactancia materna.
- C) Programar prueba de tuberculina anualmente en infectados por VIH.
- D) Recomendar el decúbito supino para dormir y prono para jugar en la visita antes del primer mes.

31) ¿Cuál de las siguientes NO es una cefalosporina de segunda generación?

- A) Cefalexina.
- B) Cefaclor.
- C) Cefonicida.
- D) Cefoxitina.

32) ¿Cuál de los siguientes pescados NO presenta un bajo contenido de mercurio?

- A) Fogonero.
- B) Anchoa.
- C) Pulpo.
- D) Cazón.

33) Acerca de la Promoción para la Salud, señale la respuesta verdadera:

- A) La declaración de Yakarta identifica las tres estrategias básicas para la promoción de salud.
- B) La declaración de Yakarta identifica cinco prioridades de cara a la promoción de salud del siglo XXI.
- C) La carta de Ottawa identifica cinco prioridades de cara a la promoción de salud del siglo XXI.
- D) Todas son falsas.

34) Son motivos de derivación urgente a oftalmología por sospecha de retinoblastoma todos los siguientes EXCEPTO:

- A) Leucocoria.
- B) Estrabismo nuevo.
- C) Alteración visual más antecedentes familiares de retinoblastoma.
- D) Fotofobia.

35) Señale la respuesta FALSA en relación al Querion de Celso:

- A) Es la respuesta inflamatoria frente a dermatofito localizado en cuero cabelludo.
- B) La griseofulvina oral es más efectiva en el caso de que el dermatofito sea *M. Canis*.
- C) Es rara pasada la pubertad.
- D) Suele determinar una zona de alopecia cicatricial definitiva.

**36) Respecto a la alergia alimentaria en la edad pediátrica, señale la respuesta FALSA:**

- A) En la alergia alimentaria IgE mediada en niños menores de 2 años los alimentos implicados con mayor frecuencia son leche y huevo.
- B) La presencia de pruebas cutáneas (prick) positivas indica una alergia alimentaria a ese determinado alimento.
- C) En el caso de la alergia a proteínas de la leche de vaca el 75% alcanza la tolerancia antes de los dos años y el 90% antes de los seis años.
- D) Las reacciones inmunológicas IgE mediadas se caracterizan por un comienzo rápido de los síntomas, habitualmente en las 2 primeras horas tras la exposición del alimento desencadenante.

**37) ¿Cuál de los siguientes tratamientos NO está incluido dentro de las prestaciones del Programa de Atención Bucodental Infantil y Juvenil?**

- A) Tratamientos de ortodoncia en su fase terapéutica.
- B) Tratamientos por malformación o traumatismos en dientes permanentes.
- C) Tratamientos protésicos por caries de piezas permanentes en niños con enfermedades sistémicas que afecten gravemente al estado de salud.
- D) Extracciones de piezas temporales y permanentes.

**38) Respecto al valor predictivo positivo de un test, señale el enunciado FALSO:**

- A) Es la probabilidad de tener la enfermedad si se obtiene un positivo en el test.
- B) El valor predictivo positivo puede estimarse a partir de la proporción de pacientes con un resultado positivo en la prueba que finalmente resultaron estar enfermos.
- C) El valor predictivo positivo de una prueba no depende de la prevalencia de la enfermedad.
- D) Corresponde a los enfermos con pruebas positivas de entre todas las pruebas positivas.

**39) Respecto a la Dosis Diaria Definida (DDD), NO es cierto que:**

- A) La DDD es una unidad técnica de medida que corresponde a la dosis de mantenimiento en la principal indicación para una vía de administración determinada en adultos.
- B) Los valores de la DDD de cada medicamento son establecidos por la Agencia Española del Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y se publican periódicamente.
- C) Es independiente de las variaciones en el precio.
- D) Según la DDD, España es uno de los países europeos que utilizan más antibióticos.

**40) Todos los niños podrían ser incluidos en el programa de niño asmático de Aragón EXCEPTO:**

- A) Un lactante de 20 meses que ha tenido 4 episodios de sibilantes desde septiembre a enero.
- B) Un exprematuro de 29 semanas con un episodio de bronquiolitis que requirió ingreso en UCI.
- C) Un niño de 3 años que desde el inicio del colegio ha tenido 2 episodios de disnea y sibilancias que responden al broncodilatador.
- D) Un niño de 11 años con un episodio de sibilantes con respuesta al broncodilatador y síntomas con el ejercicio físico.

**41) Señale el serotipo del Virus del Papiloma Humano (VPH) que NO se considera de alto riesgo:**

- A) 6
- B) 16
- C) 18
- D) 56

**42) En relación con la encefalopatía mioclónica temprana, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?**

- A) Debuta en periodo neonatal.
- B) Las crisis son mioclonias migratorias.
- C) Suele deberse a enfermedades metabólicas o de causa desconocida.
- D) Evoluciona hacia resolución espontánea hacia el 6º mes de vida.

**43) ¿A qué edad el cociente segmento superior/ segmento inferior es menor a uno?**

- A) 2 años.
- B) 6 años.
- C) 8 años.
- D) 11 años.

**44) Respecto a las manifestaciones clínicas de la alergia alimentaria y su mecanismo inmunológico, señale la asociación correcta:**

- A) IgE no mediada-Síndrome gastrointestinal inmediato.
- B) Mecanismo mixto-Enteropatía por proteínas alimentarias.
- C) IgE no mediada-Enterocolitis inducida por proteínas alimentarias (FPIES).
- D) IgE mediada-Esogagítis eosinofílica.

45) Niño de 2 años. Antecedentes antropometría al nacer: peso 4,1 kg. longitud 54,5 cm. A los 2 años pesa 20 kg. talla 100 cm y su perímetro cefálico 52 cm. Edad ósea alrededor de 5 años. Fenotipo tosco con frente amplia, manos grandes, hipertelorismo, discreto retraso psicomotor. Con estos datos, ¿cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Gigantismo hipofisario.
- B) Síndrome de Mc Cune Albright.
- C) Síndrome de Klinefelter.
- D) Síndrome de Weaver.

46) ¿Qué signos de alarma permiten sospechar que se encuentra ante una potencial alteración del Sistema Nervioso Central, según el test Haizea-Llevant?

- A) No sostén cefálico a la edad de 3 meses.
- B) Persistencia de reacción de Moro a los 4 meses.
- C) No desplazamiento autónomo a los 9 meses.
- D) Ausencia de pinza a los 9 meses.

47) Es obligatorio el uso de un sistema de retención infantil hasta que el niño supere la altura de:

- A) 130 cm.
- B) 135 cm.
- C) 145 cm.
- D) 150 cm.

48) En relación a la esquizofrenia en la edad pediátrica es FALSO:

- A) Los criterios para diagnosticar esquizofrenia son los mismos en niños mayores y adolescentes que en adultos.
- B) La población de hijos y hermanos de pacientes esquizofrénicos se considera una población de alto riesgo genético de presentar la enfermedad.
- C) Son signos y síntomas de detección/derivación: alucinaciones, delirio y conducta desorganizada.
- D) El fármaco de elección en el tratamiento de un primer brote o exacerbación aguda es el haloperidol.

**49) Se consideran indicadores físicos de maltrato infantil todos los siguientes EXCEPTO:**

- A) Quemaduras con forma definida de objetos.
- B) Hematomas en región pretibial.
- C) Hematoma subdural.
- D) Fracturas múltiples en diferente estado de curación.

**50) Niño de 5 años de edad que presenta sensación de picor/quemazón en ambos ojos de varios meses de evolución. En la exploración del ojo derecho se advierte la conjuntiva con un aspecto adoquinado muy específico. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable?**

- A) Conjuntivitis papilar gigante.
- B) Queratoconjuntivitis atópica.
- C) Queratoconjuntivitis vernal.
- D) Conjuntivitis pseudomembranosa.

**51) Una de las siguientes características NO es propia de la hematuria de origen glomerular:**

- A) Color pardo, marrón.
- B) Presencia de coágulos.
- C) Presencia de acantocitos.
- D) Presencia frecuente de cilindros hemáticos.

**52) En el síndrome de Turner es típico encontrar una de las siguientes manifestaciones:**

- A) Vitíligo.
- B) Catarata nuclear.
- C) Aumento del tamaño de las manos y de los pies.
- D) Costillas supernumerarias.

**53) ¿Cuál es la medida de impacto que muestra la asociación entre los factores de riesgo para un estudio de cohortes?**

- A) Riesgo Relativo.
- B) Odds Ratio.
- C) Riesgo atribuible poblacional.
- D) Fracción atribuible del riesgo.

**54) En relación con la dermatitis atópica, señale la respuesta INCORRECTA:**

- A) Ha aumentado su incidencia en las últimas décadas.
- B) En su etiopatogenia interviene la mutación del gen de la filagrina.
- C) Es raro su diagnóstico antes del año de edad.
- D) Es frecuente en la edad escolar la afectación de flexuras cubitales y poplíteas.

**55) ¿Cuál de estos agentes infecciosos es el más frecuentemente implicado en la bronquiolitis obliterante?**

- A) Enterovirus.
- B) Bocavirus.
- C) Adenovirus.
- D) Metapneumovirus.

**56) Paciente que presenta las siguientes características: pupilas mióticas y reactivas, reflejos vestibulares incrementados, patrón respiratorio de Cheyne-Stokes, respuesta motora decorticada o flexión anormal. Señale la localización más probable de la lesión:**

- A) Diencefalo.
- B) Mesencefalo.
- C) Protuberancia.
- D) Bulbo raquídeo.

**57) En la enfermedad de Kawasaki ¿cuál de los siguientes hallazgos le parece menos sugestivo?**

- A) Sedimento urinario con piuria estéril.
- B) Trombocitosis.
- C) Leucopenia.
- D) Albúmina inferior a 3 g/dl.

**58) Para la valoración de la obesidad en la Guía de práctica clínica de obesidad del Sistema Nacional de Salud de 2009, se defiende el uso de las tablas de:**

- A) La OMS.
- B) Hernández et al.
- C) Ferrández et al.
- D) Tanner.

**59) La espondilolisis y espondilolistesis pediátrica se produce con más frecuencia sobre las vértebras:**

- A) L1 y L2
- B) L2 y L3
- C) L3 y L4
- D) L4 y L5

**60) En la Infección tuberculosa latente se cumplen todas las siguientes afirmaciones EXCEPTO:**

- A) Prueba de tuberculina positiva o IGRA positivo.
- B) Con o sin contacto reciente conocido con una persona bacilífera.
- C) Radiografía sugestiva de tuberculosis.
- D) Ausencia de síntomas.

**61) Tanto en adultos como en niños, la OMS recomienda reducir la ingesta de azúcares libres a menos del... Señale la respuesta correcta:**

- A) 20 % de la ingesta calórica total.
- B) 10% de la ingesta calórica total.
- C) 5 % de la ingesta calórica total.
- D) 25 % de la ingesta calórica total.

**62) Se consideran criterios diagnósticos de anorexia nerviosa según el DSM-5 de la Asociación Americana de Psiquiatría, todos los siguientes EXCEPTO:**

- A) Restricción de la ingesta energética en relación con las necesidades, que conduce a un "peso corporal significativamente bajo".
- B) Miedo intenso a ganar peso o engordar.
- C) Alteración en la forma en que uno percibe su propio peso o constitución.
- D) Alteración de parámetros nutricionales en analítica sanguínea.

**63) Señale la respuesta INCORRECTA de los siguientes binomios enfermedad-tratamiento de primera elección:**

- A) Oftalmia gonocócica - Ceftriaxona intramuscular.
- B) Dacriocistocele - Masaje/descompresión digital del saco lagrimal.
- C) Conjuntivitis neonatal por Clamidas - Eritromicina oral.
- D) Obstrucción no complicada del conducto nasolagrimal en período neonatal - Sondaje del conducto lagrimal.

**64) Señale qué afirmación es verdadera con respecto a la fiebre mediterránea familiar:**

- A) Suele aparecer en el primer año de vida.
- B) Es característica la eliminación de ácido mevalónico en orina entre las crisis.
- C) En el 85% de los casos aparece un exantema maculopapuloso.
- D) El pronóstico está marcado por la aparición de amiloidosis.

**65) ¿A qué tipo de prevención corresponde la reducción de los factores de riesgo que favorecen las caídas?**

- A) Prevención primaria.
- B) Prevención secundaria.
- C) Prevención terciaria.
- D) No entra en ningún tipo de prevención.

**66) Sobre la Neutropenia Cíclica, señale la respuesta correcta:**

- A) Es una enfermedad congénita poco frecuente.
- B) Se produce neutropenia en sangre periférica cada 3-4 meses.
- C) Los episodios cíclicos no suelen acompañarse de síntomas.
- D) Se produce por una mutación del gen de la proteína elastasa del neutrófilo localizada en el cromosoma 17.

**67) En caso de neumonía adquirida en la comunidad y drepanocitosis, ¿Cuál de los siguientes sería el agente bacteriano infeccioso más probablemente implicado?**

- A) *Achromobacter xylosoxidans*.
- B) *Mycoplasma pneumoniae*.
- C) *Burkholderia cepacia*.
- D) *Pseudomonas Aeruginosa*.

**68) Respecto a la pronación dolorosa NO es cierto que:**

- A) Predomina en niñas menores de cuatro años de edad (media: 27 meses), y el brazo izquierdo suele ser el más afectado.
- B) En la mitad de los casos existe el antecedente de tracción, para evitar que el niño se caiga o se suelte de la mano, estando el antebrazo en pronación y el codo en extensión.
- C) La maniobra de reducción de "pronación forzada", acompañada de la extensión o flexión del codo solo debe realizarse al fracasar la maniobra de "supinación flexión".
- D) La presencia de edema o equimosis a nivel del codo contraindica realizar ningún intento de reducción, debiéndose excluir una posible fractura subyacente.

**69) En relación a los nevos melanocíticos adquiridos, señale la respuesta INCORRECTA:**

- A) Son los tumores cutáneos benignos más frecuentes.
- B) El nevus en diana o escarapela tiene alto riesgo de malignización.
- C) Los nevos de una misma persona suelen ser similares entre sí, por lo que nos tiene que llamar la atención el que es diferente al resto.
- D) En los niños es frecuente que aparezcan lesiones nuevas.

**70) Según las recomendaciones de tratamiento antimicrobiano empírico de la estrategia IRASPROA, en la infección urinaria afebril en niños mayores de 6 años, es cierto:**

- A) Es de primera elección el tratamiento con fosfomicina trometamol.
- B) Está indicado comenzar el tratamiento con cefuroxima axetil.
- C) El trimetoprim-sulfametoxazol durante 3-5 días es de elección en nuestro medio.
- D) La nitrofurantoina durante 7-10 días es un tratamiento alternativo.

**71) Los siguientes signos y síntomas son sospechosos de un neuroblastoma, EXCEPTO:**

- A) Enuresis diurna.
- B) Dolor de espalda no justificado.
- C) Proptosis.
- D) Retención urinaria no justificada.

**72) En la hiperplasia suprarrenal congénita, señale el enunciado FALSO:**

- A) El déficit más frecuente es el de la enzima 21 hidroxilasa.
- B) La síntesis de glucocorticoides está disminuida.
- C) La síntesis de 17 hidroxiprogesterona está disminuida.
- D) La síntesis de andrógenos está aumentada.

**73) En todas las siguientes situaciones EXCEPTO una, se recomienda la vacunación frente al neumococo utilizando esquemas mixtos que incluyen la VNC13 y la VNP23:**

- A) Niños con implante coclear.
- B) Fístulas del espacio subaracnoideo, excluyendo las válvulas de derivación ventrículo-peritoneales.
- C) Prematuros menores de 32 semanas o de 1700 g de peso.
- D) Diabetes mellitus.

**74) La Organización Mundial de la Salud (OMS) delimita la adolescencia como el periodo comprendido entre:**

- A) Los 9 y los 16 años.
- B) Los 12 y 18 años.
- C) Los 10 y los 19 años.
- D) Los 11 y los 16 años.

**75) ¿Cuál de las siguientes enfermedades del niño viajero tiene un periodo de incubación breve (7-10 días)?**

- A) Arboviriasis.
- B) Tuberculosis.
- C) Hepatitis A.
- D) Leishmaniasis visceral.

**76) Respecto a la atención del recién nacido sano a término en el centro de atención primaria en las 48-72 horas de vida, señale la respuesta FALSA:**

- A) Es imprescindible tener tramitada la tarjeta sanitaria individual para solicitar cita en el centro de salud.
- B) Es un factor protector significativo para disminuir las rehospitalizaciones de recién nacidos.
- C) El apoyo precoz a la lactancia materna después del alta de la maternidad consigue aumentar la probabilidad de lactancias maternas que continúen a las 4 semanas y a los seis meses de evaluación.
- D) Consigue detectar precozmente la deshidratación hipernatrémica.

**77) Según la actualización de 2020 del documento de consenso de la Asociación Española de Pediatría sobre el diagnóstico y tratamiento de la faringoamigdalitis aguda es FALSO que:**

- A) No existe ninguna escala de predicción clínica para seleccionar a los pacientes susceptibles de realizar un test de diagnóstico rápido frente a estreptococo beta-hemolítico del grupo A que sea mejor que las ya conocidas: Centor, McIsaac y FeverPAIN.
- B) Las escalas de predicción clínica deben ser utilizadas para la decisión de instaurar antibioterapia empírica, aunque las pruebas microbiológicas estén disponibles y no exista riesgo de fiebre reumática.
- C) Es posible utilizar pruebas moleculares para el diagnóstico de faringitis estreptocócica, pero su uso generalizado no se recomienda en la actualidad.
- D) La penicilina oral en dos dosis diarias es el tratamiento de elección de la faringoamigdalitis estreptocócica.

**78) Un niño de 12 meses en parada cardiorrespiratoria presenta en monitorización electrocardiográfica una asistolia, ¿qué se debe hacer en ese momento?**

- A) Desfibrilar a 1jul/ Kg.
- B) Dar masaje cardíaco y administrar adrenalina 0.01 mg/Kg /iv
- C) Desfibrilar a 4 jul/ Kg y administrar adrenalina a 0,01 mg/ kg iv
- D) Dar masaje cardíaco y administrar adrenalina a 0,1 mg/ Kg iv

**79) Respecto al Programa de Atención Bucodental Infantil y Juvenil del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, señale la afirmación cierta:**

- A) Pueden acceder al programa los niños entre 4 y 15 años, cumplidos en el año en curso.
- B) Los niños con discapacidad pueden acceder entre los 6 y 16 años, cumplidos en el año en curso.
- C) La atención se recibe exclusivamente en las Unidades de Salud Bucodental del centro de salud que le corresponda.
- D) Los procedimientos que incluye son, entre otros, los tratamientos de ortodoncia en su fase diagnóstica.

**80) La falsa hematuria (orina roja o anaranjada) se puede relacionar con la ingesta de todos los siguientes fármacos, EXCEPTO:**

- A) Difenilhidantoína.
- B) Ibuprofeno.
- C) Metilfenidato.
- D) Rifampicina.

**81) Es FALSO en el desarrollo madurativo del recién nacido (RN) que:**

- A) El RN es totalmente dependiente, física y psicológicamente.
- B) El RN está completamente indefenso ante los estímulos tanto internos como externos que además no discrimina.
- C) Las manifestaciones del RN ante tensiones desagradables, frío, hambre, presión, humedad, etc., serán totalmente somáticas: lloros, pataleos, protestas, etc.
- D) Es el RN por sí mismo el que moldeará los ritmos de sueño y alimentación, que son básicos para establecer su bienestar; no es recomendable la intervención de sus cuidadores.

**82) Con respecto al cribado neonatal del hipotiroidismo congénito es FALSO que:**

- A) Si se realiza tras 48 h., es preciso repetir la prueba porque la TSH puede no estar elevada.
- B) En los RN prematuros de menos de 32 semanas se repite la determinación a los 7-14 días para valorar correctamente la TSH.
- C) Los RN ingresados en cuidados intensivos que hayan recibido dopamina deben repetir la prueba entre los 7 y 14 días de vida.
- D) Si recibimos en el centro de salud un niño nacido en domicilio debemos remitirlo para hacer el cribado.

**83) Según datos del ESTUDES 2020, las drogas más consumidas por los adolescentes en España son (ordenadas de más consumida a menos consumida):**

- A) El alcohol, el tabaco, el cannabis y los hipnosedantes.
- B) El cannabis, el alcohol, el tabaco y los hipnosedantes.
- C) El alcohol, el cannabis, el tabaco y los hipnosedantes.
- D) El tabaco, el cannabis, el alcohol y los hipnosedantes.

**84) Respecto a la tosferina, señale la respuesta correcta:**

- A) La neumonía es la complicación más común en todos los grupos de edad.
- B) En la fase catarral temprana de la tosferina la posibilidad de contagio es muy limitada.
- C) Se estima que la tasa de ataque es inferior al 80% en contactos no inmunes en el hogar.
- D) La infección natural por Bordetella pertussis confieren inmunidad duradera.

**85) ¿Cuál de las siguientes enfermedades NO está transmitida por garrapatas?**

- A) Fiebre botonosa mediterránea.
- B) Debonel TIBOLA.
- C) Enfermedad de Lyme.
- D) Enfermedad de Chagas.

**86) Son miembros que forman parte del grupo coordinador del sector de la estrategia IRASPROA AP Aragón (prevención de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria y de la resistencia a los antibióticos) los siguientes, EXCEPTO:**

- A) Un infectólogo o clínico experto en enfermedades infecciosas.
- B) Un farmacéutico de Atención Primaria.
- C) Un representante de la Gerencia del Sector.
- D) Un médico preventivista del sector.

**87) La fiebre de origen desconocido en la infancia la causan, de mayor a menor frecuencia:**

- A) Procesos infecciosos, conectivopatías, procesos neoplásicos.
- B) Procesos neoplásicos, conectivopatías, infecciones.
- C) Conectivopatías, infecciones, procesos neoplásicos.
- D) Infecciones, procesos neoplásicos, conectivopatías.

**88) En el tratamiento de la laringitis leve es correcto:**

- A) El tratamiento de elección es la dexametasona vía oral a: 0,10 mg/kg en dosis única.
- B) Como tratamiento alternativo se puede usar prednisolona vía oral a: 2 mg/kg en dosis única diaria, durante 1-3 días.
- C) El empleo de budesonida en aerosol (2 mg), en uso combinado con dexametasona vía oral ha demostrado mejorar los resultados.
- D) Puede administrarse dexametasona por vía intramuscular en caso de vómitos.

**89) Señale la respuesta FALSA sobre la Pitiriasis Rosada de Gibert en piel de raza negra:**

- A) La afectación de mucosas es más frecuente que en la raza caucásica.
- B) Las lesiones pueden simular a una varicela.
- C) Las recurrencias son más frecuentes.
- D) Menor tendencia a formas atípicas.

**90) Señale la respuesta correcta respecto al uso del polietilenglicol (PEG) en el estreñimiento funcional en la edad pediátrica:**

- A) Es el fármaco más recomendado a dosis entre 0.2-0.8 g/kg/día para desimpactación y 1-1.5 g/kg/día para mantenimiento.
- B) Está contraindicado por debajo de los 12 meses.
- C) No hay evidencia experimental suficiente para establecer la dosis óptima eficaz de PEG en menores de 2 años.
- D) En caso de sospecha de íleo paralítico/obstrucción intestinal, se debe disminuir la dosis.

**91) Son factores de riesgo mayores de displasia evolutiva de cadera (DEC) todos los siguientes EXCEPTO:**

- A) Oligoamnios.
- B) Sexo femenino.
- C) Parto de nalgas.
- D) Antecedentes familiares de DEC.

**92) El Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico vinculado a SARS-CoV-2 (SIM-PedS) se caracteriza por todo lo siguiente EXCEPTO:**

- A) Hipoalbuminemia.
- B) Linfocitosis.
- C) Elevación significativa del dímero D.
- D) Hiponatremia.

**93) Niño de 2 años que debuta hace 1 mes con episodios breves y espontáneos de nistagmo asimétrico asociado a inclinación y movimientos de negación de la cabeza; el diagnóstico más probable es:**

- A) "Head Banging".
- B) Estremecimientos cefálicos.
- C) *Spasmus nutans*.
- D) Debut de hemiplejía alternante de la infancia.

**94) Acerca del tratamiento con melatonina, señale la respuesta FALSA:**

- A) Iniciar con dosis en lactantes: 1-3 mg.
- B) Iniciar con dosis en preescolares: 2.5-5 mg.
- C) Iniciar dosis en adolescentes: 1-5 mg.
- D) Debe administrarse entre 30-60 minutos antes de la hora habitual de dormir.

**95) La diseminación de las lesiones herpéticas en un niño con dermatitis atópica se denomina:**

- A) Eccema herpético.
- B) Eccema *cocksakium*.
- C) Condilomatosis herpética.
- D) Sepsis herpética.

**96) Respecto a las actividades propias de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica señale la respuesta FALSA:**

- A) Vigilar y recoger sistemáticamente la información epidemiológica.
- B) El análisis e interpretación de resultados es realizado por una agencia externa a la Red.
- C) Difundir los resultados en el Boletín Epidemiológico Semanal.
- D) Realizar recomendaciones de actuación en base a los resultados obtenidos.

**97) Son criterios diagnósticos del Trastorno por Atracón según el DSM-5 de la Asociación Americana de Psiquiatría todos los siguientes, EXCEPTO:**

- A) IMC por encima del Percentil 90.
- B) Importante malestar por los atracones.
- C) Los atracones son al menos de dos veces por semana y en un periodo de seis meses.
- D) Episodios recurrentes de atracones que se caracterizan por las dos siguientes condiciones: comer en un corto periodo de tiempo y sensación de pérdida de control durante los episodios.

**98) En relación a las artritis en pediatría, NO es cierto:**

- A) Se define como dolor de la articulación, se acompaña de signos inflamatorios, tumefacción y aumento de calor local.
- B) El estudio de parámetros inmunológicos como los anticuerpos antinucleares (ANA) solo debe considerarse ante sospecha de artritis inflamatoria crónica, ya que pueden estar presentes en niños sanos.
- C) El diagnóstico de Artritis Idiopática Juvenil se alcanza mediante exclusión de otras etiologías.
- D) La artritis psoriásica solo puede ser diagnosticada si existen manifestaciones dérmicas o ungueales de psoriasis.

99) Indique el agente infeccioso que produce la "ceguera de los ríos":

- A) *Wuchereria bancrofti*.
- B) *Onchocerca volvulus*.
- C) *Strongyloides stercoralis*.
- D) *Necator americanus*.

100) En el caso de traumatismos dentales de dientes primarios, señale la respuesta INCORRECTA:

- A) Se recomienda reimplantar lo antes posible, si existe avulsión dental.
- B) Si hay fractura dental se recomienda dieta blanda y analgesia.
- C) En caso de dientes luxados muy móviles, valorar extracción si hay posibilidad de aspiración.
- D) El objetivo principal del tratamiento es la prevención del daño potencial en los dientes permanentes.

101) Respecto a la evaluación y desarrollo de nuevas vacunas, señale la afirmación correcta:

- A) La evaluación de la eficiencia de los programas de vacunaciones se realiza mediante los análisis coste-efectividad y coste-beneficio.
- B) Para la determinación de la efectividad de una vacuna, debe realizarse un ensayo clínico controlado.
- C) Para el análisis de la eficacia se recurre a estudios epidemiológicos observacionales, principalmente a los estudios de cohortes y de casos y controles.
- D) La búsqueda de la dosis adecuada se establece principalmente en la fase preclínica del desarrollo de una vacuna.

102) Respecto de las maniobras de Ortolani-Barlow, señale la respuesta correcta:

- A) La maniobra de Barlow consiste en luxar una cadera que estaba reducida.
- B) La maniobra de Ortolani debe realizarse en cada exploración de las revisiones del lactante hasta el año de edad.
- C) Con la maniobra de Ortolani debe conseguirse una abducción de más de 90° entre los 3-12 meses.
- D) Con la prueba de Thomas el recién nacido presenta una contractura en flexión de al menos 45°.

**103) ¿Cuál de las siguientes recomendaciones en el ámbito de la nutrición y crecimiento del Protocolo de seguimiento del prematuro tardío de la Sociedad Española de Neonatología es cierta?**

- A) Hay que animar a la madre a efectuar la extracción de leche y suplementar al neonato con su propia leche si la suplementación es necesaria.
- B) Antes del alta hospitalaria hay que tranquilizar a los padres puesto que sus hijos no tienen un riesgo aumentado de dificultades de alimentación, hiperbilirrubinemia y deshidratación.
- C) Para la evaluación del crecimiento tras el alta se recomienda el uso de las curvas de Fenton de acuerdo con la edad corregida hasta los 2 años.
- D) Se debe administrar 400 UI/día de vitamina D desde la segunda semana de vida.

**104) En un niño inmigrante la presencia de macrocefalia y retraso psicomotor nos llevará a descartar todo, EXCEPTO:**

- A) Infección por el virus Zika.
- B) Toxoplasmosis.
- C) Hipotiroidismo.
- D) Malformaciones congénitas.

**105) Sobre las ventajas de estudios de casos y controles, señale la afirmación INCORRECTA:**

- A) Son un buen diseño para estudiar enfermedades con largo periodo de latencia.
- B) Pueden evaluar múltiples factores de riesgo para una sola enfermedad.
- C) Permiten calcular la incidencia o prevalencia de una enfermedad.
- D) Permiten estimar el riesgo de padecer una enfermedad en relación a una exposición.

**106) La ictericia del recién nacido se considera patológica en las siguientes circunstancias, EXCEPTO:**

- A) Cuando se inicia en las primeras 24 horas.
- B) Se acompaña de otros síntomas.
- C) Aumenta más de 1 mg/dl/día.
- D) La fracción directa será superior a 2mg/dl.

**107) En relación a los procedimientos diagnósticos y terapéuticos en Atención Primaria, señale la respuesta INCORRECTA:**

- A) El taponamiento nasal debe de realizarse en Atención Especializada.
- B) Se pueden detectar úlceras corneales con tinción de fluoresceína.
- C) Los Centros de Atención Primaria están dotados de material para resucitación cardiopulmonar.
- D) Se pueden detectar alteraciones ortopédicas con el uso del podoscopio.

**108) Señale la respuesta FALSA respecto a los factores antibacterianos presentes en la leche materna humana:**

- A) La IgG es considerada la inmunoglobulina más importante, representando aproximadamente un 80-90% del total.
- B) La lactoferrina tiene una función bacteriostática y previene el crecimiento de diferentes patógenos.
- C) La lactoperoxidasa cataliza la oxidación del tiocianato presente en la saliva, formando un compuesto capaz de destruir bacterias grampositivas y gramnegativas.
- D) La lisozima es una enzima capaz de degradar la pared externa de las bacterias grampositivas.

**109) Para prevenir el síndrome de muerte súbita infantil NO se recomienda:**

- A) Poner al bebé a dormir en decúbito lateral.
- B) Compartir habitación con los padres.
- C) Uso de chupete.
- D) Lactancia materna.

**110) En la evaluación del área del lenguaje se considera signo de alerta:**

- A) Falta de balbuceo imitativo a los 9 meses.
- B) No dice frases a los 30 meses.
- C) Tartamudeo a los 2 años.
- D) Lenguaje incomprensible a los 24 meses.

