

PROTOCOLO DE VACUNACIÓN EN POBLACIÓN ADULTA

Actualización a **18/12/2019**

ANEXO 2. PAÍSES DE ORIGEN DE ADULTOS INMIGRANTES* EN LOS QUE SE RECOMIENDA LA VACUNACIÓN FRENTE A POLIOMIELITIS

Países con transmisión de poliovirus salvajes (administrar 3 dosis -0, 1, 6 meses-):

Afganistán, Paquistán y Nigeria.

Países con transmisión de poliovirus derivados de la vacuna oral (administrar 1 dosis):

Angola, Benín, Camerún, Chad, Etiopía, Ghana, Mozambique, Níger, República Centroafricana, R.D. Congo, Somalia, Togo, Zambia, Papúa Nueva Guinea, Indonesia (Isla de Papúa), China (provincia de Sichuan), Filipinas, Malasia, Myanmar y Ucrania.

Países en los que no circula poliovirus pero vulnerables a la reinfección (administrar 1 dosis):

Kenia y Siria.

Adaptado -con información de alertas del MSCBS- de:

<http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/public-health-emergency-status/>

* Para estas recomendaciones se entiende como adulto a toda la población de 15 o más años. En los menores se revisará y actualizará, si procede, el calendario de vacunación.

www.aragon.es/vacunas