

PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN PLAZAS DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN.

Resolución de 21 de mayo de 2018 (B.O.A. número 108 de 6 de junio de 2018)

CATEGORÍA:

ENFERMERO/A ESPECIALISTA OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICO (MATRÓN/A)

ADVERTENCIAS:

- No abra este cuestionario hasta que se le indique. Para hacerlo introduzca la mano en el cuadernillo y con un movimiento ascendente rasgue el lomo derecho (ver figura esquina inferior derecha).
- Este cuestionario consta de 110 preguntas de las cuales las 10 últimas son de reserva. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la «Hoja de Examen» entre los números 1 y 110.
- Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario solicite su sustitución.
- El tiempo de realización de este ejercicio es de 2:00 HORAS.
- Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor. Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las no contestadas no tendrán valoración alguna y las contestadas erróneamente restarán un tercio del valor de la respuesta correcta.
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la «Hoja de Examen» es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario.
- En cada pregunta existe una y sólo una respuesta correcta.
- Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- No se permite el uso de calculadora, libros ni documentación alguna, móvil o ningún otro elemento electrónico.
- **SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR EN LA "HOJA DE EXAMEN" LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.**
- **ESTE CUESTIONARIO NO DEBERÁ SER DEVUELTO AL FINALIZAR EL EJERCICIO.**
- **TODOS LOS MÓVILES DEBERÁN ESTAR APAGADOS SU OMISIÓN PODRÁ SER MOTIVO DE EXPULSIÓN.**

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL



1) Según el artículo 92 de la Constitución Española, las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos, que será convocado:

- A) Por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.
- B) Por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por las Cortes Generales.
- C) Por el Presidente del Gobierno, mediante propuesta del Congreso de los Diputados.
- D) Por el Presidente del Congreso de los Diputados, mediante propuesta del Gobierno de la Nación.

2) Según el artículo 115.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente:

- A) Impedirá su tramitación.
- B) No será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter.
- C) Es una de las causas de inadmisión del recurso.
- D) Es un obstáculo para su tramitación, aunque del recurso se deduzca su verdadero carácter, que puede conllevar, en su caso, la pérdida del derecho.

3) Indique la respuesta INCORRECTA. Según la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, el Centro de Salud tendrá las siguientes funciones:

- A) Facilitar el trabajo en equipo de los profesionales sanitarios de la zona.
- B) Mejorar la organización administrativa de la atención de salud en su zona de influencia.
- C) La aprobación de las prioridades específicas del área de salud.
- D) Servir como centro de reunión entre la comunidad y los profesionales sanitarios.

4) Según la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, el principal instrumento de configuración del Sistema Nacional de Salud es:

- A) El Observatorio de Salud del Sistema Nacional de Salud.
- B) El Ministerio de Sanidad y Consumo.
- C) El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
- D) La Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud.

5) El personal estatutario fijo que acceda a plaza de formación sanitaria especializada mediante residencia, será declarado en situación de:

- A) Suspensión provisional de funciones para la formación.
- B) Excedencia por prestar servicios en el sector público.
- C) Servicios bajo otro régimen jurídico.
- D) Servicios especiales.

6) De acuerdo con el artículo 16 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, el responsable del tratamiento tendrá la obligación de hacer efectivo el derecho de rectificación o cancelación del interesado:

- A) En el plazo máximo de quince días.
- B) En el plazo de diez días.
- C) En el plazo máximo de un mes.
- D) Con carácter inmediato a la solicitud.

7) Señale la respuesta INCORRECTA, según el art. 31 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los empleados públicos tienen derecho para la determinación de sus condiciones de trabajo a:

- A) La negociación colectiva.
- B) La representación.
- C) La participación institucional.
- D) La negociación individual mancomunada.

8) Según el artículo 3 de la Ley 9/2013, de 28 de noviembre, de Autoridad de Profesionales del Sistema Sanitario y de Servicios Sociales Públicos de Aragón, uno de los principios generales que inspiran esta Ley es el siguiente:

- A) La protección jurídica adecuada a los profesionales en el cumplimiento de sus actos profesionales y de sus funciones.
- B) El reconocimiento de las funciones de los profesionales de los centros sanitarios y sociales como factor esencial en la calidad de los servicios.
- C) Disponer de los medios materiales necesarios para el adecuado ejercicio de la labor sanitaria y social.
- D) Recibir apoyo por parte del Departamento con competencias en materia de sanidad y servicios sociales del Gobierno de Aragón.

9) ¿Cuál de los siguientes órganos administrativos pertenece a la estructura del Servicio Aragonés de Salud?

- A) Secretaría General Técnica.
- B) Dirección de Recursos Humanos.
- C) Dirección General de Salud Pública.
- D) Dirección General de Asistencia Sanitaria.

10) Según el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA, en lo concerniente a la vigilancia de la salud de los trabajadores?

- A) Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo, cuando el trabajador preste su consentimiento.
- B) Los resultados de la vigilancia y control de la salud de los trabajadores serán comunicados a los trabajadores afectados.
- C) Los resultados de la vigilancia y control de la salud de los trabajadores, serán puestos en conocimiento, en todo caso, de los representantes de los trabajadores.
- D) En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral, en los términos que reglamentariamente se determine.

11) El desarrollo del turismo es una medida económica que favorece la vertebración del territorio. Para visitar el Castillo de Loarre, a qué provincia deberá dirigirse:

- A) Soria.
- B) Zaragoza.
- C) Huesca.
- D) Teruel.

12) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta según el artículo 59.3 del Estatuto de Autonomía de Aragón?

- A) El Justicia rendirá cuentas de su gestión ante las Cortes de Aragón y ante las Cortes Generales.
- B) El Justicia rendirá cuentas de su gestión ante las Cortes de Aragón.
- C) El Justicia rendirá cuentas de su gestión ante el Gobierno de Aragón.
- D) El Justicia, como institución independiente de la Comunidad Autónoma de Aragón, no deberá rendir cuentas de su gestión ante las otras instituciones de la Comunidad Autónoma de Aragón.

13) Según el artículo 21 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, los programas de formación de las especialidades en Ciencias de la Salud son elaborados por:

- A) La Comisión Nacional de la Especialidad.
- B) La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud.
- C) El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
- D) El Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud.

14) Los centros sanitarios tienen la obligación de conservar la documentación clínica para la debida asistencia al paciente durante el tiempo adecuado a cada caso y, como mínimo, desde la fecha de alta de cada proceso asistencial, durante el siguiente período:

- A) 2 años.
- B) 4 años.
- C) 5 años.
- D) 10 años.

15) Para una embarazada sin factores de riesgo con residencia en la localidad de Albalate del Arzobispo, ¿Cuál es su hospital de referencia?

- A) Hospital de Alcañiz.
- B) Hospital Ernest Lluch Martín.
- C) Hospital Obispo Polanco.
- D) Hospital Nuestra Señora de Gracia.

16) El nombramiento de personal estatutario temporal de sustitución se expedirá en los siguientes supuestos:

- A) Cuando se trate de la prestación de servicios determinados de naturaleza temporal, coyuntural o extraordinaria.
- B) Cuando resulte necesario atender las funciones de personal fijo o temporal, durante los periodos de vacaciones, permisos y demás ausencias de carácter temporal que comporten la reserva de la plaza.
- C) Cuando sea necesario para garantizar el funcionamiento permanente y continuado de los centros sanitarios.
- D) Para la prestación de servicios complementarios de una reducción de jornada ordinaria.

17) ¿Cuál es el germen predominante en las mastitis?

- A) *Corynebacterium* spp.
- B) *Escherichia coli*.
- C) *Staphylococcus aureus*.
- D) *Streptococcus* del grupo B.

18) Todas son características de atipia en las deceleraciones variables, EXCEPTO:

- A) Aceleración secundaria prolongada (aumento de >10 latidos y/o duración >10 segundos).
- B) Aspecto de W.
- C) Pérdida de la aceleración inicial y/o secundaria.
- D) Retorno lento a la línea de base.

19) Señale la respuesta INCORRECTA, en el modelo de Virginia Henderson son conceptos nucleares:

- A) Enfermería.
- B) Persona.
- C) Comunicación.
- D) Entorno.

20) Según la Ley 12/2001, de 2 de julio, de la Infancia y Adolescencia de Aragón, señale la respuesta FALSA:

- A) Los menores tendrán derecho a proseguir su formación escolar durante su permanencia en el hospital, beneficiándose de los recursos humanos y materiales que las autoridades escolares pongan a su disposición.
- B) Los padres o quienes les sustituyan en el ejercicio de las funciones propias de la patria potestad serán informados por el centro sanitario de las medidas y tratamientos a seguir, así como de los derechos y deberes que tiene el niño hospitalizado.
- C) Los niños y adolescentes hospitalizados tienen derecho a estar acompañados por sus padres o hermanos en cualquier momento.
- D) El personal, horarios, distribución de espacios y, en general, toda la organización del centro hospitalario se adecuará a las necesidades del niño o adolescente.

21) En la valoración física, ya sea cefalocaudal o por órganos, aparatos y sistemas, ¿qué cuatro técnicas específicas se emplean, según el pensamiento de Virginia Henderson?

- A) Percusión, intensidad, calidad y movilidad.
- B) Palpación, temperatura, consistencia e inspección.
- C) Inspección, palpación, percusión y auscultación.
- D) Localización, simetría, palpación y percusión.

22) Según los resultados de los estudios españoles sobre la frecuencia de eventos adversos en diferentes ámbitos asistenciales (ENEAS, APEAS, EARCAS, SYREC Y EVADUR), se puede afirmar que:

- A) Una de las utilidades del estudio ENEAS (Estudio Nacional de Eventos Adversos relacionados con la hospitalización) fue poner en la agenda del Sistema Nacional de Salud la prioridad estratégica de seguir las recomendaciones basadas en la evidencia.
- B) El estudio APEAS (Estudio de Eventos Adversos en Atención Primaria) sirvió para poner de manifiesto la alta frecuencia y gravedad de los eventos adversos en el primer nivel asistencial.
- C) La incidencia de eventos adversos relacionados con la asistencia sanitaria y su distribución por categorías en los hospitales españoles es menor a la de los estudios realizados en países americanos.
- D) El tanto por ciento de efectos adversos prevenibles en Atención Primaria, según el estudio APEAS, fue del 98%.

23) Dentro de la educación materna, se informa de las técnicas para el control y alivio del dolor en el parto. El método en el cual se promueve el parto natural, relajado, reforzado por técnicas de hipnosis recibe el nombre de:

- A) BirthWorks de Cathy Daub.
- B) Método Bradley.
- C) Lamaze.
- D) Método Mongan.

24) De acuerdo con el Programa para la organización de la Atención Anticonceptiva de Aragón (mayo 2016), es criterio de atención en la consulta de la Matrona:

- A) Paciente psiquiátrica grave para valorar utilización de anticoncepción hormonal.
- B) Colocación de DIU.
- C) Paciente con cefaleas con aura que desea prescripción en anticoncepción.
- D) Colocación de implante anticonceptivo subcutáneo.

25) El Gobierno de Aragón proporciona a los profesionales y a los padres unas guías para la promoción y prevención de la salud infantil, entre las que NO se encuentra:

- A) Guía para la prevención de accidentes en la infancia.
- B) Guía de lactancia materna.
- C) Cuídame: guía para padres y madres.
- D) Una ventana abierta a la familia.

26) La primera manifestación física de la pubertad en las niñas es:

- A) Pubarquia.
- B) Telarquia.
- C) Menarquia.
- D) Adrenarquia.

27) ¿Cuál de los siguientes gestágenos posee mayor efecto antiandrogénico?

- A) Levonorgestrel.
- B) Etonogestrel.
- C) Norgestimato.
- D) Dienogest.

28) De los siguientes principios bioéticos, el que hace referencia a la actuación de la Institución Sanitaria es el de:

- A) Autonomía.
- B) Beneficiencia.
- C) Justicia.
- D) Universalidad.

29) La diabetes gestacional NO está relacionada con la aparición en el feto y en el neonato de:

- A) Macrosomía.
- B) Miocardiopatía hipertrófica.
- C) Enfermedad de la membrana hialina.
- D) Cromosomopatías.

30) Respecto a los Patrones Funcionales de Gordon, señale la respuesta INCORRECTA:

- A) Los Patrones Funcionales de Salud, describen una serie de 11 áreas relativas a la salud.
- B) Tienen un enfoque funcional de desarrollo y cultural que permite su aplicación a todos los ámbitos, especialidades y grupos de edad.
- C) Los Patrones son configuraciones de comportamientos contruidos desde las descripciones del cliente y las observaciones de la enfermera.
- D) La naturaleza independiente de los Patrones permite entender el resultado de cada patrón individualmente.

31) En relación a la citología en medio líquido, señale la opción INCORRECTA:

- A) En la citología en medio líquido el material obtenido se conserva inmediatamente tras su extracción en un medio líquido, normalmente de base alcohólica, que permite su almacenaje y transporte, y la extensión se realiza en el laboratorio.
- B) Un valor añadido de la citología en medio líquido es que no se utiliza todo el material para realizar el estudio citológico y el material remanente conservado en el líquido de fijación durante semanas a temperatura ambiente permite realizar pruebas complementarias evitando así una nueva toma.
- C) En los laboratorios, el uso de citología en medio líquido supone un aumento del tiempo de estudio microscópico.
- D) La citología en medio líquido ha permitido desarrollar sistemas de lectura automatizada.

32) Nos encontramos atendiendo un parto domiciliario y la gestante se encuentra en la fase de transición. Señale la opción correcta:

- A) En ocasiones puede aparecer esta fase, en la cual la mujer muestra deseos de empujar, aunque no presente dilatación completa.
- B) Es importante decirle a la gestante que no debe de empujar durante la fase de transición hasta que la dilatación sea completa. La matrona deberá explicarle cuando finaliza la dilatación y cuando debe empezar los pujos si así lo desea.
- C) El comportamiento de la madre en esta fase se caracteriza por una gran concentración, se encuentra sumergida en su proceso, no parece atender a los estímulos que vienen del exterior y el adormecimiento entre las contracciones le ofrece descanso para enfrentarse a los pujos.
- D) Todas son correctas.

33) Según la Oncoguía de prevención de cáncer de cuello de útero de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (2014), en relación a las pruebas de cribado del cáncer de cérvix, señale la opción INCORRECTA:

- A) El cribado con prueba de Virus del papiloma humano (VPH) no está indicado para mujeres menores de 30 años debido a la prevalencia elevada en este grupo de edad.
- B) El cribado entre 30 y 65 años debe realizarse preferentemente con una prueba de VPH clínicamente validada cada 5 años.
- C) La toma de la muestra debería realizarse en un medio preferiblemente r flex, es decir, sobre el mismo material utilizado para la prueba VPH lo que posibilita el estudio diferido con citolog a o pruebas adicionales.
- D) El Cribado conjunto con citolog a y prueba de VPH cada 5 a os (co-test), en las mujeres entre 30 y 65 a os, aporta una mayor sensibilidad en relaci n a la prueba de VPH.

34) Respecto al test de Haizea-Llevant, señale la respuesta INCORRECTA:

- A) Es un instrumento que permite comprobar el desarrollo cognitivo, social y motor de los ni os de 0 a 5 a os de edad.
- B) Delimita las  reas de exploraci n en  rea de socializaci n,  rea de lenguaje y l gica matem tica,  rea postural y  rea de manipulaci n.
- C) Se puede administrar en un corto periodo de tiempo. Los elementos a considerar en una determinada edad no sobrepasan los veinte.
- D) Delimita las  reas de exploraci n en: motoras, motoras finas-adaptativas, lenguaje, personales y sociales.

35)  Cu l de las siguientes enfermedades maternas NO contraindica la donaci n de sangre de cord n umbilical?

- A) Eclampsia severa.
- B) Mononucleosis infecciosa en los 6 meses previos.
- C) Brucelosis hasta 5 a os de la curaci n.
- D) Esclerosis lateral amiotr fica (ELA).

36) Los cuatro estilos de comunicación-relación profesional son:

- A) Técnico, paternalista o sacerdotal, de camaradería y cooperativo o contractual.
- B) De lealtad, franqueza, independiente y pactado.
- C) Subsidiario, independiente, pactado y veraz.
- D) Paternalista, independiente, veraz y subsidiario.

37) Cuando realizamos tomas de decisiones y seleccionamos prioridades de acción en función de las metas indicadas por la política sanitaria, estamos realizando:

- A) Planificación estratégica.
- B) Planificación normativa.
- C) Planificación y diseño de programas de salud.
- D) Planificación operativa.

38) El consumo de opiáceos durante la gestación puede ocasionar en el recién nacido:

- A) La acción tóxica directa de la droga puede ocasionar hipoglucemias severas, intolerancia a la lactosa y hemorragias conjuntivales.
- B) La depresión del sistema nervioso se debe principalmente al consumo de opiáceos al inicio del embarazo.
- C) El síndrome de abstinencia suele aparecer en el 80% de los recién nacidos de madres adictas y se inicia entre las 2 y las 6 h. después del parto.
- D) Alrededor del 40% de los recién nacidos con síndrome de abstinencia, al acabar éste, pueden presentar mayor irritabilidad y dificultad para tranquilizarse, conciliar el sueño y alimentarse, que a veces es susceptible de ser tratado con fenobarbital.

39) La programación de actividades dirigidas a lograr objetivos específicos, corresponde al nivel de planificación sanitaria:

- A) Normativa.
- B) Operativa.
- C) Estratégica.
- D) Contemplativa.

40) Durante el embarazo, NO es cierto que:

- A) El estrés y la falta de sueño pueden tener un impacto negativo en el estado emocional de la gestante.
- B) Los cambios hormonales durante el embarazo favorecen la capacidad del cerebro para controlar las emociones.
- C) En el primer trimestre de gestación son habituales sentimientos de alegría, miedo, incredulidad.
- D) En el tercer trimestre, el miedo al parto es uno de los sentimientos más habituales en las embarazadas.

41) ¿Qué fórceps es más útil para los casos de asinclitismo marcado?

- A) Naegele.
- B) Kjelland.
- C) Simpson.
- D) Piper.

42) NO es una característica de la investigación cualitativa:

- A) Exploratoria y descriptiva.
- B) Inductiva.
- C) Basada en la inducción probabilística del positivismo lógico.
- D) Holística.

43) Según el Plan de Gestión Integral de residuos en Aragón ¿Cuál de estas afirmaciones es cierta en relación con la gestión de residuos sanitarios?

- A) Los envases de medicamentos están regulados por la Ley 11/1998, de 24 de abril, y por el Real Decreto 1345/2010, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente.
- B) En Aragón la recogida selectiva de residuos de envases de medicamentos se realiza a través del Sistema Integrado de Gestión y Recogida de Envases del Sector Farmacéutico (SIGRE).
- C) La gestión de residuos sanitarios dispone de reserva de norma autonómica.
- D) Todo es cierto.

44) Si durante la atención de una puérpera, en la sala de observación puerperal o durante las dos horas tras el parto, refiere dolor intenso en los genitales, nuestra actitud será:

- A) Informar y explicar a la puérpera que es debido a los entuertos y proporcionarle analgésicos.
- B) Hay que considerar que es lógico y positivo puesto que está desapareciendo el efecto de la analgesia epidural y recuperando la sensibilidad.
- C) Explorar los genitales para descartar un hematoma perineal.
- D) Tomar constantes vitales y esperar a que pase a planta para iniciar la analgesia.

45) ¿Cuál de las siguientes opciones NO constituye un factor de riesgo para el cáncer de endometrio?

- A) Uso prolongado de anticonceptivos hormonales orales.
- B) Diabetes.
- C) Síndrome de ovario poliquístico.
- D) Terapia con tamoxifeno.

46) La razón o cociente entre la desviación típica y el valor de la media aritmética, se denomina:

- A) Coeficiente de variación.
- B) Varianza.
- C) Error estándar de la media.
- D) Mediana.

47) Señala la respuesta INCORRECTA sobre los estudios de cohortes:

- A) Los estudios de cohortes son los más indicados para conocer la forma en que se desarrolla una enfermedad en la colectividad.
- B) Su reproducción es fácil.
- C) Se obtienen estimaciones directas de la incidencia de la enfermedad, tanto en los sujetos expuestos como en los no expuestos.
- D) Las posibilidades de cometer sesgos son menores que en otros diseños epidemiológicos analíticos.

48) Con respecto a la interrupción voluntaria de la gestación mediante fármacos, debemos considerar que:

- A) Al no existir aspiración intrauterina, no precisa administrar gammaglobulina post aborto en caso de Rh negativo en la gestante.
- B) El fármaco más comúnmente utilizado es la mifepristona 200 mg en dosis única.
- C) El analgésico de elección será ácido acetil salicílico.
- D) Precisa un control posterior ecográfico en unos 10-14 días para comprobar evacuación uterina.

49) Una mujer usuaria de anticonceptivos hormonales combinados vía oral refiere aumento de mastalgia con la toma de éstos. Una de las posibles soluciones para disminuir este efecto será:

- A) Aumentar la dosis de etinil-estradiol para compensar el efecto del gestágeno que lleve el preparado.
- B) Cambiar a un preparado de dosis bajas de etinil-estradiol y reducir los intervalos libres de tomas; descansar sólo 4 (pauta 24 + 4) días en cada ciclo o 7 días cada 3-4 meses.
- C) Usar cualquier gestágeno menos la drospirenona ya que aumenta la retención hídrica y favorece el edema.
- D) Ninguna de las anteriores es correcta.

50) ¿En cuál de los siguientes cuestionarios/test se valora la pérdida de orina?

- A) E. Norton Modificada.
- B) T. de Yesavage.
- C) C. Stop-Bang.
- D) C. de Zarit.

51) En la tetralogía de Fallot, NO encontramos:

- A) Comunicación interventricular.
- B) Hipertrofia ventricular izquierda.
- C) Obstrucción grave del tracto de salida del ventrículo derecho.
- D) La válvula aórtica es más grande de lo normal y parece abrirse desde ambos ventrículos.

52) Respecto a las vías de absorción de medicamentos, señale la correcta:

- A) La vía genitourinaria es una vía de absorción inmediata o directa. La vascularización de la vagina permite el paso a la circulación sistémica de medicamentos sin efecto de primer paso hepático.
- B) En la vía sublingual la absorción se producirá a través de la mucosa sublingual. Es una vía de absorción mediata o indirecta.
- C) En la vía rectal la absorción del fármaco es regular, rápida y completa. Se trata de una vía de absorción inmediata o directa.
- D) La vía subcutánea es una vía parenteral, lenta y sostenida si usamos soluciones acuosas.

53) Entre las recomendaciones para el seguimiento y prevención en portadoras de mutación en los genes BRCA 1/2 y mujeres de alto riesgo para el cáncer de mama hereditario NO se encuentra:

- A) Exploración clínica de la mama a partir de los 25 años con una periodicidad semestral.
- B) Resonancia mamaria cada 2 años entre los 25 y 75 años.
- C) Anexectomía profiláctica en mujeres > de 35 años y con su deseo reproductivo finalizado.
- D) Mamografía anual entre los 25 y 75 años.

54) Según la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, la perfusión de sulfato de magnesio se utiliza para la prevención de las convulsiones y sólo una de las siguientes afirmaciones sobre su control es INCORRECTA:

- A) El reflejo rotuliano debe estar presente.
- B) Frecuencia respiratoria > 12 respiraciones por minuto.
- C) Diuresis > 25-30 ml/hora.
- D) Control de saturación de oxígeno mediante pulsioximetría.

55) En relación a la distocia de hombros (DH):

- A) La parálisis de Klumpke afecta a la mano y su posible deformación en garra.
- B) El pH de cordón umbilical desciende durante la DH siendo el riesgo de acidosis muy alto si el intervalo entre la salida de la cabeza y los hombros dura entre 3 y 5 minutos.
- C) El 80% de las DH se producen en fetos macrosómicos.
- D) La maniobra de Barnum consiste en la extracción manual del hombro anterior.

56) Según los Criterios de Elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2015, para la inserción de un Dispositivo intrauterino (DIU) tras el parto, es cierto que:

- A) Si la madre está lactando y el DIU es liberador de levonorgestrel, no se debe insertar hasta pasadas 6 semanas postparto.
- B) Independientemente de lactancia materna, el DIU puede insertarse en las primeras 48 horas tras el parto, salvo que aparezcan signos de sepsis puerperal.
- C) Un DIU de Cobre puede colocarse en cualquier momento pasados 10 días del parto normal.
- D) Independientemente de la carga o cantidad diaria de liberación de levonorgestrel, este tipo de DIU no puede utilizarse durante la lactancia materna.

57) De acuerdo con el Protocolo para el Control prenatal del embarazo normal, de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (2017), que recomendación sobre suplementación farmacológica de nutrientes es cierta:

- A) La dosis de yodo recomendada es de 300 microgramos/día durante el embarazo y la lactancia.
- B) La mujer con antecedente de un embarazo afectado por un defecto del tubo neural debe tomar 4 mg. de ácido fólico /día, al menos un mes antes de la gestación y durante los tres primeros meses de embarazo.
- C) En mujeres con diabetes mellitus insulino dependiente, se recomienda el aumento de alimentos ricos en folatos y debe tomar 0,4 mg. de ácido fólico al día, desde al menos 2-3 meses previos a la concepción.
- D) La suplementación de magnesio es de 400 mg. al día durante todo el embarazo.

58) Entre los consejos de fotoprotección a los niños, la Sociedad Española de Pediatría en Atención Primaria aporta una serie de recomendaciones a los padres. Señale la opción verdadera:

- A) El uso de ropa es una de las medidas más útiles de fotoprotección. Cuanto más fino y traslúcido es el tejido, más pasa la radiación. La protección se pierde con el tejido mojado y adherido a la piel.
- B) A partir de 1 mes se recomienda la utilización de crema fotoprotectora para el paseo, aunque la exposición al sol no sea muy intensa.
- C) Si va a haber una exposición intensa al sol se recomienda aplicar crema fotoprotectora sobre la piel seca entre 15 y 30 minutos antes de la exposición y repetir cada 4h aproximadamente e inmediatamente tras un baño prolongado, aunque figure que es un producto resistente al agua.
- D) En espacios interiores con cristalerías hay protección frente a los rayos UVA por lo que no hace falta ninguna medida de fotoprotección a excepción de una gorra con visera que cubra la cara y los ojos.

59) Entre los siete pilares de la Calidad Asistencial definidos por Avedis Donabedian, NO se encuentra:

- A) Efectividad.
- B) Aceptabilidad.
- C) Legitimidad.
- D) Accesibilidad.

60) Para mejorar la atención de los profesionales en la pérdida perinatal NO es necesario:

- A) Facilitar refuerzos en el turno en que se produzca la muerte fetal para que la atención sea más exclusiva a la mujer y su pareja por los mismos profesionales.
- B) Combinar personal experimentado con profesionales noveles e intentar que sean siempre los mismos profesionales los que se encarguen de estas situaciones ya que tienen la experiencia necesaria para saber manejarlas.
- C) Disponer de un lugar exclusivo y crear espacios para hablar de estas situaciones.
- D) Dejarse enseñar por los progenitores, que pueden responder desde las mil caras del duelo.

61) Al motivar y aconsejar a la mujer embarazada para abandonar el consumo de alcohol y/o tabaco, la matrona utilizará destrezas transversales como son:

- A) La empatía.
- B) No tolerar la resistencia al cambio.
- C) Culpar a la embarazada por su falta de motivación.
- D) Prejuizar a la mujer embarazada ya que intentará engañarnos sobre sus hábitos tóxicos.

62) Respecto al derecho de información en el Sistema Nacional de Salud, señale la FALSA:

- A) El usuario tendrá derecho a recibir información sobre los servicios y unidades asistenciales disponibles, su calidad y los requisitos de acceso a ellos.
- B) Los servicios de salud dispondrán en los centros y servicios sanitarios de una guía o carta de los servicios en la que se especifiquen los derechos y obligaciones de los usuarios.
- C) Tanto en la atención primaria como en la especializada, los usuarios tendrán derecho a la información previa correspondiente para elegir médico, e igualmente centro, con arreglo a los términos y condiciones que establezcan los servicios de salud competentes.
- D) Cada servicio de salud regulará por Decreto los procedimientos y los sistemas para intentar el cumplimiento de las previsiones de este derecho.

63) En el control domiciliario de la puérpera tras parto por cesárea encontramos: fiebre, dolor en hipogastrio, útero subinvolucionado, blando y doloroso a la presión y movilización, loquios achocolatados, seropurulentos con olor fétido característico:

- A) Se trata de un cuadro fisiológico, no debemos preocuparnos, le aconsejaremos analgésicos y beber abundante líquido.
- B) Sospecharemos una fascitis necrotizante por lo que derivaremos a la puérpera a urgencias.
- C) Sospecharemos una endometritis y derivaremos a la paciente de manera urgente para valoración y tratamiento.
- D) Sospecharemos una infección de herida quirúrgica de la cesárea por lo que derivaremos a la paciente a su médico de atención primaria para tratamiento.

64) Se considera una buena praxis en docencia y formación continuada, potenciar los aprendizajes significativos; ello implica:

- A) Que la persona aprende desde sus vivencias, motivaciones, preconceptos, modelos cognitivos y experiencias, reorganizándolos y modificándolos ante las nuevas informaciones y experiencias que se dan en el proceso educativo.
- B) Que los objetivos de aprendizaje están orientados a su utilización en la práctica clínica asistencial con una orientación eminentemente práctica.
- C) Que la metodología utilizada para conseguir los objetivos de aprendizaje ha de ser planificada y evaluada tanto como los objetivos conseguidos.
- D) Que el docente decide qué contenidos o actividades son importantes, significativos o relevantes para la adquisición de conocimientos o competencias profesionales y en base a ello planifica unas actividades docentes con su posterior evaluación.

65) ¿Cuál de las siguientes opciones NO constituye un objetivo de la Educación para la Salud?

- A) Informar a la población sobre formas para mejorar o proteger la salud, así como del uso eficaz de los servicios de asistencia médica.
- B) Prestar asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticas puestas al alcance de todos los individuos.
- C) Favorecer cambios en el medio ambiente que faciliten condiciones de vida y conductas saludables.
- D) Motivar a la población para la adquisición hábitos más saludables.

66) ¿Cuál de los siguientes fármacos se considera teratógeno en la gestación?

- A) Tetraciclina.
- B) Penicilina.
- C) Doxilamina+Piridoxina.
- D) Paracetamol.

67) Respecto a las maniobras de Leopold, ¿cuál es la afirmación verdadera?

- A) En la primera maniobra el examinador coloca las manos en el fondo uterino, así se reconoce el polo fetal que ocupa dicha zona.
- B) La segunda maniobra sirve para confirmar la presentación.
- C) La tercera evalúa donde se encuentra el dorso y las pequeñas partes.
- D) Las maniobras de Leopold son de gran utilidad a partir de la 20 semana de gestación.

68) Respecto al desarrollo embrionario, ¿qué enunciado NO es correcto?

- A) El período embrionario es la etapa del desarrollo durante la cual las tres capas germinales originan diversos órganos y tejidos específicos.
- B) A partir del endodermo se originan las glándulas suprarrenales.
- C) A partir del mesodermo se origina el sistema urogenital.
- D) A partir del ectodermo se desarrolla el sistema nervioso central.

69) Relacionado con el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta (DPPNI), una de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA:

- A) Como factor de riesgo nos encontramos el uso incorrecto de los cinturones de seguridad en un accidente de tráfico.
- B) El estado materno puede variar extraordinariamente, desde formas asintomáticas hasta formas graves que ponen en peligro la vida de la gestante y ocasionan la muerte fetal.
- C) Es la causa más frecuente de la coagulación intravascular diseminada en la gestación, apareciendo ésta en la mayoría de los DPPNI.
- D) En formas graves hallamos el denominado útero de Couvelaire.

70) Según la última clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la infibulación es un tipo de Mutilación Genital Femenina que se caracteriza por:

- A) Estiramiento de los labios menores, clasificada como tipo II.
- B) Escisión del clítoris y/o prepucio, clasificada como tipo I.
- C) Estrechamiento de la abertura vaginal para crear un sello mediante el corte y la recolocación de los labios menores o mayores, con o sin resección del clítoris. Clasificada como tipo III.
- D) Resección parcial o total del clítoris y, en casos muy infrecuentes, sólo del prepucio. Clasificada como tipo II.

71) En relación a la diabetes gestacional (DG), el Grupo Español de Diabetes y Embarazo en su documento de consenso con la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia y la Sociedad Española de Diabetes, expone las siguientes afirmaciones. Señale la INCORRECTA:

- A) Una glucemia basal mayor o igual a 126mg/dl o al azar mayor de 200mg/dl ratifican el diagnóstico de DG excluyendo la necesidad de realizar una sobrecarga oral de glucosa (SOG).
- B) Se considerará diagnóstico de DG el hallazgo de una glucemia basal de 110mg/dl y una glucemia a las 2 horas de la SOG de 170mg/dl.
- C) Para la realización del Test O'Sullivan no es necesario estar en ayunas.
- D) Para la realización de la SOG se precisa una dieta preparatoria los días previos que no sea restrictiva en hidratos de carbono.

72) En cuanto al análisis de la maternidad desde la perspectiva de género NO es cierto que:

- A) Va a permitir desvelar que muchos de los malestares que sienten algunas mujeres están asociados con la divergencia entre lo que ellas piensan o sienten y el ideal de madre socialmente aceptado.
- B) En la cultura occidental la maternidad se concibe como la función esencial de las mujeres, quienes tendrían una "predisposición especial" para la maternidad y para todo lo que de ello se deriva.
- C) La maternidad debe ser abordada en el marco de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
- D) El hecho de tener una hija/o convierte a la mujer en la madre que condensa los valores de la sociedad (abnegación, entrega sin límites, capacidad de sufrimiento y sacrificio, etc.).

73) Señale la opción INCORRECTA:

- A) El cortisol, la prolactina y la progesterona son hormonas antiinsulínicas.
- B) El hiperinsulinismo al que está expuesto el feto de madres diabéticas es el responsable de la mayoría de alteraciones que se observan en el mismo, especialmente de la macrosomía y de la hipoglucemia.
- C) El metabolismo materno es predominantemente anabólico en la primera mitad de la gestación y catabólico en la segunda.
- D) En el feto de madres diabéticas la glucogenolisis y la neoglucogénesis están aumentadas.

74) Entre las causas más frecuentes que se asocian a la dismenorrea primaria, se encuentra:

- A) Endometriosis.
- B) Adenomiosis.
- C) Procesos infecciosos.
- D) Ninguna es correcta.

75) ¿Cuál de las siguientes maniobras NO se utiliza para favorecer el desprendimiento de hombros?

- A) Maniobra de Bracht.
- B) Maniobra de Müller.
- C) Maniobra de Rojas-Lövset.
- D) Maniobra de Mauriceau.

76) Señale la respuesta correcta en relación a los Protocolos Asistenciales:

- A) Son mapas asistenciales que se aplican a enfermos con una determinada patología, y que presentan un curso clínico predecible.
- B) Son planes precisos y detallados para el estudio de un problema biomédico o para el tratamiento de una determinada enfermedad. Tienen carácter de acuerdo a cumplir.
- C) Son un conjunto de recomendaciones diseñadas para ayudar a profesionales o pacientes, en la selección de las mejores opciones diagnósticas y terapéuticas para una condición clínica específica. No implican obligatoriedad.
- D) Todas son correctas.

77) En relación con los factores de riesgo de duelo perinatal complicado NO se encuentra:

- A) Tener hijos.
- B) No haber explicación para lo sucedido.
- C) No tener familia o apoyo social.
- D) Coincide con otros problemas vitales importantes.

78) El sistema de información de urgencias hospitalarias (SUH) de los hospitales públicos de Aragón analiza una serie de datos. Entre ellos NO se encuentran:

- A) El porcentaje de población por sector que al menos ha ido una vez a un servicio de urgencias.
- B) La tasa de urgencias por persona en el total de población.
- C) El número de urgencias atendidas en el año con sector sanitario identificado.
- D) El número de urgencias clasificadas como de triaje alto.

79) Con respecto a la acreditación de tutores de formación especializada en Ciencias de la Salud, es cierto que:

- A) El solicitante de la acreditación deberá haber realizado actividades de formación continuada en su área de conocimiento con un mínimo de 80 horas (8 créditos de formación continuada del Sistema Nacional de Salud) en los últimos 5 años.
- B) La acreditación tendrá efecto por un periodo equivalente a la duración del periodo formativo de la especialidad correspondiente, debiendo solicitar la reacreditación al finalizar dicho periodo.
- C) El solicitante de la acreditación deberá estar en posesión del título de Especialista de la especialidad de la que va a ser tutor y estar en situación de servicio activo en Centros acreditados para la docencia especializada en ciencias de la salud con, al menos, dos años de antigüedad.
- D) Todas las anteriores son ciertas.

80) Entre las recomendaciones para el cuidado del recién nacido, apoyados en la evidencia científica disponible, NO se encuentra:

- A) Ofrecer consejo sobre los cuidados del cordón umbilical hasta su caída.
- B) Aconsejar poner al bebé a dormir boca arriba, advirtiendo que se evite poner al bebé boca abajo ya que aumenta considerablemente el riesgo de muerte súbita del lactante.
- C) Informar de que en su hogar podría realizar el colecho, principalmente durante las primeras semanas de vida para favorecer el vínculo y especialmente las madres fumadoras.
- D) Evitar, siempre que sea posible, el uso del chupete durante el primer mes para facilitar el buen inicio de la lactancia materna.

81) En relación con la mola hidatiforme completa, indique la respuesta INCORRECTA:

- A) El síntoma más precoz y frecuente es la hemorragia vaginal.
- B) Puede acompañarse de hiperemesis por los bajos valores sanguíneos de β -HCG.
- C) La matrona realizará control hemodinámico y del sangrado tras el legrado evacuador.
- D) Es aconsejable mantener perfusión intravenosa de oxitocina durante las primeras 24 horas tras evacuación.

82) Según el Programa de Vacunación en edad pediátrica vigente en Aragón, ¿qué vacunas se deben administrar a los 2 meses de edad?

- A) Hexavalente (DTPaVPI-Hib-HepB), Neumococo y Meningococo C.
- B) Triple vírica y Meningococo C.
- C) Meningococo C, Neumococo y Triple vírica.
- D) Hexavalente (DTPaVPI-Hib-HepB) y Neumococo.

83) NO pertenece a la Comisión Central de Garantía de la Calidad:

- A) El Director de Enfermería.
- B) Los Subdirectores de las Divisiones Médica y de Enfermería.
- C) Los Presidentes de las Comisiones Clínicas.
- D) El Director de Gestión.

84) Según la Sociedad Española de Neonatología (SEN - 2016), en la reanimación neonatal completa en sala de partos, se tiene que dar respuesta a las siguientes preguntas:

- A) ¿La gestación es a término?, ¿el recién nacido respira o llora?, ¿tiene buen tono muscular?
- B) ¿La gestación es a término?, ¿tiene buen color?, ¿el recién nacido respira?, ¿tiene buen tono muscular?
- C) ¿La gestación es a término?, ¿el líquido amniótico es claro?, ¿el recién nacido tiene buen tono muscular?
- D) Ninguna es cierta.

85) Señala la respuesta INCORRECTA sobre los programas, protocolos y/o planes elaborados en la actualidad en Aragón, dentro del desarrollo de las Estrategias Nacionales:

- A) El programa de detección precoz cáncer colorrectal y el programa de cáncer de mama forman parte del desarrollo de la Estrategia de Cáncer del SNS en nuestra Comunidad.
- B) El protocolo común de actuación sanitaria en mutilación genital femenina forma parte del desarrollo de la Estrategia de Violencia de género del SNS en nuestra Comunidad.
- C) El programa de detección precoz de enfermedades raras forma parte del desarrollo de la Estrategia de Enfermedades Raras del SNS en nuestra Comunidad.
- D) El plan estratégico 2002-2010 de atención a la salud mental y la actualización de agosto 2016 de dispositivos para la atención de la salud mental de Aragón forman parte del desarrollo de la Estrategia de Salud Mental del SNS en nuestra Comunidad.

86) Respecto a las infecciones puerperales, NO es cierto que:

- A) Se considera que padece una infección toda puérpera que presenta una temperatura superior o igual a 38°C en al menos dos determinaciones separadas por un intervalo de 6 horas, excluyendo las primeras 24 horas postparto.
- B) Presentan una mayor incidencia de endometritis postparto las mujeres con vaginosis bacteriana y las portadoras genitales de *Estreptococo Agalactiae*, enterococos o enterobacterias.
- C) En ausencia de anemia, pérdida importante de sangre o patología cardíaca, toda taquicardia persistente durante cualquier fase del puerperio debería hacer sospechar infección puerperal, aunque la paciente esté apirética.
- D) La expulsión de los loquios puede interrumpirse acumulándose en el interior del útero y dando lugar a un cuadro infeccioso llamado "loquiometra" que son loquios altamente infectantes, con aspecto purulento.

87) La epidemiología, según Armijo, es una ciencia compleja al nutrirse de ciencias:

- A) Biológicas, genéticas y humanitarias.
- B) Sociales, humanitarias y estadísticas.
- C) Biológicas, matemáticas y sociales.
- D) Estadísticas, biológicas y humanitarias.

88) Respecto a las relaciones sexuales coitales durante el embarazo, se deben evitar si:

- A) Existe amenaza de parto pretérmino, hemorragia genital, o rotura de la bolsa de las aguas.
- B) Durante el embarazo continúa con lactancia materna.
- C) Aumenta mucho de peso.
- D) Le han diagnosticado diabetes gestacional.

89) En relación con el acretismo placentario:

- A) En la placenta ácreta, las vellosidades penetran hasta el interior del miometrio.
- B) En la placenta íncreta, las vellosidades se insertan directamente en el miometrio.
- C) La placenta pércreta puede causar hematuria por invasión de la vejiga.
- D) La frecuencia de acretismo placentario aumenta conforme aumenta el número de cesáreas sin que haya una relación con placenta previa.

90) La recomendación a los padres sobre la dosis adecuada de paracetamol que debe administrarse a los recién nacidos a término \geq a 10 días es:

- A) De 10 a 15 mgr/kg/dosis cada 4-6 horas.
- B) De 40 a 60 mgr/Kg/dosis cada 6-8 horas.
- C) De 35 a 50 mgr/Kg/dosis cada 8 horas.
- D) De 25 a 30 mgr/kg/dosis cada 4-6 horas.

91) Señale la respuesta INCORRECTA sobre los "problemas de colaboración" en Enfermería:

- A) Pueden ser reales o potenciales.
- B) La responsabilidad de la enfermera es sobre las acciones propias y del resultado final.
- C) El centro de atención es el usuario.
- D) El control de la situación y la autoridad para determinar las intervenciones que se han de llevar a cabo recaen sobre el profesional con el que colabora.

92) ¿Cuál de las siguientes definiciones corresponde al signo de Schröder?

- A) Cuando se desprende la placenta, el útero tiende a lateralizarse hacia el lado derecho para luego volver a la posición central.
- B) Cuando se ha producido el desprendimiento de la placenta, el tono del útero aumenta y el cuerpo se vuelve duro y globoso.
- C) Cuando la placenta se está desprendiendo, se puede observar el descenso del cordón umbilical.
- D) Cuando la placenta no se ha desprendido, al presionar sobre la sínfisis del pubis, se produce un retroceso del cordón umbilical hacia la vagina.

93) La triada de Virchow está relacionada con la aparición en el puerperio de:

- A) Enfermedad tromboembólica.
- B) Depresión post-parto.
- C) Hemorragia puerperal.
- D) Endometritis.

94) Dentro de las indicaciones para ser receptora de ovodonación NO estaría:

- A) Mujeres con anomalías cromosómicas hereditarias.
- B) Síndrome de Rokitansky.
- C) Fallo ovárico prematuro.
- D) Bajas respondedoras a las técnicas de reproducción asistida.

95) Con respecto a las mujeres inmigrantes es cierto que:

- A) En mujeres magrebíes, el Ramadán interfiere en la adecuada nutrición de la gestante, en la asistencia a controles prenatales y en la realización de cuidados durante el embarazo. Durante el embarazo y la lactancia, las mujeres están exentas de su realización, pero muchas lo siguen practicando.
- B) En mujeres de África subsahariana la tasa de gestantes portadoras de estreptococo del grupo B es claramente inferior a la de las autóctonas. Tienen mayor riesgo de preeclampsia y de hipertensión arterial respecto a la población autóctona.
- C) Las mujeres de Asia suelen presentar embarazos no deseados sobre todo en las segundas gestaciones. Tienen una tasa de interrupción voluntaria del embarazo muy alta.
- D) Todas son correctas.

96) NO es una Línea estratégica del Sistema Nacional de Salud:

- A) Reorientación de los servicios de salud.
- B) Promover estilos de vida saludables durante el embarazo y el periodo de lactancia.
- C) Intersectorialidad en salud.
- D) Empoderamiento en salud.

97) Señale la respuesta INCORRECTA respecto a las fuentes de información:

- A) Según el tipo de fuente de información se clasifican en: primarias, secundarias y terciarias.
- B) Según el nivel de procesamiento se establecen 6 niveles de evidencia de las fuentes de información.
- C) Son fuentes de información secundarias los libros de texto en papel o electrónico.
- D) Las Guías de Práctica Clínica incluidas en el Portal Guía Salud no son de obligado cumplimiento ni sustituyen el juicio clínico de los sanitarios.

98) La evaluación de un plan de cuidados NO incluye:

- A) Determinar el logro de objetivos.
- B) Identificar factores que afectan al logro de objetivos.
- C) Determinar resultados e identificar intervenciones.
- D) Decidir si se mantiene, modifica o se finaliza el plan.

99) Respecto al consumo de drogas durante el embarazo, señale la INCORRECTA:

- A) El uso de marihuana durante la gestación provoca malformaciones digestivas en el feto.
- B) Diversos estudios encuentran relación entre el consumo de anfetaminas y aumento de ciertas malformaciones fetales como atresia biliar, cardiopatías congénitas y labio leporino.
- C) No se ha evidenciado que se incrementen las malformaciones congénitas del feto por la drogadicción con heroína.
- D) Las semillas de la *Argyreia nervosa* (Hawaiian baby woodrose) producen un efecto sedante y una alteración autonómica desagradable, semejante a la escopolamina.

100) La adquisición del título de especialista en Enfermería Obstétrico-Ginecológica mediante el sistema EIR está basado en una evaluación por:

- A) Superación de una serie de exámenes y resolución de casos prácticos teóricos que determina cada Unidad Docente.
- B) Asistencia de un mínimo de 180 partos normales.
- C) Cumplimiento de un mínimo de horas asistenciales según contrato laboral.
- D) Adquisición progresiva de competencias.

101) El Acuerdo de Gestión Clínica NO incluye específicamente:

- A) Evaluación de los resultados.
- B) Reinserción social y laboral de los pacientes.
- C) Relación de los servicios que prestará la unidad y plan de comunicación de éstos.
- D) Programas de apoyo a la mejora de la unidad: de formación, investigación, calidad.

102) ¿Cuál de las siguientes NO es indicación de la inseminación artificial conyugal?

- A) Factor masculino leve.
- B) Factor cervical inhóspito.
- C) Esterilidad de origen desconocido.
- D) Ninguna es correcta.

103) Respecto al desarrollo fetal, es cierto que:

- A) La placenta se compone de dos partes: la materna (vellosidades coriónicas), y la fetal (decidua basal).
- B) Durante el octavo mes, habitualmente los testículos descienden a las bolsas escrotales.
- C) Durante el tercer mes se forma la grasa parda.
- D) Durante la vida fetal la sangre circula desde el feto hacia la placenta a través de la vena umbilical.

104) Entre las disfunciones sexuales femeninas según el DSM-5 (Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales), NO se encuentra:

- A) Trastornos del interés/excitación sexual femenino.
- B) Trastorno orgásmico femenino.
- C) Trastorno por penetración/dolor génito-pélvico.
- D) Trastorno por aversión al sexo.

105) El diámetro submentobregmático fetal se extiende desde el submentón al centro de la fontanela bregmática y mide:

- A) 9,5 cm.
- B) 13,5 cm.
- C) 12 cm.
- D) 10,5 cm.

106) En la menopausia, por deficiencia estrogénica se producen frecuentemente sofocos, estos se manifiestan a nivel:

- A) Genitourinario.
- B) Vasomotor.
- C) Esquelético.
- D) Cardiovascular

107) En relación con la anemia en el embarazo, señale la respuesta INCORRECTA:

- A) La anemia microcítica es el tipo de anemia más frecuente durante la gestación y en la inmensa mayoría de casos obedece a una ferropenia.
- B) El riesgo relativo de prematuridad y bajo peso de los recién nacidos está aumentado en caso de anemia grave frente al riesgo que presentan las gestantes normales o con anemia leve.
- C) La prevención es el mejor tratamiento, consiguiendo una dieta rica en carne, huevos y cereales e incluso iniciando un suplemento de hierro oral a toda mujer gestante desde la primera visita prenatal.
- D) El tratamiento de elección para la anemia ferropénica son las sales ferrosas siendo conveniente ser tomadas en ayunas o entre comidas teniendo en cuenta que el carbonato de calcio dificulta su absorción y la vitamina C la favorece.

108) Durante la exploración de una puérpera en la visita puerperal a los 7 días posteriores al parto, la altura del fondo uterino esperamos encontrarla:

- A) No deberíamos poder palpar el fondo uterino por tener que estar intrapélvico.
- B) Uno o dos centímetros por debajo del ombligo y con consistencia dura.
- C) A mitad de la línea umbilicopubiana y no doloroso a la palpación.
- D) Lateralizado a la izquierda y por encima del nivel umbilical.

109) La administración de la vacuna antigripal inactivada durante el embarazo:

- A) No se recomienda por las posibles complicaciones postvacunales para la madre y el feto.
- B) Sí, se puede vacunar siempre que no sea en el primer trimestre.
- C) Sí, se recomienda vacunar en cualquier trimestre del embarazo.
- D) No se recomienda porque la infección por la gripe no aumenta la morbilidad para la madre y el feto.

110) Respecto a la prevención del tabaco en la gestación:

- A) La intervención recomendada en la práctica clínica para ayudar a las mujeres embarazadas a dejar de fumar es un protocolo de intervención breve y estructurado en cinco pasos, conocido como "Las 5 As".
- B) La Terapia sustitutiva de nicotina, si se utiliza en mujeres embarazadas, debe hacerse preferiblemente con parches de dosis continua de nicotina.
- C) Las intervenciones en las que han sido usados materiales específicos de auto-ayuda durante la gestación no han mostrado mejores resultados en ensayos clínicos que aquellas en las que no se utilizaron.
- D) Ante respuestas del tipo "seguiré fumando porque fumé en mi último embarazo y mi bebé está bien", respetaremos su decisión y finalizaremos la intervención, registrando los datos en su historia clínica.

