

Indicador Admisiones a Tratamiento por Consumo de Sustancias Psicoactivas Resumen Datos Aragón 2011

Dirección General de Salud Pública
Servicio de Drogodependencia
y Vigilancia en Salud Pública

ÍNDICE GRÁFICOS AÑO 2011

DISTRIBUCIÓN POR EDAD	3
DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO.....	3
DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y GRUPO DE SUSTANCIA	4
DISTRIBUCIÓN POR SEXO Y GRUPO DE SUSTANCIA.....	5
DISTRIBUCIÓN INICIOS TRATAMIENTO POR PROVINCIAS.....	6
DISTRIBUCIÓN POR CONTINENTE.....	7
DISTRIBUCIÓN POR CONTINENTE Y POR PROVINCIA DE ASISTENCIA	8
DISTRIBUCIÓN POR PROCEDENCIA DE TRATAMIENTO.....	9
SITUACIÓN DE CONVIVENCIA	9
DISTRIBUCIÓN POR SITUACIÓN DE RESIDENCIA.....	10
DISTRIBUCIÓN POR NIVEL MÁXIMO DE ESTUDIOS Y GRUPO DE SUSTANCIA ...	10
DISTRIBUCIÓN POR SITUACIÓN LABORAL Y GRUPO DE SUSTANCIA. 2011	11
REALIZACIÓN DE TRATAMIENTO PREVIO POR LA MISMA DROGA	12
VÍA MÁS FRECUENTE DE ADMINISTRACIÓN DE LA DROGA PRINCIPAL	13
SITUACIÓN SEROLÓGICA VIH RELACIONADA CON GRUPO DE SUSTANCIA.....	14

Los inicios de tratamiento notificados durante 2011 en la Comunidad Autónoma de Aragón han sido 1.887, el 81,2 % de las admisiones a tratamiento corresponde a hombres y el 18,8 % a mujeres.

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

Aragón, 2011

GRUPO EDAD	TOTAL	%
14 y <	166	8,8
15 a 20 años	215	11,4
21 a 30 años	472	25,1
31 a 40 años	568	30,2
41 a 50 años	326	17,3
51 a 60 años	115	6,1
61 y >	20	1,1
NC	5	0

**5 casos sin información edad, a tener en cuenta en Distribución "por edad y sexo" y "por edad y grupo de sustancia"*

DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO

Aragón, 2011

GRUPO EDAD	HOMBRES	%	MUJERES	%
14 y <	125	8,2	41	11,6
15 a 20 años	177	11,6	38	10,8
21 a 30 años	393	25,7	79	22,4
31 a 40 años	465	30,4	103	29,2
41 a 50 años	262	17,1	64	18,1
51 a 60 años	91	6,0	24	6,8
61 y >	16	1,0	4	1,1
TOTAL	1529	100%	353	100%

Los inicios de tratamiento entre los jóvenes de 14 a 20 constituyeron el 21,2 %. El grupo de edad de 21 a 40 años representó el mayor porcentaje de inicios de tratamiento con un 55 %.

DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y GRUPO DE SUSTANCIA

Aragón, 2011

Grupo edad	Total	Alcohol	Alu cin.	Anfetam.	Benzod.	Cannabis	Cocaína	Heroína	Otros estim.	Otros opioides	Sust. volátiles
14 y <	166	4		11		138	12				1
15 a 20 años	215	14	1	27	1	117	42	12	1		
21 a 30 años	472	100		43		72	182	70	1	3	1
31 a 40 años	568	238		13	8	20	159	124	1	5	
41 a 50 años	326	200			4	6	41	72	1	1	
51 a 60 años	115	101			2		5	6		1	
61 y >	20	20									
NC	0										
	1882	677	1	94	15	353	441	284	4	10	2

Si analizamos los datos en relación con las sustancias consumidas, observamos que los jóvenes de 14 a 20 años iniciaron tratamiento en un 66,9% por consumo de cannabis (73% en 2010 y 65,7 % en 2009), seguido por consumo de cocaína 14,17% (10,18% en 2010 y 14,6% en 2009), consumo de anfetaminas 9,9% (5,75% en 2010 y 8,2 % en 2009) y por consumo de alcohol 4,7%.

Entre los jóvenes de 21 a 30 años la droga por la que se iniciaron más tratamientos fue la cocaína con un 38,6% (39,5% en 2010 y 44,8 % en 2009), seguido de alcohol con un 21,2% (23,6% en 2010 y 17,6 % en 2009) y cannabis (15,25%) junto con heroína (14,8%) y anfetaminas (9,1%).

Entre los 31-40 años el mayor porcentaje de tratamientos iniciados fue por abuso de alcohol 41,9% (42,86% en 2010 y 40,3% en 2009) seguido por consumo de cocaína 28% (26,85% en 2010 y 23,7% en 2009), heroína más otros opiáceos 22,7% (25,56% en 2010 y 26,8% en 2009).


El grupo de edad entre 41-50 años, inició tratamiento en el 61,35% de los casos por alcohol (73,23% en 2010 y 62,2 % en 2009), seguido de heroína y otros opiáceos con un 22,4% (14,70% en 2010 y 19,5% en 2009) y de cocaína con un 12,6% (9,45% en 2010 y 11,8 % en 2009).

El 87,8% de los inicios de tratamiento para el grupo de edad comprendido entre los 51 a 60 años se produce por consumo de alcohol (89,5% en 2010 y 88,3 % en 2009), seguidos de cocaína y heroína y otros opiáceos 6%.

Los inicios de tratamiento para el grupo de edad de 61 y más que suponen un 1 % del total de tratamientos iniciados, el 100 % de los casos fue por consumo de alcohol.

DISTRIBUCIÓN POR SEXO Y GRUPO DE SUSTANCIA

Aragón, 2011




Sustancia	Total	Mujer	%	Hombre	%
Alcohol	679	136	38,3	543	35,4
Alucinógenos	1	0	0	1	0,1
Anfetaminas	94	17	4,8	77	5,0
Benzodiacepinas	15	10	2,8	5	0,3
Cannabis	356	74	20,8	282	18,4
Cocaína	442	63	17,7	379	24,7
Heroína	284	50	14,1	234	15,3
Otros estimulantes	4	2	0,6	2	0,1
Otros opioides	10	3	0,8	7	0,5
Sustancias volátiles	2	0	0	2	0,1
	1887	355		1532	

Los hombres iniciaron tratamiento durante 2011 en primer lugar por alcohol con 35,4%, seguido con un 29,8% seguido por estimulantes (cocaína, anfetaminas y otros estimulantes), cannabis con un 18,4% y opiáceos (heroína y otros opiáceos) con un 15,8%.

Con respecto a las mujeres, iniciaron tratamiento un 38,3% por alcohol, seguido por estimulantes (cocaína, anfetaminas y otros estimulantes) con un 23,1% y los opiáceos (heroína y otros opiáceos) con un 14,9%.

DISTRIBUCIÓN INICIOS TRATAMIENTO POR PROVINCIAS

Aragón, 2011



Grupo sustancia	Total Aragón	%	Huesca	%	Teruel	%	Zaragoza	%
Alcohol	679	36,0	122	48,2	114	45,2	443	32,1
Alucinógenos	1	0,1	1	0,4	0	0,0	0	0,0
Anfetaminas	94	5,0	19	7,5	4	1,6	71	5,1
Benzodiac.	15	0,8	3	1,2	1	0,4	11	0,8
Cannabis	356	18,9	51	20,2	51	20,2	254	18,4
Cocaína	442	23,4	40	15,8	57	22,6	345	25,0
Heroína	284	15,1	16	6,3	23	9,1	245	17,7
Otros estimulantes	4	0,2	0	0	0	0	4	0,3
Otros opioides	10	0,5	1	0,4	2	0,8	7	0,5
Sustancias volátiles	2	0,1	0	0	0	0	2	0,1
	1887		253		252		1382	


Del total de Admisiones a Tratamiento, las correspondientes a Huesca representan un 13,41%, las de Teruel un 13,35% y las de Zaragoza un 73,24%, del total de Aragón.

Los tratamientos por alcohol han supuesto el mayor porcentaje en el conjunto de Aragón con un 36%, seguidos de estimulantes (cocaína, anfetaminas y otros estimulantes) con un 28,6% cannabis 18,9% y opiáceos (heroína más otros opiáceos) 15,6%.

Si observamos los datos por provincias, las diferencias fundamentales las encontramos en los inicios de tratamiento por alcohol (Huesca: 48,2%; Teruel: 45,2% y Zaragoza: 32,1%), por cocaína (Huesca 15,8%; Teruel 22,6% y Zaragoza 25%) y por heroína (Huesca: 6,3%; Teruel: 9,9%; Zaragoza: 17,17%)


DISTRIBUCIÓN POR CONTINENTE

Aragón, 2011



DISTRIBUCIÓN POR CONTINENTE Y POR PROVINCIA DE ASISTENCIA

Aragón, 2011



En cuanto al número de extranjeros que han iniciado tratamiento, no se han producido modificaciones reseñables, reducción respecto a 2010 en Huesca (-7%) y ligero aumento en Zaragoza (+1,5%). Zaragoza sigue siendo la provincia en la que se atiende el mayor número de estos pacientes.

DISTRIBUCIÓN POR PROCEDENCIA DE TRATAMIENTO

Aragón, 2011

PROCEDENCIA	TOTAL	%
Desconocido	11	0,6
Familiares/Amigos	478	25
Iniciativa propia	405	21
Otro servicio drogas	109	5,8
Otros	30	1,6
Prisión/Judicial	140	7,4
Servicios sanitarios	589	31
Servicios sociales	125	6,6

Como viene ocurriendo en años anteriores, los pacientes que inician tratamiento, llegan a los centros en la mayoría de las ocasiones a través de familiares y amigos (25%) o por iniciativa propia (21%) en un total del 46 % de los casos. En el 31% de los casos, los pacientes llegan a los centros a través de Servicios sanitarios. El 6,6% procede de Servicios sociales y el 5,8% procede de Otros servicios de drogas.

SITUACIÓN DE CONVIVENCIA

Aragón, 2011

CONVIVENCIA	TOTAL	%
Con amigos/as	51	2,7
Con la pareja e hijos/as	331	18
Con padres o familia de origen	778	41
Desconocida	48	2,6
Otras	104	5,5
Solo/a	285	15
Únicamente con hijos/as	49	2,6
Únicamente con pareja	241	13

El 41% de pacientes vivían con padres o familia de origen en los treinta días anteriores al inicio de tratamiento. El 18% de los pacientes vivían con la pareja e hijos/as y el 15 % vivían solos.

DISTRIBUCIÓN POR SITUACIÓN DE RESIDENCIA


Aragón, 2011

RESIDENCIA	TOTAL	%
Alojamiento inestable/precario	56	3
Casas, pisos, apartamento	1706	90
Desconocida	4	0,3
Otras instituciones	27	1,4
Otro lugar	53	2,8
Pensiones, hoteles, hostales	9	0,5
Prisión, centro de reforma o de internamiento cerrado para menores	32	1,7

En 2011 el 90% de los pacientes declaran haber vivido en casas, pisos o apartamentos en los treinta días antes de iniciar tratamiento. El porcentaje de personas que procedían de prisión o de centro de reforma para menores es de 1,7%.

DISTRIBUCIÓN POR NIVEL MÁXIMO DE ESTUDIOS Y GRUPO DE SUSTANCIA

Aragón, 2011



Sustancia	Total	Descon.	No lee /escribe	Otros	Primarios	Secundarios	Univ. Medio	Univ. Sup.
Alcohol	679	27	2	0	266	326	29	29
Alucinógenos	1	0	0	0	1	0	0	0
Anfetaminas	94	4	0	0	50	38	1	1
Benzodiacepinas	15	1	0	0	7	7	0	0
Cannabis	356	8	1	1	157	186	2	1
Cocaína	442	3	4	0	174	244	12	5
Heroína	284	11	2	0	163	100	5	3
Otros estimulantes	4	0	0	0	0	4	0	0
Otros opioides	10	1	0	0	6	2	0	1
Sustancias volátiles	2	0	0	0	1	1	0	0
	1887	55	9	1	825	908	49	40

El 39% de pacientes tienen estudios primarios y el 48 % secundarios, en torno al 8,6% tienen estudios universitarios.

DISTRIBUCIÓN POR SITUACIÓN LABORAL Y GRUPO DE SUSTANCIA

Aragón, 2011




Sustancia	Trabajando	Parado	Otras	Incapacidad o pension.	Estudiante	Desconocido	Total
Alcohol	268	277	37	74	5	18	679
Alucinógenos		1					1
Anfetaminas	42	36	1		13	2	94
Benzodiacepinas	4	4	2	4		1	15
Cannabis	50	93	5	4	193	11	356
Cocaína	201	187	11	16	20	7	442
Heroína	52	166	31	19	2	14	284
Otros estimulantes	3		1				4
Otros opioides	1	7		1		1	10
Sustancias volátiles				1	1		2

Del total de los pacientes que iniciaron tratamiento en 2011, el 39 % se encontraba trabajando, el 41% parado, el 1% estudiando. El 11% se encontraba en situación de incapacidad o pensionista.

REALIZACIÓN DE TRATAMIENTO PREVIO POR LA MISMA DROGA

Aragón, 2011




Grupo sustancia	Sí	% del total sustancia		% del t.s.	Desc.	Total	
		No					
Alcohol	355	52,3	273	40,2	51	7,5	679
Alucinógenos	0	0	1	100	0	0	1
Anfetaminas	27	28,7	61	64,9	6	6,4	94
Benzodiacepinas	12	80	2	13,3	1	6,7	15
Cannabis	75	21,1	238	66,9	43	12,1	356
Cocaína	223	50,5	199	45	20	4,5	442
Heroína	249	87,7	29	10,2	6	2,1	284
Otros estimulantes	0	0	4	100	0	0	4
Otros opioides	8	80	2	20	0	0	10
Sustancias volátiles	1	50	1	50	0	0	2

Para los que consumían alcohol era el primer tratamiento en un 40,2% de los casos (52,3% habían recibido previamente y en un 7,5% se desconoce el dato). Para los que iniciaron tratamiento por consumo de cocaína era el primero en un 50,5% y por consumo de cannabis realizaban el primer tratamiento el 66,9% de los casos notificados.

VÍA MÁS FRECUENTE DE ADMINISTRACIÓN DE LA DROGA PRINCIPAL

Aragón, 2011



Grupo sustancia	Descon.	Esnifada	Oral	Parenteral	Pulmonar o fumada
Alcohol		1	678		
Alucinógenos		1			
Anfetaminas	2	67	17		8
Benzodiacepinas			15		
Cannabis	3	2	7		344
Cocaína	3	409	3	5	22
Heroína	6	14	2	128	134
Otros estimulantes			3		1
Otros opioides	1		3	4	2
Sustancias volátiles		1			1

Un 7% del total de los inicios realizados en 2011 continúa usando la vía parenteral. El 96,6% de los consumidores de cannabis toman la sustancia por vía pulmonar o fumada.

SITUACIÓN SEROLÓGICA VIH RELACIONADA CON GRUPO DE SUSTANCIA

Aragón, 2011

Sustancia	Sin prueba	Positivo	Negativo	Desconocido	Total
Alcohol	448	7	146	78	679
Alucinógenos	1	0	0	0	1
Anfetaminas	66	0	18	10	94
Benzodiacepinas	9	1	4	1	15
Cannabis	294	1	30	31	356
Cocaína	252	6	153	31	442
Heroína	30	57	163	34	284
Otros estimulantes	3	0	1	0	4
Otros opioides	3	1	3	3	10
Sustancias volátiles	2	0	0	0	2

El 68,7 % no tiene prueba para determinación de anticuerpos VIH (58,7%) o es desconocida (10%). El 78% de los resultados positivos corresponde a personas que iniciaron tratamiento por consumo de opiáceos (heroína más otros opiáceos), frente al 75,3% de 2010.

De la serología conocida (591 inicios de tratamiento), un 87,6% es negativo y un 12,4% positivo.

